

### **Le Faucon lanier : *Falco biarmicus* Temminck, 1825**

L'actuelle aire de reproduction du Faucon lanier couvre l'Afrique, à l'exception de la zone ouest-équatoriale et de Madagascar, ainsi que la péninsule arabique, la Turquie et le Proche-Orient. Elle s'étend en Europe où elle comprend le sud des Balkans, la Grèce, la péninsule italique, la Crète et la Sicile (Voous, 1960 ; del Hoyo *et al.*, 1994). Les populations de l'espèce sont sédentaires, mais ses juvéniles effectuent des mouvements de dispersion en automne et en hiver (del Hoyo *et al.*, 1994).

À ce jour, les assemblages paléontologiques du Pléistocène supérieur et archéologiques de l'Holocène de France n'ont pas fourni de restes attribués au Faucon lanier, à l'exception peut-être d'un reste collecté dans des dépôts mésolithiques la région de Bonifacio (Corse-du-Sud) datant du Boréal (Cuisin, 2001).

En France continentale, ce rapace se reproduisait en Provence au 18<sup>ème</sup> siècle et peut-être encore au début du 19<sup>ème</sup> siècle (Dubois *et al.*, 2000 ; voir aussi Ciaccio & Lambertini, 1997). Alors que l'espèce semble s'être encore reproduite en Sardaigne il y a quelques dizaines d'années, cela ne semble pas le cas pour la Corse (Voous, 1960 ; Géroudet, 1979 ; Thibault & Bonaccorsi, 1999).

Mayaud, en 1936, citait le Faucon lanier comme une espèce accidentelle en France où une trentaine de mentions d'individus erratiques sont répertoriées entre 1885 et 1998 par Dubois *et al.* (2000).

C'est sur la base de ces éléments biogéographiques et historiques que l'espèce est rangée au nombre des autochtones de la frange méditerranéenne continentale de France. Elle en a disparu, au plus tôt, à la fin du 18<sup>ème</sup> siècle pour des raisons non établies à ce jour. La situation de l'espèce en Corse n'est pas encore clairement documentée.

Olivier Lorvelec & Jean-Denis Vigne

- Ciaccio & Lambertini, 1997. *Falco biarmicus*. Lanner. P 189, in : *The EBCC Atlas of European Breeding Birds : Their Distribution and Abundance* (E.J.M. Hagemeijer & M.J. Blair, editors). T & AD Poyser, London, UK : 903 pp.
- Cuisin J., 2001a. L'avifaune. In : *L'abri du Monte Leone, grand site mésolithique insulaire méditerranéen* (J.-D. Vigne, dir.). *Doc. Archéol. Fr.* Sous presse.
- Del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal J. (editors), 1994. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guinea-fowl*. Lynx Edicions, Barcelona, E : 638 pp.
- Dubois Ph.J., Le Maréchal P., Oliosio G. & Yésou P., 2000. *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan, Paris, F : 397 pp.
- Géroudet P., 1979. *Les Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, CH : 426 pp.
- Mayaud N., 1936. *Inventaire des oiseaux de France*. Société d'Études Ornithologiques, Blot éditeur, Paris : 211 pp.
- Thibault J.-C. & Bonaccorsi G., 1999. *The birds of Corsica*. British Ornithologists' Union. *BOU Checklist* n° 17.
- Voous K.H., 1960. *Atlas of European birds*. Elsevier, Amsterdam, NL : 284 pp.

### **Le Faucon émerillon : *Falco columbarius* Linné, 1758**

La vaste aire de reproduction actuelle du Faucon émerillon, circum-holarctique, s'étend pour l'essentiel au-delà du 45<sup>ème</sup> parallèle Nord (Voous, 1960). En Europe, où l'espèce se reproduit en Islande, aux îles Féroé, dans les îles britanniques, en Scandinavie, en Russie et dans les pays baltes, elle est plus septentrionale qu'en Asie et en Amérique du Nord (Crick & Wiklund, 1997).