



Muséum national d'Histoire naturelle

En partenariat avec :



La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux de Guadeloupe

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | | Catégorie Liste rouge mondiale |
|--------------|----------|-------------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas acuta</i> | Canard pilet | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas americana</i> | Canard à front blanc | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas bahamensis</i> | Canard des Bahamas, Canard tête-blanche | | | | EN | CR (D) (-1) | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas carolinensis</i> | Sarcelle à ailes vertes | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas clypeata</i> | Canard souchet | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas discors</i> | Sarcelle à ailes bleues | | | | LC | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas platyrhynchos</i> | Canard colvert | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas querquedula</i> | Sarcelle d'été | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas rubripes</i> | Canard noir | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas strepera</i> | Canard chipeau | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anser albifrons</i> | Oie rieuse | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anser caerulescens</i> | Oie des neiges | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya affinis</i> | Fuligule à tête noire | | | | DD | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Aythya collaris</i> | Fuligule à bec cerclé | | | | DD | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna arborea</i> | Dendrocygne des Antilles, Canard siffleur | | EN | CR (D) (-1) | | | VU |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna autumnalis</i> | Dendrocygne à ventre noir | | | | DD | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Dendrocygna bicolor</i> | Dendrocygne fauve | | | | NA ^b | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Nomonyx dominicus</i> | Érismature routoutou, Canard routoutou | | EN | D | | | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Oxyura jamaicensis</i> | Érismature rousse | | VU | EN (D) (-1) | | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Gallus gallus</i> | Coq bankiva | | NA ^a | | | | LC |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Podilymbus podiceps</i> | Grèbe à bec bigarré, Plongeon | | LC | | | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Bulweria bulwerii</i> | Pétrel de Bulwer | | | | NA ^b | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Calonectris diomedea</i> | Puffin cendré | | | | LC | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma hasitata</i> | Pétrel diabolotin, Diabolotin | | CR | D | | | EN |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus gravis</i> | Puffin majeur | | | | LC | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus griseus</i> | Puffin fuligineux | | | | LC | | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus lherminieri</i> | Puffin d'Audubon, Cahen | | DD | | | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus puffinus</i> | Puffin des Anglais | | | | LC | | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanites oceanicus</i> | Océanite de Wilson | | | | LC | | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | Océanite culblanc | | | | LC | | LC |
| Pelecaniformes | Phaethontidae | <i>Phaethon aethereus</i> | Phaéton à bec rouge, Paille en queue à bec rouge | | EN | CR (C1+2a(ii)) (-1) | | | LC |
| Pelecaniformes | Phaethontidae | <i>Phaethon lepturus</i> | Phaéton à bec jaune | | VU | EN (D) (-1) | | | LC |
| Pelecaniformes | Sulidae | <i>Morus bassanus</i> | Fou de Bassan | | | | NA ^b | | LC |
| Pelecaniformes | Sulidae | <i>Sula dactylatra</i> | Fou masqué | | | | DD | | LC |
| Pelecaniformes | Sulidae | <i>Sula leucogaster</i> | Fou brun | | DD | | LC | VU (D1) (-2) | LC |
| Pelecaniformes | Sulidae | <i>Sula sula</i> | Fou à pieds rouges | | VU | CR (D) (-2) | NT | EN (D) (-2) | LC |
| Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax auritus</i> | Cormoran à aigrettes | | | | NA ^b | | LC |
| Pelecaniformes | Pelecanidae | <i>Pelecanus occidentalis</i> | Pélican brun, Grand Gosier | | VU | EN (D) (-1) | LC | VU (D1) (-2) | LC |
| Pelecaniformes | Fregatidae | <i>Fregata magnificens</i> | Frégate superbe | | DD | | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Ardea alba</i> | Grande Aigrette, Grand Crabier blanc | | DD | | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Ardea cinerea</i> | Héron cendré | | | | NA ^b | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Ardea herodias</i> | Grand Héron, Crabier radar | | | | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Botaurus lentiginosus</i> | Butor d'Amérique | | | | NA ^b | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Bubulcus ibis</i> | Héron garde-bœufs, Pique-bœufs | | LC | | | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Butorides striata</i> | Héron strié | | | | NA ^b | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Butorides virescens</i> | Héron vert, Kio | | LC | | | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Egretta caerulea</i> | Aigrette bleue, Petit Héron bleu | | EN | CR (D) (-1) | | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Egretta garzetta</i> | Aigrette garzette | | DD | | | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Egretta thula</i> | Aigrette neigeuse | | LC | | | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Egretta tricolor</i> | Aigrette tricolore, Héron tricolore | | | | DD | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Ixobrychus exilis</i> | Petit Blongios, Kio jaune | | VU | D1 | | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Nyctanassa violacea</i> | Bihoreau violacé, Crabier | | LC | | | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Bihoreau gris, Héron bihoreau | | VU | EN (D) (-1) | | | LC |
| Ciconiiformes | Threskiornithidae | <i>Ajaia ajaja</i> | Spatule rosée | | | | NA ^b | | LC |
| Ciconiiformes | Threskiornithidae | <i>Eudocimus ruber</i> | Ibis rouge | | | | NA ^b | | LC |
| Ciconiiformes | Threskiornithidae | <i>Plegadis falcinellus</i> | Ibis falcinelle | | | | DD | | LC |
| Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | <i>Phoenicopterus ruber</i> | Flamant rose | | RE | | | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|------------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo jamaicensis</i> | Buse à queue rousse | | | | NA ^b | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Buteo platypterus</i> | Petite Buse | | | | NA ^b | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus aeruginosus</i> | Busard des roseaux | | | | NA ^b | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Circus cyaneus</i> | Busard Saint-Martin | | | | NA ^b | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Elanoides forficatus</i> | Milan à queue fourchue | | | | NA ^b | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Milvus migrans</i> | Milan noir | | | | NA ^b | | LC |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Pandion haliaetus</i> | Balbuzard pêcheur, Aiglon | | RE | | LC | EN (D) (-3) | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco columbarius</i> | Faucon émerillon | | | | LC | EN (D) (-3) | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco peregrinus</i> | Faucon pèlerin | | DD | | LC | EN (D) (-3) | LC |
| Falconiformes | Falconidae | <i>Falco sparverius</i> | Crécerelle d'Amérique | | LC | | | | LC |
| Gruiformes | Aramidae | <i>Aramus guarauna</i> | Courlan brun | | | | NA ^b | | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Crex crex</i> | Râle des genêts | | | | NA ^b | | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Fulica americana</i> | Foulque d'Amérique, Poule d'eau à cachet blanc | | EN | CR (D) (-1) | | | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Fulica caribaea</i> | Foulque à cachet blanc | | EN | CR (D) (-1) | | | NT |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallinula galeata</i> | Gallinule d'Amérique, Poule d'eau à cachet rouge | | LC | | | | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porphyrio martinica</i> | Talève violacée, Poule d'eau à cachet vert | | EN | CR (D) (-1) | | | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porzana carolina</i> | Marouette de Caroline | | | | LC | | LC |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Rallus longirostris</i> | Râle gris | | VU | D1 | | | LC |
| Charadriiformes | Haematopodidae | <i>Haematopus palliatus</i> | Huîtrier d'Amérique | | EN | CR (D) (-1) | | | LC |
| Charadriiformes | Recurvirostridae | <i>Himantopus mexicanus</i> | Échasse d'Amérique, Gibier la mort | | EN | CR (D) (-1) | | | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius collaris</i> | Pluvier d'Azara | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius melodus</i> | Pluvier siffleur | | | | DD | | NT |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius nivosus</i> | Gravelot neigeux | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius semipalmatus</i> | Pluvier semipalmé | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius vociferus</i> | Gravelot kildir, Double collier | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius wilsonia</i> | Pluvier de Wilson | | EN | CR (D) (-1) | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis dominica</i> | Pluvier bronzé, Pluvier doré | | | | NT | pr. C2a(ii) | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis squatarola</i> | Pluvier argenté, Pluvier gris | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Actitis macularius</i> | Chevalier grivelé, Batmar | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Arenaria interpres</i> | Tournepieuvre à collier, Pluvier des Salines | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Bartramia longicauda</i> | Bartramie des champs, Poule vergenne | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris alba</i> | Bécasseau sanderling, Gros Maringouin blanc | | | | VU | D1 | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris alpina</i> | Bécasseau variable | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris bairdii</i> | Bécasseau de Baird | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris canutus</i> | Bécasseau maubèche | | | | EN | D | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris ferruginea</i> | Bécasseau cocorli | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris fuscicollis</i> | Bécasseau de Bonaparte | | | | LC | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris himantopus</i> | Bécasseau à échasses, Chevalier Pied-vert | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris mauri</i> | Bécasseau d'Alaska | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris melanotos</i> | Bécasseau tacheté, Bécasseau à poitrine cendrée | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris minutilla</i> | Bécasseau minuscule, Ricuit | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris pusilla</i> | Bécasseau semipalmé, Maringouin | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Gallinago delicata</i> | Bécassine de Wilson | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limnodromus griseus</i> | Bécassin à bec court | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | Bécassin à long bec | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limosa fedoa</i> | Barge marbrée | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limosa haemastica</i> | Barge hudsonienne | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius americanus</i> | Courlis à long bec | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius borealis</i> | Courlis esquimau | | | | RE | | CR |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius phaeopus</i> | Courlis corlieu, Bec crochu | | | | VU | D1 | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Phalaropus lobatus</i> | Phalarope à bec étroit | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Philomachus pugnax</i> | Combattant varié, Chevalier combattant | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Steganopus tricolor</i> | Phalarope de Wilson | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa erythropus</i> | Chevalier arlequin | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa flavipes</i> | Chevalier à pattes jaunes, Petit Chevalier à pattes jaunes | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa glareola</i> | Chevalier sylvain | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa melanoleuca</i> | Chevalier criard, Grand Chevalier à pattes jaunes | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa semipalmatus</i> | Chevalier semipalmé, Aile blanche | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa solitaria</i> | Chevalier solitaire, Grande Aile | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tryngites subruficollis</i> | Bécasseau rousset, Bécasseau roussâtre | | | | VU | EN (D) (-1) | NT |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius longicaudus</i> | Labbe à longue queue | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius maccormicki</i> | Labbe de McCormick | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius parasiticus</i> | Labbe parasite | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius pomarinus</i> | Labbe pomarin | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius skua</i> | Grand Labbe | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chroicocephalus philadelphia</i> | Mouette de Bonaparte | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | Mouette rieuse | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus delawarensis</i> | Goéland à bec cerclé | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus fuscus</i> | Goéland brun | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus marinus</i> | Goéland marin | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus smithsonianus</i> | Goéland d'Amérique | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Leucophaeus atricilla</i> | Mouette atricille, Mauve à tête noire | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Leucophaeus pipixcan</i> | Mouette de Franklin | | | | NA ^b | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | | Catégorie Liste rouge mondiale |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Rissa tridactyla</i> | Mouette tridactyle | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Rynchops niger</i> | Bec-en-ciseaux noir | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Anous stolidus</i> | Noddi brun, Moine | | NT | VU (D1) (-1) | | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Chlidonias niger</i> | Guifette noire | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Gelochelidon nilotica</i> | Sterne hansel | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Hydroprogne caspia</i> | Sterne caspienne | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Onychoprion anaethetus</i> | Sterne bridée, Dongue | | VU | EN (D) (-1) | | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Onychoprion fuscatus</i> | Sterne fuligineuse | | LC | | | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Sterna aculeata</i> | Sterne de Cabot | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Sterna dougallii</i> | Sterne de Dougall, Mauve blanche | | CR | B2ab(ii) | | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Sterna forsteri</i> | Sterne de Forster | | | | NA ^b | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Sterna hirundo</i> | Sterne pierregarin | | CR | D | LC | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Sterna maxima</i> | Sterne royale, Mauve | | | | LC | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Sterna paradisaea</i> | Sterne arctique | | | | DD | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Sternula antillarum</i> | Petite Sterne | | VU | EN (D) (-1) | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba livia</i> | Pigeon biset | | NA ^a | | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina passerina</i> | Colombe à queue noire, Z'otolan | | LC | | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geotrygon montana</i> | Colombe rouviolette, Perdrix rouge | | LC | | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geotrygon mystacea</i> | Colombe à croissants, Perdrix croissant | | LC | | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas leucocephala</i> | Pigeon à couronne blanche, Ramier tête-blanche | | EN | B2ab(i,ii,iii,iv,v) | | | NT |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas squamosa</i> | Pigeon à cou rouge, Ramier cou rouge | | LC | | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Streptopelia decaocto</i> | Tourterelle turque | | NA ^a | | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida asiatica</i> | Tourterelle à ailes blanches | | DD | | LC | VU (D1) (-2) | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida auriculata</i> | Tourterelle oreillard, Tourterelle-ortolan | | | | DD | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida aurita</i> | Tourterelle à queue carrée, Toutrelle | | LC | | | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida macroura</i> | Tourterelle triste | | | | NA ^b | | LC |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona violacea</i> | Perroquet de Guadeloupe | X | EX | | | | EX |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara guadeloupensis</i> | Ara de Guadeloupe | | EX | | | | EX |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga labati</i> | Perrique de Guadeloupe | X | EX | | | | EX |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus americanus</i> | Coulicou à bec jaune | | | | LC | | LC |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> | Coulicou à bec noir | | | | NA ^b | | LC |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus minor</i> | Coulicou manioc, Gangan | | LC | | | | LC |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Crotophaga ani</i> | Ani à bec lisse | | LC | | | | LC |
| Strigiformes | Tytonidae | <i>Tyto alba</i> | Chouette effraie | | | | NA ^b | | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Athene cunicularia</i> | Chevêche des terriers | | RE | | | | LC |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles gundlachii</i> | Engoulevent pyramidig | | NT | VU (D1) (-1) | | | LC |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Chordeiles minor</i> | Engoulevent d'Amérique | | | | DD | | LC |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura brachyura</i> | Martinet polioure | | | | NA ^b | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura martinica</i> | Martinet chiquesol, Petit Martinet noir | | DD | | | | LC |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura pelagica</i> | Martinet ramoneur | | | | NA ^b | | NT |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Cypseloides niger</i> | Martinet sombre, Gros Martinet noir | | DD | | | | LC |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Streptoprocne zonaris</i> | Martinet à collier, Oiseau de la pluie | | | | NA ^b | | LC |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Tachymarptis melba</i> | Martinet à ventre blanc | | | | NA ^b | | LC |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eulampis holosericeus</i> | Colibri falle-vert, Falle-vert | | LC | | | | LC |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Eulampis jugularis</i> | Colibri madère, Fou-fou d'Espagne | | LC | | | | LC |
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Orthorhyncus cristatus</i> | Colibri huppé, Fou-fou | | LC | | | | LC |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Megaceryle alcyon</i> | Martin-pêcheur d'Amérique | | | | | LC | LC |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Megaceryle torquata</i> | Martin-pêcheur à ventre roux, Cloche | | CR | B2ab(i,ii,iii,iv,v) C2a(ii) D | | | LC |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes herminieri</i> | Pic de la Guadeloupe, Toto-bois | X | NT | pr. B2ab(iii) | | | NT |
| Piciformes | Picidae | <i>Sphyrapicus varius</i> | Pic maculé | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus latirostris</i> | Moucherolle gobemouche, Tombé levé | | NT | pr. B2ab(iii) | | | LC |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia martinica</i> | Élénie siffleuse, Siffleur | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus oberi</i> | Tyran janeau, Arbitre siffleur | | VU | D1 | | | LC |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus dominicensis</i> | Tyran gris, Pipirite | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus savana</i> | Tyran des savanes | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Delichon urbicum</i> | Hirondelle de fenêtre | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Hirundo rustica</i> | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Petrochelidon fulva</i> | Hirondelle à front brun | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Petrochelidon pyrrhonota</i> | Hirondelle à front blanc | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Progne dominicensis</i> | Hirondelle à ventre blanc | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Progne subis</i> | Hirondelle noire | | | | DD | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Riparia riparia</i> | Hirondelle de rivage | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Stelgidopteryx serripennis</i> | Hirondelle à ailes hérissées | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Tachycineta bicolor</i> | Hirondelle bicolore | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Bombycillidae | <i>Bombycilla cedrorum</i> | Jaseur d'Amérique | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Troglodytidae | <i>Troglodytes aedon</i> | Troglodyte familier | | RE | | | | LC |
| Passeriformes | Mimidae | <i>Allenia fusca</i> | Moqueur grivotte, Grivotte | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Mimidae | <i>Cinclocerthia ruficauda</i> | Trembleur brun, Grive trembleuse | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Mimidae | <i>Margarops fuscatus</i> | Moqueur corossol, Grive-corossol | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Mimidae | <i>Mimus gilvus</i> | Moqueur des savanes, Pié fouillé | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus minimus</i> | Grive à joues grises | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus ustulatus</i> | Grive à dos olive | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus lherminieri</i> | Grive à pieds jaunes, Grive à pattes jaunes | | VU | B2ab(iii) | | | VU |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus nudigenis</i> | Merle à lunettes, Grive à lunettes | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer domesticus</i> | Moineau domestique | | NA ^a | | | | LC |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Amandava amandava</i> | Bengali rouge | | NA ^a | | | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|--------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Estrilda melpoda</i> | Astrild à joues orange | | NA ^a | | | | LC |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Estrilda troglodytes</i> | Astrild cendré | | NA ^a | | | | LC |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Lonchura punctulata</i> | Capucin damier | | NA ^a | | | | LC |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo altiloquus</i> | Viréo à moustaches, Piade | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo flavifrons</i> | Viréo à gorge jaune | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo griseus</i> | Viréo à œil blanc | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo olivaceus</i> | Viréo à œil rouge | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia musica</i> | Organiste louis-d'or, Avant-Noël | | VU | D1 | | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Cardellina canadensis</i> | Paruline du Canada | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis formosus</i> | Paruline du Kentucky | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis trichas</i> | Paruline masquée | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Helminthos vermivorus</i> | Paruline vermivore | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Mniotilta varia</i> | Paruline noire et blanche, Mi-deuil | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Oporornis agilis</i> | Paruline à gorge grise | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Oreothlypis peregrina</i> | Paruline obscure | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Oreothlypis ruficapilla</i> | Paruline à joues grises | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Parkesia motacilla</i> | Paruline hochequeue | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Parkesia noveboracensis</i> | Paruline des ruisseaux, Sylvette des ruisseaux | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Protonotaria citrea</i> | Paruline orangée | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Seiurus aurocapilla</i> | Paruline couronnée | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga americana</i> | Paruline à collier, Sylvette parula | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga caerulea</i> | Paruline bleue | | | | DD | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga cerulea</i> | Paruline azurée | | | | NA ^b | | VU |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga citrina</i> | Paruline à capuchon | | | | DD | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga coronata</i> | Paruline à croupion jaune | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga discolor</i> | Paruline des prés | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga dominica</i> | Paruline à gorge jaune | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga fusca</i> | Paruline à gorge orangée | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga magnolia</i> | Paruline à tête cendrée | | | | DD | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga palmarum</i> | Paruline à couronne rousse | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga pensylvanica</i> | Paruline à flancs marron | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga petechia</i> | Paruline jaune, Ti jaune | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga pinus</i> | Paruline des pins | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga plumbea</i> | Paruline caféïette, Caféïette | | LC | | | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga ruticilla</i> | Paruline flamboyante, Gabriel du feu | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga striata</i> | Paruline rayée | | | | LC | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga tigrina</i> | Paruline tigrée | | | | DD | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga virens</i> | Paruline à gorge noire | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Vermivora cyanoptera</i> | Paruline à ailes bleues | | | | NA ^b | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|--------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critères Liste rouge France | |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina caerulea</i> | Guiraca bleu | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina cyanea</i> | Passerin indigo | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Pheucticus ludovicianus</i> | Cardinal à poitrine rose, Grosbec à poitrine rose | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga olivacea</i> | Tangara écarlate | | | | DD | | LC |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga rubra</i> | Tangara vermillon | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Saltator albicollis</i> | Saltator gros-bec, Grive gros-bec | | | LC | | | LC |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Spiza americana</i> | Dickcissel d'Amérique | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Coerebidae | <i>Coereba flaveola</i> | Sucrier à ventre jaune, Falle jaune | | | LC | | | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Loxigilla noctis</i> | Sporophile rougegorge, Père noir | | | LC | | | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Sicalis luteola</i> | Sicale des savanes, Petit Serin | | | NA ^a | | | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Tiaris bicolor</i> | Sporophile cici, Cici-zèb | | | LC | | | LC |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | Goglu des prés | | | | DD | | LC |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus galbula</i> | Oriole de Baltimore | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus spurius</i> | Oriole des vergers | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Molothrus bonariensis</i> | Vacher luisant, Merle de Sainte-Lucie | | | | NA ^b | | LC |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Quiscalus lugubris</i> | Quiscale merle, Crédit | | | LC | | | LC |

Liste des sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Sous-espèce | Nom commun | Endémique Guadeloupe | Nicheurs | | Visiteurs | |
|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Catégorie Liste rouge France | Critère Liste rouge France | Catégorie Liste rouge France | Critère Liste rouge France |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Pandion haliaetus</i> | <i>Ssp. carolinensis</i> | | | | | LC | |
| Accipitriformes | Accipitridae | <i>Pandion haliaetus</i> | <i>Ssp. ridgwayi</i> | | | RE | | | |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius phaeopus</i> | <i>Ssp. hudsonicus</i> | Courlis hudsonien | | | | VU | D1 |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius phaeopus</i> | <i>Ssp. phaeopus</i> | | | | | NA ^b | |

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France.

Tous les résultats sont disponibles sur :

www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/recherche>

Chapitre Oiseaux de Guadeloupe

Liste des experts et des contributeurs

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Yoann Allanic (SPN / MNHN), Aurore Cavrois (UICN France), Patrick Haffner (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Compilation des données et pré-évaluations - Anthony Levesque (ONCFS)

Comité d'évaluation - Experts : Nicolas Barré (AEVA), Frantz Duzont (AMAZONA), Philippe Feldmann (AEVA), Béatrice Ibéné (ASFA), Gilles Leblond (BIOS), Anthony Levesque (ONCFS), Guy Van Laere (Parc national de la Guadeloupe) ; Evaluateurs Liste rouge : Patrick Haffner (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

EX : Espèce éteinte au niveau mondial

RE : Espèce disparue de Guadeloupe

Espèces menacées de disparition de Guadeloupe

CR En danger critique

EN En danger

VU Vulnérable

Autres catégories

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de Guadeloupe est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en Guadeloupe de manière occasionnelle ou marginale)

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2,... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Tyran jameau → Catégorie VU ; Critère D1

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Pic de la Guadeloupe → Catégorie NT ; Critère pr. B2ab(iii)

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau de la Guadeloupe a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. l'Aigrette bleue → Catégorie EN ; Critère CR (D) (-1)

Citation des résultats : UICN France, MNHN, AMAZONA, AEVA, ASFA & ONCFS (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de Guadeloupe. Dossier électronique.

La Liste rouge des espèces menacées en France



Le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est le réseau des organismes et des experts de l'UICN en France. Regroupant au sein d'un partenariat original 2 ministères, 13 organismes publics et 40 organisations non-gouvernementales, il joue un rôle de plate-forme d'expertise et de concertation pour répondre aux enjeux de la biodiversité.

Le Comité français de l'UICN rassemble également un réseau de plus de 250 experts répartis en cinq commissions thématiques, dont la Commission de sauvegarde des espèces qui réunit 130 spécialistes. L'UICN International a développé la méthodologie de référence pour guider les pays dans l'élaboration de leur Liste rouge nationale des espèces menacées.

www.uicn.fr



**Muséum
national
d'Histoire
naturelle**

Le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) est un établissement public à caractère scientifique et culturel, placé sous la double tutelle des Ministères de la recherche et de l'écologie. Ses missions incluent la recherche, la gestion des collections, l'expertise et la diffusion des connaissances.

Le Service du patrimoine naturel du MNHN est responsable de la conduite scientifique de l'inventaire du patrimoine naturel en France. Pour réaliser cette mission, il développe une base de données nationale sur la nature rassemblant des informations sur les espèces présentes sur le territoire. Institution de renommée internationale, le MNHN dispose grâce aux travaux de ses scientifiques d'une expertise reconnue sur la biodiversité et sa conservation.

www.mnhn.fr

Chapitre Oiseaux de Guadeloupe réalisé en partenariat avec :



L'Association des amateurs amicaux des oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) est une association de protection de la nature créée en novembre 1998. Elle a pour mission l'observation, l'étude et la protection des oiseaux en Guadeloupe, ainsi que la formation et la sensibilisation du public à la découverte de l'ornithologie. Dans ce but, l'association publie des rapports d'étude sur l'avifaune guadeloupéenne et organise de nombreuses activités de terrains (observations, baguages, suivi des populations...).

www.amazona-guadeloupe.com



L'Association pour l'étude et la protection des vertébrés et végétaux des Petites Antilles (AEVA) a été créée en 1993 pour instaurer un pôle d'échanges d'informations et œuvrer à la connaissance et à la protection des vertébrés dans les Petites Antilles. En 2000, son champ de compétences a été étendu à la flore sauvage. L'association mène des activités à trois niveaux, dans les domaines de la science (publications scientifiques, congrès...), de la vulgarisation (sorties, exposés, blog...) et de la conservation (participation à des commissions, actions militantes...).

www.association-aeva.com



L'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) a été créée en 2003. Elle s'est donnée pour objectifs d'étudier et d'améliorer la connaissance scientifique de la faune sauvage de la Guadeloupe et de sensibiliser les scolaires et la population à la diversité, à l'utilité et à la fragilité de la faune et des habitats naturels. L'association a également pour missions d'alerter les autorités et les pouvoirs publics sur les menaces qui pèsent sur les communautés animales sauvages de l'archipel et d'œuvrer à la création d'un centre de sauvegarde de la faune sauvage en Guadeloupe.

www.faune-guadeloupe.com



L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un établissement public de l'Etat qui, selon l'article L421-1 du code de l'Environnement, a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage. Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage, en particulier sur les espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée. Au travers de sa délégation inter régionale outre-mer (DIROM), l'ONCFS est présent dans 7 départements ou collectivités d'outre-mer.

www.oncfs.gouv.fr

Avec le soutien de :

