



# PELOUSES DE L'EGLISE ET DU CHEMIN BLANC (Identifiant national : 110001665)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91629002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), .- 110001665, PELOUSES DE L'EGLISE ET DU CHEMIN BLANC.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001665.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France  
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)  
Centroïde calculé : 598227°-2376774°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003  
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	21
9. SOURCES .....	24

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Valpuiseaux (INSEE : 91629)

### 1.2 Superficie

32,69 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80  
Maximale (mètre): 120

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se subdivise en deux noyaux situés au nord du réseau de pelouses sèches du Gâtinais. Son intérêt phyto-écologique a été considéré exceptionnel en 1991.

Le noyau correspondant au lieu-dit " l'Eglise " est le plus richement diversifié, tant pour les formations végétales qui y sont présentes que par les espèces qu'il abrite. L'autre noyau, " le Chemin Blanc ", garde malgré tout un intérêt notable car des espèces protégées y ont été observées en 1991.

Au total, 19 espèces déterminantes, dont 6 protégées au niveau régional, sont présentes sur ce site.

L'une d'elles, l'Hutchinsie (*Hornungia petraea*, PR) est présente au niveau de groupements pionniers à l'ouest de la ZNIEFF (carrière de sables de Fontainebleau), mais également sur les rochers calcaires affleurant. Ces groupements sont le plus souvent en mosaïque avec les pelouses sablo-calcaires. Les espèces déterminantes les plus remarquables que l'on y rencontre sont le Buplèvre aristé (*Bupleurum baldense*, TR), l'Anémone pulsatile (*Pulsatilla vulgaris*, AR) ou l'Armoise champêtre (*Artemisia vulgaris*, AR).

La particularité du noyau ouest tient à la grande superficie de sa pelouse xérophile, malheureusement très fréquentée. Elle offre malgré tout un cortège bien caractéristique enrichi par la présence de la Trinie glauque (*Trinia glauca*), protégée au niveau régional et de la Véronique couchée (*Veronica prostrata*, R).

Les pelouses méso-xérophiles et mésophiles se retrouvent dans les deux noyaux et abritent notamment la Cardoncelle molle (*Carduncellus mitissimus*), protégée en Ile-de-France et l'Orchis brûlée (*Orchis ustulata*, TR). Par contre, le Lin français (*Linum leonii*), la Violette des sables (*Viola rupestris*) et l'Ophrys petite-araignée (*Ophrys sphegodes* subsp. *araneola*), toutes trois protégées au niveau régional, ne se retrouvent que sur le noyau ouest.

Les orchidées, des plus communes aux rares sont également bien représentées sur ces types de pelouse.

Le reste des espèces déterminantes se trouve dans les formations d'ourlets, on y note le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*, R), le Mélampyre à crêtes (*Melampyrum cristatum*, AR) et une belle population de Phalangère rameuse (*Anthericum ramosum*, R) au niveau des pré-bois très clairs de Pins sylvestres du noyau situé à l'est.

La vaste pelouse rase du noyau Ouest est tout à fait favorable à une population abondante de criquets et tout particulièrement le Criquet des grouettes (*Omocestus petraeus*) et le Criquet rouge-queue (*Omocestus haemorrhoidalis*). C'est le seul site à réunir ces deux espèces gravement menacées d'extinction et tributaires de ces vastes pelouses rases. Autres éléments remarquables et peu rencontrés ailleurs, le Fourmilion longicorne (*Distoleon tetragrammicus*), espèce xérophile menacée par la disparition des milieux ouverts, et la Mantispe styrienne (*Mantispa styriaca*), également dépendante de pelouses xérophiles mais surtout de pineraies claires à Pins sylvestres.

Les Lépidoptères menacés forment un cortège souvent rencontré sur les sites du Gâtinais mais néanmoins bon indicateur de pelouses ouvertes. Citons les plus remarquables, à savoir la Zygène de la Bruyère (*Zygaena fausta*) et le Flambé (*Iphiclidus podalirius*) parmi les protégés au niveau régional ou encore l'Arlequinette jaune (*Emmelia trabealis*), en forte régression en Ile-de-France.

La liste des Coléoptères observés en 1996 est par contre décevante : seul le Tenebrionidae *Asida sabulosa* (en Liste Rouge Ile-de-France) est typique des pelouses rases.

Les menaces principales qui pèsent sur cette ZNIEFF sont de deux types : une surfréquentation à l'ouest (village de Valpuseaux proche) et une rudéralisation du noyau Est.

La menace de fermeture des pelouses est également importante.

## Géologie

Feuille Malesherbes. Partie haute : calcaire d'Etampes, partie basse : sable avec colluvions de calcaire.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

Site proposé pour une intégration au futur Réseau Natura 2000

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

Entrepôt de matériel agricole, labour

Habitat précaire

Ligne haute tension

Terrain de football

### 1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau

*Commentaire sur la géomorphologie*

Plateau et coteau de vallées sèches (Vallée Jaclos à l'ouest et Veau Gireau au sud)

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

#### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le noyau ouest de la ZNIEFF est limité par des cultures qui le bordent au sud, à l'est et à l'ouest. Au nord, la répartition des formations végétales est limitée par le village de Valpuiseaux.

Le noyau situé à l'est est simplement limité par les cultures qui l'entourent.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

#### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			10	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			5	
	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>			15	

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			15	
	34.5 <i>Pelouses méditerranéennes xériques</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			5	
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			15	
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			35	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	52089	<i>Distoleon tetragrammicus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Fourmillion longicorne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1994
	52124	<i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761)		Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1994
Coléoptères	11965	<i>Asida sabulosa</i> (Fuessly, 1775)	<i>Asida, Asida des sables</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
Lépidoptères	416992	<i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle trapue (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	249383	<i>Archanara sparganii</i> (Esper, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
	249363	<i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, 1809)	<i>Nonagrie fluide (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1994
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	345689	<i>Luperina nickerlii</i> (Freyer, 1845)	<i>Lupérine de la Fêtuque (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1997
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1997
	219768	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1998
	416995	<i>Sideridis albicolon</i> Hübner, 1813	Tréma blanc (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1997
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Petite coronille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	247057	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
Orthoptères	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des jachères	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
	66134	<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	Criquet des Pins	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	Ephippigère des vignes	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996
	66172	<i>Euchorthippus pulvinatus gallicus</i> Maran, 1957		Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
	65721	<i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté</i> , <i>Gomphocère double-signé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BIOTOPE				1996
	66085	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet rouge-queue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
	66086	<i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856)	<i>Criquet des friches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène</i> , <i>Sténobothre ligné</i> , <i>Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
Phanérogames	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse</i> , <i>Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	<i>Buplèvre du mont Baldo</i> , <i>Buplèvre aristé</i> , <i>Buplèvre opaque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	<i>Carthame très doux</i> , <i>Cardoncelle molle</i> , <i>Cardoncelle très douce</i> , <i>Mitine</i> , <i>Petit chardon sans épines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Hornungie des rochers, Hutchinsie des rochers, Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838	<i>Lin de Léon, Lin d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane fluette, Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1991
	110344	<i>Ophrys araneola</i> Rchb., 1830	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	111012	<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	<i>Néotinée brûlée, Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	<i>Silène otités, Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Trinie glauque, Trinie commune, Trinie vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	128975	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	<i>Véronique prostrée, Véronique couchée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	129674	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791	<i>Violette rupestre, Violette des sables, Violette des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	249210	<i>Agrotis cinerea</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle Cendrée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1997
	248526	<i>Cataclysmes riguada</i> (Hübner, 1813)	Veinée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	248550	<i>Colostygia multistrigaria</i> (Haworth, 1809)	Cidarie pointillée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1998
	249667	<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	249171	<i>Euxoa aquilina</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle Aquiline (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1992
	249179	<i>Euxoa obelisca</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle Obélisque (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	810173	<i>Peribatodes manuelaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852)		Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	248736	<i>Perizoma minorata</i> (Treitschke, 1828)	Périsome de l'Euphrase (La), Périsome grisâtre (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
Orthoptères	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	<i>Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	83953	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	<i>Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	<i>Bombycilène dressée, Micrope dressé, Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Cotonnière dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Laîche caryophyllée, Laîche printanière, Laîche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	<i>Laîche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89232	<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	<i>Carthame laineux</i> , <i>C. Faux safranentaurée laineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89415	<i>Caucalis platycarpus</i> L., 1753	<i>Caucalide à fruits larges</i> , <i>Caucalis à fruits larges</i> , <i>Caucalide à fruits aplatis</i> , <i>Caucalide à feuilles de carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89574	<i>Centaurea cyanus</i> L., 1753	<i>Bleuet des moissons</i> , <i>Bleuet</i> , <i>Barbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée trompeuse</i> , <i>Centaurée décevante</i> , <i>Centaurée de Debeaux</i> , <i>Centaurée des prés</i> , <i>Centaurée du Roussillon</i> , <i>Centaurée des bois</i> , <i>Centaurée d'Endress</i> , <i>Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89704	<i>Centaurea serotina</i> Boreau, 1857	<i>Centaurée trompeuse</i> , <i>Centaurée décevante</i> , <i>Centaurée de Debeaux</i> , <i>Centaurée des prés</i> , <i>Centaurée du Roussillon</i> , <i>Centaurée des bois</i> , <i>Centaurée d'Endress</i> , <i>Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs,</i> <i>Céphalanthère pâle,</i> <i>Céphalanthère blanche,</i> <i>Elléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	<i>Coronille naine,</i> <i>Petite coronille,</i> <i>Coronille mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	93621	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute du thym,</i> <i>Cuscute à petites fleurs,</i> <i>Petite cuscute</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	<i>Œillet des Chartreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactide rouge sombre,</i> <i>Épipactis rouge sombre,</i> <i>Épipactis brun rouge,</i> <i>Épipactis pourpre noirâtre,</i> <i>Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque marginée,</i> <i>Fétuque de Timbal-Lagrange</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	98582	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930	<i>Fétuque durette,</i> <i>Fétuque à poils courts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana couché,</i> <i>Hélianthème couché,</i> <i>Fumana à tiges retombantes,</i> <i>Fumana commun,</i> <i>Hélianthème nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99139	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809	<i>Fumeterre de Vaillant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	99511	<i>Galium pumilum</i> Murray, 1770	<i>Gaillet nain, Gaillet couché, Gaillet rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	99986	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	<i>Gentianelle d'Allemagne, Gentiane d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne				1999
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Herbe à becquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	101026	<i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schtdl., 1813	<i>Hélianthème soufré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	<i>Héliotrope d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	104629	<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813	<i>Koélérie glauque, Koélérie des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	104644	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	<i>Koélérie à grandes fleurs, Koélérie grêle, Koélérie à grosses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Laitue vivace, Bézègue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	105410	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	Légousie miroir-de-Vénus, Miroir-de-Vénus, Spéculaire miroir-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	106379	<i>Lithospermum arvense</i> L., 1753	Fausse buglosse des champs, Grémil des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	106685	<i>Lotus maritimus</i> L., 1753	Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Téragonolobe maritime	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	107610	<i>Medicago falcata</i> L., 1753	Luzerne en faux, Luzerne sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	Mélampyre à crête, Mélampyre à crêtes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	Mibore minime, Petite mibore, Mibore de printemps, Mibore naine, Mibora naine, Famine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	108769	<i>Monotropa hypophegea</i> Wallr., 1822	Monotrope sucepin, Sucepin, Hypopitys monotrope	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110211	<i>Ononis natrix</i> L., 1753	<i>Bugrane gluante</i> , <i>Bugrane jaune</i> , <i>Bugrane féide</i> , <i>Coquesigrue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	138347	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphgodes</i>	<i>Ophrys araignée</i> , <i>Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i> , <i>Orchis casque</i> , <i>Orchis brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole fausse fléole</i> , <i>Fléole de Boehmer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	113953	<i>Plantago scabra</i> Moench, 1794	<i>Plantain des sables</i> , <i>Plantain scabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Platanthère à fleurs verdâtres</i> , <i>Orchis vert</i> , <i>Orchis verdâtre</i> , <i>Platanthère des montagnes</i> , <i>Platanthère verdâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	114112	<i>Poa angustifolia</i> L., 1753	<i>Pâturin à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	Sceau-de-Salomon odorant, <i>Polygonate officinal</i> , Sceau-de-Salomon officinal	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775	Brunelle à grandes fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Pulsatille commune, <i>Anémone pulsatille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier agreste, Rosier des haies, Églantier agreste	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	Rosier tomenteux, Églantier tomenteux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	Silène conique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	Épiaire annuel	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	125585	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821	Pissenlit à fruits rouges, Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde, Germandrée en grappe, Germandrée femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	<i>Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	<i>Tordyle élevé, Tordyle majeur, Grand tordyle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	141810	<i>Tragopogon dubius</i> subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm., 1914	<i>Salsifis douteux, Grand salsifis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	128470	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809	<i>Valérianelle à fruits laineux, Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	142140	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972	<i>Véronique germandrée, Véronique faux petit-chêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	128970	<i>Veronica praecox</i> All., 1789	<i>Véronique précoce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	130022	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824	<i>Vulpie membraneuse, Vulpie des dunes, Vulpie à longues soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81878 <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
83953 <i>Artemisia campestris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955		Reproduction certaine ou probable	
87027 <i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88052 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88582 <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758		Reproduction certaine ou probable	
89232 <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89415 <i>Caucalis platycarpus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89574 <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89579 <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	
89704 <i>Centaurea serotina</i> Boreau, 1857		Reproduction certaine ou probable	
92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756		Reproduction certaine ou probable	
93621 <i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
94716 <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
98582 <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930		Reproduction certaine ou probable	
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	
99139 <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809		Reproduction certaine ou probable	
99511 <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770		Reproduction certaine ou probable	
99986 <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912		Reproduction certaine ou probable	
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
101026 <i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schtdl., 1813		Reproduction certaine ou probable	
101144 <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104644 <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824		Reproduction certaine ou probable	
104764 <i>Lactuca perennis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
105410 <i>Legousia speculum- veneris</i> (L.) Chaix, 1785		Reproduction certaine ou probable	
106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	
106306 <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838		Reproduction certaine ou probable	
106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106379 <i>Lithospermum arvense</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106685 <i>Lotus maritimus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
108477 <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818		Reproduction certaine ou probable	
110211 <i>Ononis natrix</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110221 <i>Ononis pusilla</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
110344 <i>Ophrys araneola</i> Rchb., 1830		Reproduction certaine ou probable	
110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
111012 <i>Orchis ustulata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113953 <i>Plantago scabra</i> Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
114612 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906		Reproduction certaine ou probable	
115993 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812		Reproduction certaine ou probable	
118557 <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123448 <i>Silene conica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
124741 <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
125585 <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821		Reproduction certaine ou probable	
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126566 <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127595 <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
128470 <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809		Reproduction certaine ou probable	
128970 <i>Veronica praecox</i> All., 1789		Reproduction certaine ou probable	
128975 <i>Veronica prostrata</i> L., 1762		Reproduction indéterminée	
129674 <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791		Reproduction certaine ou probable	
130022 <i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824		Reproduction certaine ou probable	
141810 <i>Tragopogon dubius</i> subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm., 1914		Reproduction certaine ou probable	
142140 <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972		Reproduction certaine ou probable	

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BIOTOPE	1996	
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1992	Les pelouses calcicoles de l'Essonne, Inventaire écologique, 1ère partie. NaturEssonne, Longpont/Orge.
	MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.	1997	Etude entomologique des pelouses sèches de l'Essonne.
	MOTHIRON P.	1997	Noctuelles. In : Contribution à la connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté des Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1. Alexanor, 19, supplément hors-série.
	STEUNOU M., URBANO S.	1998	Inventaire des sites naturels d'intérêt majeur en Essonne - Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine. NaturEssonne, Longpont/Orge
Informateur	Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)		
	LUQUET G.-C.		
	NaturEssonne		
	NaturEssonne (SABOURIN G.)		