



PELOUSES DE L'EGLISE ET DU CHEMIN BLANC (Identifiant national : 110001665)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91629002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), .- 110001665, PELOUSES DE L'EGLISE ET DU CHEMIN BLANC.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001665.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroides calculé : 598453°-2376817°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 19 |
| 9. SOURCES | 22 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Valpuiseaux (INSEE : 91629)

1.2 Superficie

32,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se subdivise en deux noyaux situés au nord du réseau de pelouses sèches du Gâtinais. Son intérêt phyto-écologique a été considéré exceptionnel en 1991.

Le noyau correspondant au lieu-dit " l'Eglise " est le plus richement diversifié, tant pour les formations végétales qui y sont présentes que par les espèces qu'il abrite. L'autre noyau, " le Chemin Blanc ", garde malgré tout un intérêt notable car des espèces protégées y ont été observées en 1991.

Au total, 19 espèces déterminantes, dont 6 protégées au niveau régional, sont présentes sur ce site.

L'une d'elles, l'Hutchinsie (*Hornungia petraea*, PR) est présente au niveau de groupements pionniers à l'ouest de la ZNIEFF (carrière de sables de Fontainebleau), mais également sur les rochers calcaires affleurant. Ces groupements sont le plus souvent en mosaïque avec les pelouses sablo-calcaires. Les espèces déterminantes les plus remarquables que l'on y rencontre sont le Buplèvre aristé (*Bupleurum baldense*, TR), l'Anémone pulsatile (*Pulsatilla vulgaris*, AR) ou l'Armoise champêtre (*Artemisia vulgaris*, AR).

La particularité du noyau ouest tient à la grande superficie de sa pelouse xérophile, malheureusement très fréquentée. Elle offre malgré tout un cortège bien caractéristique enrichi par la présence de la Trinie glauque (*Trinia glauca*), protégée au niveau régional et de la Véronique couchée (*Veronica prostrata*, R).

Les pelouses méso-xérophiles et mésophiles se retrouvent dans les deux noyaux et abritent notamment la Cardoncelle molle (*Carduncellus mitissimus*), protégée en Ile-de-France et l'Orchis brûlée (*Orchis ustulata*, TR). Par contre, le Lin français (*Linum leonii*), la Violette des sables (*Viola rupestris*) et l'Ophrys petite-araignée (*Ophrys sphegodes* subsp. *araneola*), toutes trois protégées au niveau régional, ne se retrouvent que sur le noyau ouest.

Les orchidées, des plus communes aux rares sont également bien représentées sur ces types de pelouse.

Le reste des espèces déterminantes se trouve dans les formations d'ourlets, on y note le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*, R), le Mélampyre à crêtes (*Melampyrum cristatum*, AR) et une belle population de Phalangère rameuse (*Anthericum ramosum*, R) au niveau des pré-bois très clairs de Pins sylvestres du noyau situé à l'est.

La vaste pelouse rase du noyau Ouest est tout à fait favorable à une population abondante de criquets et tout particulièrement le Criquet des grouettes (*Omocestus petraeus*) et le Criquet rouge-queue (*Omocestus haemorrhoidalis*). C'est le seul site à réunir ces deux espèces gravement menacées d'extinction et tributaires de ces vastes pelouses rases. Autres éléments remarquables et peu rencontrés ailleurs, le Fourmilion longicorne (*Distoleon tetragrammicus*), espèce xérophile menacée par la disparition des milieux ouverts, et la Mantispe styrienne (*Mantispa styriaca*), également dépendante de pelouses xérophiles mais surtout de pineraies claires à Pins sylvestres.

Les Lépidoptères menacés forment un cortège souvent rencontré sur les sites du Gâtinais mais néanmoins bon indicateur de pelouses ouvertes. Citons les plus remarquables, à savoir la Zygène de la Bruyère (*Zygaena fausta*) et le Flambé (*Iphiclidus podalirius*) parmi les protégés au niveau régional ou encore l'Arlequinette jaune (*Emmelia trabealis*), en forte régression en Ile-de-France.

La liste des Coléoptères observés en 1996 est par contre décevante : seul le Tenebrionidae *Asida sabulosa* (en Liste Rouge Ile-de-France) est typique des pelouses rases.

Les menaces principales qui pèsent sur cette ZNIEFF sont de deux types : une surfréquentation à l'ouest (village de Valpuseaux proche) et une rudéralisation du noyau Est.

La menace de fermeture des pelouses est également importante.

Géologie

Feuille Malesherbes. Partie haute : calcaire d'Etampes, partie basse : sable avec colluvions de calcaire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

Site proposé pour une intégration au futur Réseau Natura 2000

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Entrepôt de matériel agricole, labour

Habitat précaire

Ligne haute tension

Terrain de football

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Plateau et coteau de vallées sèches (Vallée Jaclos à l'ouest et Veau Gireau au sud)

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames | | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le noyau ouest de la ZNIEFF est limité par des cultures qui le bordent au sud, à l'est et à l'ouest. Au nord, la répartition des formations végétales est limitée par le village de Valpuiseaux.

Le noyau situé à l'est est simplement limité par les cultures qui l'entourent.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | <ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i> | | | 10 | |
| | 34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i> | | | 5 | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i> | | | 15 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | 15 | |
| | 34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.5 <i>Pelouses méditerranéennes xériques</i> | | | | |
| | 31.87 <i>Clairières forestières</i> | | | | |
| | 43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i> | | | 35 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 15 | |
| | 34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres insectes | 52089 | <i>Distoleon tetragrammicus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Fourmillion longicorne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1994 |
| | 52124 | <i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1994 |
| Coléoptères | 11965 | <i>Asida sabulosa</i> (Fuessly, 1775) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph. | | | | 1996 |
| Lépidoptères | 416992 | <i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1803) | <i>Noctuelle trapue (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1996 |
| | 249383 | <i>Archanara sparganii</i> (Esper, 1790) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1996 |
| | 53370 | <i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph. | | | | 1996 |
| | 249363 | <i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, 1809) | <i>Nonagrie fluide (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1994 |
| | 54475 | <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Flambé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1996 |
| | 345689 | <i>Luperina nickerlii</i> (Freyer, 1845) | <i>Lupérine de la Fêtuque (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1997 |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 219767 | <i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1997 |
| | 219768 | <i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761) | Argus bleu-nacré (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1998 |
| | 416995 | <i>Sideridis albicolon</i> Hübner, 1813 | Tréma blanc (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1997 |
| | 247044 | <i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767) | Zygène de la Petite coronille (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1996 |
| | 247057 | <i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780) | Zygène transalpine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1996 |
| Orthoptères | 66136 | <i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825) | Criquet des jachères | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1998 |
| | 66134 | <i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848) | Criquet des Pins | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph. | | | | 1996 |
| | 65649 | <i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784) | Ephippigère des vignes | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1996 |
| | 66172 | <i>Euchorthippus pulvinatus gallicus</i> Maran, 1957 | Criquet glauque | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1998 |
| | 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph. | | | | 1996 |
| | 65721 | <i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830) | Decticelle bicolore | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 66121 | <i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815) | <i>Gomphocère tacheté</i> , <i>Gomphocère double-signé</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : BIOTOPE | | | | 1996 |
| | 66085 | <i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825) | <i>Criquet rouge-queue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1998 |
| | 66086 | <i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856) | <i>Criquet des friches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1998 |
| | 65711 | <i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825) | <i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqueté</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph. | | | | 1996 |
| | 66100 | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796) | <i>Criquet de la Palène</i> , <i>Sténobothre ligné</i> , <i>Criquet du Brachypode</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUQUET G.-C. | | | | 1998 |
| Phanérogames | 82909 | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | <i>Phalangère rameuse</i> , <i>Anthéricum ramifié</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 87027 | <i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764 | <i>Buplèvre du Mont Baldo</i> , <i>Buplèvre opaque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 87652 | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | <i>Campanule agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 88052 | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | <i>Cardoncelle mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 103019 | <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838 | <i>Hornungie des pierres</i> , <i>Hutchinsie des pierres</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté</i> , <i>Limodore sans feuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106306 | <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838 | Lin des Alpes, Lin français | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 110221 | <i>Ononis pusilla</i> L., 1759 | Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1991 |
| | 110344 | <i>Ophrys araneola</i> Rchb., 1830 | Ophrys araignée, Oiseau-coquet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 111012 | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | Orchis brûlé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 123577 | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799 | Silène cure-oreille, Silène à oreillettes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 127595 | <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827 | Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 128975 | <i>Veronica prostrata</i> L., 1762 | Véronique prostrée, Véronique couchée | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 129674 | <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791 | Violette des sables, Violette rupestre, Violette des rochers | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 249210 | <i>Agrotis cinerea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Noctuelle Cendrée (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 248526 | <i>Cataclysmes riguada</i> (Hübner, 1813) | Veinée (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1996 |
| | 248550 | <i>Colostygia multistrigaria</i> (Haworth, 1809) | Cidarie pointillée (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1998 |
| | 249667 | <i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763) | Arlequinette jaune (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1996 |
| | 249171 | <i>Euxoa aquilina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Noctuelle Aquiline (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1992 |
| | 249179 | <i>Euxoa obelisca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Noctuelle Obélisque (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOTHIRON P. | | | | 1996 |
| | 810173 | <i>Peribatodes manuelaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852) | Boarmie de l'Yeuse (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1996 |
| | 248736 | <i>Perizoma minorata</i> (Treitschke, 1828) | Périsome de l'Euphrase (La), Périsome grisâtre (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | | | 1996 |
| Orthoptères | 65944 | <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) | Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph. | | | | 1996 |
| | 66194 | <i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79816 | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 81520 | <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 | <i>Ail à tête ronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 81878 | <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759 | <i>Alysson à calice persistant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 83953 | <i>Artemisia campestris</i> L., 1753 | <i>Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 86136 | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | <i>Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, , Cotonnière dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 88582 | <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758 | <i>Laïche humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 89232 | <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753 | <i>Centauree laineuse, Faux Safran</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 89415 | <i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753 | <i>Caucalide, Caucalis à fruits aplatis, Caucalis à feuilles de Carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89574 | <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753 | Barbeau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 89579 | <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799 | Centaurée de Debeaux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 89704 | <i>Centaurea serotina</i> Boreau, 1857 | Centaurée de Debeaux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 89920 | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | Coronille naine, Coronille mineure | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 93621 | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 | Cuscute à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | Oeillet des Chartreux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 96432 | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 98358 | <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890 | Fétuque de Timbal-Lagrange | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 98582 | <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930 | Fétuque durette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99028 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | <i>Fumana</i> à tiges retombantes, <i>Fumana vulgaire</i> , <i>Hélianthème nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 99139 | <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809 | <i>Fumeterre de Vaillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 99511 | <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | <i>Gaillet rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 99986 | <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912 | <i>Gentianelle d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NaturEssonne | | | | 1999 |
| | 100149 | <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753 | <i>Géranium sanguin</i> , <i>Sanguinaire</i> , <i>Herbe à becquet</i> , <i>Bec de grue</i> , | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 100338 | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune</i> , <i>Globulaire vulgaire</i> , <i>Globulaire ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 101026 | <i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schltld., 1813 | <i>Hélianthème soufré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 101144 | <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | <i>Héliotrope d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 104629 | <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813 | <i>Koélérie glauque</i> , <i>Koélérie des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104644 | <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824 | Koélérie grêle, Koélérie à grandes fleurs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 104764 | <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | Laitue vivace, Lâche | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 105410 | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 106346 | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 106379 | <i>Lithospermum arvense</i> L., 1753 | Charée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 106685 | <i>Lotus maritimus</i> L., 1753 | Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 107610 | <i>Medicago falcata</i> L., 1753 | Luzerne sauvage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 107790 | <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753 | Mélampyre à crêtes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 108477 | <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818 | Mibora naine, Famine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 108769 | <i>Monotropa hypophegea</i> Wallr., 1822 | Monotrope du Hêtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 110211 | <i>Ononis natrix</i> L., 1753 | Bugrane jaune, Bugrane fétide | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 138347 | <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphgodes</i> | <i>Ophrys araignée</i> , <i>Oiseau-coquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 110987 | <i>Orchis simia</i> Lam., 1779 | <i>Orchis singe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 113219 | <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880 | <i>Fléole de Boehmer</i> , <i>Fléole fausse Fléole</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 113953 | <i>Plantago scabra</i> Moench, 1794 | <i>Plantain scabre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Orchis vert</i> , <i>Orchis verdâtre</i> , <i>Platanthère à fleurs verdâtres</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 114112 | <i>Poa angustifolia</i> L., 1753 | <i>Pâturin à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 114612 | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906 | <i>Sceau de salomon odorant</i> , <i>Polygonate officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 115993 | <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775 | <i>Brunelle à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Pulsatille vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies,</i> <i>Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 118329 | <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812 | <i>Rosier à petites fleurs,</i> <i>Églantier à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 118557 | <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800 | <i>Rosier tomenteux,</i> <i>Églantier tomenteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse,</i> <i>Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 123448 | <i>Silene conica</i> L., 1753 | <i>Silène conique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 124741 | <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763 | <i>Épiaire annuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 125585 | <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821 | <i>Pissenlit gracile,</i> <i>Pissenlit à feuilles lisses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 125976 | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée botryde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 126566 | <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753 | <i>Thym commun,</i> <i>Thym faux Pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 126837 | <i>Tordylium maximum</i> L., 1753 | <i>Tordyle majeur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 141810 | <i>Tragopogon dubius</i> subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm., 1914 | <i>Salsifis pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 128470 | <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809 | <i>Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 142140 | <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972 | <i>Teucride d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |
| | 128970 | <i>Veronica praecox</i> All., 1789 | <i>Véronique précoce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| | 130022 | <i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824 | <i>Vulpie à une seule glume, Vulpie des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère) | | | | 1991 |
| Ptéridophytes | 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S. | | | | 1998 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Angiospermes | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 81878 <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 83953 <i>Artemisia campestris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 87027 <i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 88052 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 88582 <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 89232 <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 89415 <i>Caucalis platycarpus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 89574 <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 89579 <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 89704 <i>Centaurea serotina</i> Boreau, 1857 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 93621 <i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 94716 <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 98582 <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 99139 <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 99511 <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 99986 <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 101026 <i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schldl., 1813 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 101144 <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 104644 <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 104764 <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 105410 <i>Legousia speculum- veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106306 <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106379 <i>Lithospermum arvense</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106685 <i>Lotus maritimus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 108477 <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 110211 <i>Ononis natrix</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 110221 <i>Ononis pusilla</i> L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 110344 <i>Ophrys araneola</i> Rchb., 1830 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 111012 <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 113953 <i>Plantago scabra</i> Moench, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 114612 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 115993 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 118557 <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 123448 <i>Silene conica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 124741 <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 125585 <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 126566 <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 127595 <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 128470 <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 128970 <i>Veronica praecox</i> All., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 128975 <i>Veronica prostrata</i> L., 1762 | | Reproduction indéterminée | |
| 129674 <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 130022 <i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 141810 <i>Tragopogon dubius</i> subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm., 1914 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 142140 <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972 | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | BIOTOPE | 1996 | |
| | GAULTIER C. (Ecosphère) | 1992 | Les pelouses calcicoles de l'Essonne, Inventaire écologique, 1ère partie. NaturEssonne, Longpont/Orge. |
| | MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph. | 1997 | Etude entomologique des pelouses sèches de l'Essonne. |
| | MOTHIRON P. | 1997 | Noctuelles. In : Contribution à la connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté des Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1. Alexonor, 19, supplément hors-série. |
| | STEUNOU M., URBANO S. | 1998 | Inventaire des sites naturels d'intérêt majeur en Essonne - Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine. NaturEssonne, Longpont/Orge |
| Informateur | Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF) | | |
| | LUQUET G.-C. | | |
| | NaturEssonne | | |
| | NaturEssonne (SABOURIN G.) | | |