



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/210000140>



BOIS SUR GREVE ALLUVIALE DE BEAULIEU ENTRE JUVANZE ET JESSAINS (Identifiant national : 210000140)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 04970001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .-
210000140, BOIS SUR GREVE ALLUVIALE DE BEAULIEU ENTRE JUVANZE ET
JESSAINS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/210000140.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 765675°-2371292°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 06/12/2005

Date actuelle d'avis CSRPN : 06/12/2005

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 18 |
| 9. SOURCES | 19 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube
- Commune : Jessains (INSEE : 10178)
- Commune : Unienville (INSEE : 10389)
- Commune : Trannes (INSEE : 10384)
- Commune : Juvanzé (INSEE : 10183)

1.2 Superficie

91,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210002020](#) - GRAVIERES ABANDONNEES AU SUD-EST D'UNIENVILLE (Type 1) (Id reg. : 04970002)
- Id nat. : [210020015](#) - VALLÉE MOYENNE DE L'AUBE ENTRE BAR-SUR-AUBE ET BRIENNE-LA-VIEILLE (Type 2) (Id reg. : 04970000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des bois de Beaulieu et des gravières proches constitue un ensemble typique de la vallée de l'Aube situé entre les communes de Juvanzé et de Jessains, non loin du réservoir Aube. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la vallée moyenne de l'Aube entre Bar-sur-Aube et Brienne-la-Ville. Elle recense, au niveau du lit mineur de l'Aube et de sa terrasse alluviale (grèves calcaires), différents types de boisements, des gravières, des milieux palustres et des pelouses.

Les boisements sont de deux types :

- bois alluvial inondable à frêne, orme lisse, cerisier à grappes (tous les deux étant inscrits sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne), sureau à grappes, érable sycomore, saule blanc et groseillier rouge très abondant. Beaucoup d'espèces introduites s'y remarquent : perce-neige, faux pistachier, narcisse, etc.

- bois de terrasse peu ou pas inondable (classés, pour la typologie, dans la catégorie "autres bois décidus" du code CORINE biotopes) riche en hêtres, frênes, érables, bouleaux, tilleuls et pins sylvestres. Le cynoglosse d'Allemagne (rare en France et inscrit sur la liste rouge régionale) peut s'y rencontrer.

Certaines pelouses de faible étendue subsistent : elles sont dominées par les graminées (brome dressé, fétuque de Leman, brachypode penné) qu'accompagnent l'orobanche du thym (inscrite sur la liste rouge régionale), la globulaire, la laïche glauque, le thym serpolet, l'hippocrépide chevelu, l'épervière piloselle, la carline vulgaire et diverses orchidées (orchis mouche, orchis pourpre, listère ovale). Celles-ci se boisent naturellement et font place à des fruticées composées par le genévrier, la viorne mance, le prunellier épineux, le troène, le fusain d'Europe, etc.

Des roselières et très ponctuellement des magnocariçaies se rencontrent également sur le territoire de la ZNIEFF. De nombreuses gravières qui ne sont plus en exploitation ont été réaménagées en zones de pêche et de loisirs.

L'Aube traverse le site de part en part ; c'est à Beaulieu que se situe le barrage et le canal d'amenée qui permet de dévier une partie de la rivière vers le réservoir Aube. Ces aménagements ont eu pour conséquence directe de modifier le faciès du cours d'eau et d'offrir des conditions de milieux particulières, favorables à la nidification des oiseaux (poule d'eau, grèbe huppé, grèbe castagneux, martin pêcheur et bergeronnette des ruisseaux) ou/ et à leur alimentation (héron cendré, cincle plongeur). Le blongios nain se reproduit dans une petite roselière située au sud de la ZNIEFF (et qui a été intégrée au périmètre de celle-ci en 1999) : ce nicheur, très rare et en forte régression en Champagne-Ardenne, est inscrit à l'annexe I de la directive Oiseaux et à l'annexe II de la convention de Berne, il figure sur le livre rouge de la faune menacée en France (dans la catégorie "en danger de disparition

totale"). Les libellules sont également bien représentées le long de la rivière et au niveau des gravières. Deux espèces inscrites sur la liste rouge des Odonates de Champagne-Ardenne s'y remarquent, il s'agit du gomphe à pincés et du gomphe vulgaire.

Le site fait partie de la zone de Champagne humide et de ses grands lacs définie par la convention de Ramsar.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Industrie

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Vallée
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF sont celles des milieux les plus riches, entourés par les terres cultivées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Odonates | | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | 5 | |
| | 41.H <i>Autres bois caducifoliés</i> | | | 37 | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | 2 | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 32 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | 8 | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i> | | | 4 | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | 2 | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | 1 | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | 9 | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65225 | <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe vulgaire</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65249 | <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe à forceps</i> (Le), <i>Gomphe à pinces</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Butor blongios</i> , <i>Blongios nain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 93830 | <i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767 | <i>Cynoglosse d'Allemagne</i> , <i>Herbe d'Antal</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 111447 | <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800 | <i>Orobanche du thym</i> , <i>Orobanche blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 116109 | <i>Prunus padus</i> L., 1753 | <i>Cerisier à grappes</i> , <i>Putiet</i> , <i>Merisier à grappes</i> , <i>Putier</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 124845 | <i>Staphylea pinnata</i> L., 1753 | <i>Faux-pistachier</i> , <i>Staphylier penné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128171 | <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | <i>Orme lisse</i> , <i>Orme blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|---|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptéryx vierge</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65126 | <i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840) | <i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65165 | <i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naïade au corps vert</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | Petite nymphe au corps de feu (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Martin-pêcheur d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Passage, migration | | | | | |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Cincla plongeur | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Bergeronnette des ruisseaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Grèbe huppé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Grèbe castagneux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acénaie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80322 | <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753 | Pogagraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80334 | <i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753 | Marronnier d'Inde, Marronnier commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau verruqueux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Brachypode penné | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des bois, Brome des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | Brome érigé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | Buplèvre en faux, Percefeuille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | Campanule à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | Laïche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | Laïche jaunâtre, Laïche jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | Laïche faux-souchet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | Laïche des rives | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | Carlina commune, Chardon doré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91274 | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | Cirse sans tige | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | Cornouiller sanguin, Sanguine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92546 | <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | Coronille changeante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97183 | <i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753 | Vélar fausse-girolée, Fausse Girolée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97903 | <i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98334 | <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809 | <i>Fétuque de Léman</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99233 | <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753 | <i>Perce-neige, Goutte de lait, Clochette d'hiver, Galanthine, Galanthe des neiges</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100357 | <i>Globularia willkommii</i> Nyman, 1855 | <i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze, Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | <i>Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | <i>Liondent hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Grande Listère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110211 | <i>Ononis natrix</i> L., 1753 | <i>Bugrane jaune, Bugrane fétide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre, Grivollée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111533 | <i>Orobancha epithymum</i> DC., 1805 | <i>Orobanche du thym, Orobanche blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113435 | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841 | <i>Épicéa commun, Sérente</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114025 | <i>Platanus hybrida</i> Brot., 1804 | <i>Platane d'Espagne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois,</i> <i>Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | <i>Peuplier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115168 | <i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804 | <i>Peuplier grisard,</i> <i>Peuplier gris de l'Oise</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai,</i> <i>Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire,</i> <i>Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | <i>Chêne sessile,</i> <i>Chêne rouvre,</i> <i>Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé,</i> <i>Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | Groseillier rouge, Groseillier à grappes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | Robinier faux-acacia, Carouge | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | Saule blanc, Saule commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | Saule cendré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120260 | <i>Salix viminalis</i> L., 1753 | Osier blanc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | Scabieuse colombarie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | Solidage verge d'or, Herbe des Juifs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | Alouchier, Alisier blanc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | Rubanier dressé, Ruban-d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124417 | <i>Sparganium ramosum</i> Huds., 1778 | Rubanier dressé, Ruban-d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126564 | <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | <i>Thym précoce</i> , <i>Serpolet couchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | <i>Tilleul à petites feuilles</i> , <i>Tilleul des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | <i>Tilleul à grandes feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159879 | <i>Ulmus campestris</i> sensu 1 | <i>Petit orme</i> , <i>Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | <i>Cresson de cheval</i> , <i>Véronique des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129470 | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | <i>Petite pervenche</i> , <i>Violette de serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129482 | <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794 | <i>Dompte-venin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|--|--|---|
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 99233 | <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 93830 <i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 111447 <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 116109 <i>Prunus padus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 128171 <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | AVET J.L. | 1998 | Premier inventaire du peuplement d'Odonates du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. Pour le P.N.R.F.O., 14 pages + annexes |
| | DUVERGER E. | 1998 | Réalités et potentialités avifaunistiques de la rivière Aube. Rapport de stage, L.P.O. Champagne-Ardenne et Université de Provence, 21 pages + annexes |
| Informateur | COPPA Gennaro | | |
| | DIDIER Bernard | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | FAUVEL Bruno | | |