



MASSIF FORESTIER D'ARGONNE (Identifiant national : 210002009)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 01950000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN,
G.R.E.F.F.E., - 210002009, MASSIF FORESTIER D'ARGONNE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 60P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210002009.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 785120°-2479863°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/11/2005

Date actuelle d'avis CSRPN : 29/11/2005

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 6 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 6 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 7 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 7 |
| 6. HABITATS | 8 |
| 7. ESPECES | 10 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 59 |
| 9. SOURCES | 60 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Meuse
- Département : Ardennes
- Département : Marne
- Commune : Boureuilles (INSEE : 55065)
- Commune : Belleville-et-Châtillon-sur-Bar (INSEE : 08057)
- Commune : Croix-aux-Bois (INSEE : 08135)
- Commune : Châtrices (INSEE : 51138)
- Commune : Servon-Melzicourt (INSEE : 51533)
- Commune : Florent-en-Argonne (INSEE : 51253)
- Commune : Foucaucourt-sur-Thabas (INSEE : 55194)
- Commune : Brizeaux (INSEE : 55081)
- Commune : Senuc (INSEE : 08412)
- Commune : Boulton-aux-Bois (INSEE : 08075)
- Commune : Chatel-Chéhéry (INSEE : 08109)
- Commune : Falaise (INSEE : 08164)
- Commune : Quatre-Champs (INSEE : 08350)
- Commune : Futeau (INSEE : 55202)
- Commune : Claon (INSEE : 55116)
- Commune : Beffu-et-le-Morthomme (INSEE : 08056)
- Commune : Condé-lès-Autry (INSEE : 08128)
- Commune : Vouziers (INSEE : 08490)
- Commune : Vandy (INSEE : 08461)
- Commune : Passavant-en-Argonne (INSEE : 51424)
- Commune : Froidos (INSEE : 55199)
- Commune : Neuville-en-Argonne (INSEE : 55383)
- Commune : Grandpré (INSEE : 08198)
- Commune : Verrières (INSEE : 51610)
- Commune : Villers-en-Argonne (INSEE : 51632)
- Commune : Autrécourt-sur-Aire (INSEE : 55017)
- Commune : Rarécourt (INSEE : 55416)
- Commune : Apremont (INSEE : 08017)
- Commune : Cornay (INSEE : 08131)
- Commune : Briquenay (INSEE : 08086)
- Commune : Autry (INSEE : 08036)
- Commune : Lançon (INSEE : 08245)
- Commune : Termes (INSEE : 08441)
- Commune : Saint-Thomas-en-Argonne (INSEE : 51519)
- Commune : Binarville (INSEE : 51062)
- Commune : Islettes (INSEE : 55253)
- Commune : Marcq (INSEE : 08274)
- Commune : Ballay (INSEE : 08045)
- Commune : Noirval (INSEE : 08325)
- Commune : Olizy-Primat (INSEE : 08333)
- Commune : Chaudefontaine (INSEE : 51139)
- Commune : Beaulieu-en-Argonne (INSEE : 55038)
- Commune : Aubréville (INSEE : 55014)
- Commune : Lachalade (INSEE : 55266)
- Commune : Lavoye (INSEE : 55285)
- Commune : Montblainville (INSEE : 55343)
- Commune : Longwé (INSEE : 08259)
- Commune : Chevières (INSEE : 08120)
- Commune : Toges (INSEE : 08453)
- Commune : Sainte-Menehould (INSEE : 51507)
- Commune : Éclaires (INSEE : 51222)
- Commune : Waly (INSEE : 55577)
- Commune : Clermont-en-Argonne (INSEE : 55117)
- Commune : Neufour (INSEE : 55379)

- Commune : Varennes-en-Argonne (INSEE : 55527)
- Commune : Neuville-au-Pont (INSEE : 51399)
- Commune : Vienne-le-Château (INSEE : 51621)
- Commune : Moiremont (INSEE : 51370)

1.2 Superficie

41989,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140

Maximale (mètre): 299

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210013040](#) - ETANG DE SAINT-JUVIN (Type 1) (Id reg. : 00000403)
- Id nat. : [210013034](#) - ETANG DE LA GRANDE ROUILLIE ET ETANGS VOISINS A CHATRICES (Type 1) (Id reg. : 01950006)
- Id nat. : [210002010](#) - VALLON FORESTIER ET ETANGS DES BIEVRES A L'EST D'AUTRY (Type 1) (Id reg. : 01950001)
- Id nat. : [210020127](#) - PRAIRIES ET BOIS A L'EST DE LONGWE ET A L'OUEST DE LA CROIX-AUX-BOIS (Type 1) (Id reg. : 01950011)
- Id nat. : [210001123](#) - BOIS DE LA MAISON ROUGE AUX ALLEUX (Type 1) (Id reg. : 00000170)
- Id nat. : [210009347](#) - BOIS DE ROHAIS ET ETANG DE FLORENT-EN-ARGONNE (Type 1) (Id reg. : 01950004)
- Id nat. : [210002036](#) - FORET DOMANIALE DES HAUTS BATIS ET FORET DES PETITS BATIS DANS LE MASSIF FORESTIER D'ARGONNE (Type 1) (Id reg. : 01950002)
- Id nat. : [210015516](#) - BOIS, PELOUSES ET LANDES RELICTUELLES AU SUD-EST DE QUATRE-CHAMPS (Type 1) (Id reg. : 01950007)
- Id nat. : [210009873](#) - BOIS DE PLAIMONT A GRANDHAM (Type 1) (Id reg. : 00000386)
- Id nat. : [210015517](#) - PRAIRIES, PELOUSES ET BOIS ACIDOPHILES DE BOULT-AUX-BOIS (Type 1) (Id reg. : 01950008)
- Id nat. : [210002011](#) - BOIS DE HAM ET DU ROCAN A LONGWE (Type 1) (Id reg. : 01950003)
- Id nat. : [210002026](#) - MASSIF FORESTIER ET ETANGS DE BELVAL (Type 2) (Id reg. : 02120000)
- Id nat. : [210009882](#) - FORETS DOMANIALES DE TROIS FONTAINES, DE JEAN D'HEURS, DE LA HAIE RENAULT ET AUTRES BOIS DE MAURUPT A CHANCENAY (Type 2) (Id reg. : 03910000)
- Id nat. : [210020104](#) - VALLONS PRINCIPAL ET SECONDAIRES DU RUISSEAU DE LONGWE AU NORD-EST D'OLIZY-PRIMAT (Type 1) (Id reg. : 01950010)
- Id nat. : [210015515](#) - LANDES RELICTUELLES DE MARCQ ET CORNAY (Type 1) (Id reg. : 01950009)
- Id nat. : [210020169](#) - PRAIRIES SILICICOLES ET BOIS ACIDIPHILES AU NORD ET AU SUD DE BALLAY (Type 1) (Id reg. : 01950012)
- Id nat. : [210009842](#) - TALUS DE GAIZE DE VIENNE-LE-CHATEAU (Type 1) (Id reg. : 01950005)
- Id nat. : [210020177](#) - BOIS, MARAIS ET PRAIRIES A L'EST DE CERNAY-EN-DORMOIS, VILLE-SUR-TOUBE ET BERZIEUX (Type 2) (Id reg. : 05080000)
- Id nat. : [210020187](#) - BOIS DE VONCQ (Type 1) (Id reg. : 00000627)

1.5 Commentaire général

Le massif forestier d'Argonne est l'un des massifs les plus vastes de la région. Par son étendue, par son caractère typique, par la richesse de sa flore et de sa faune, ce massif se range parmi les sites majeurs de Champagne-Ardenne. Il constitue une vaste ZNIEFF de type II de 41 840 hectares, séparée en deux par la vallée de l'Aisne et située à la limite de trois départements : Marne, Ardennes et Meuse. Plusieurs ZNIEFF de type I sont incluses dans ce vaste massif et font l'objet de fiches séparées. Le massif est établi sur une couche géologique particulière, la gaize, roche siliceuse très dure constituée essentiellement à partir de minuscules fragments d'éponges. L'Argonne constitue un petit pays particulier au caractère submontagnard prononcé, composé de vastes forêts au sein d'une région de pacages et de cultures.

La végétation forestière est très typique et adaptée aux sols acides :

- chênaie-hêtraie acidiphile montagnarde sur les versants nord (à luzule blanche, luzule des bois, véronique officinale, canche flexueuse, etc.) et chênaie plus thermophile sur les versants sud (avec le sorbier des oiseleurs, le sorbier blanc, le néflier, la canche flexueuse, la mélitte à feuilles de mélisse, etc.),

- chênaie- hêtraie mésoneutrophile à mésotrophe (avec le charme, le sorbier des oiseleurs, le tilleul à petites feuilles, le merisier, le chèvrefeuille rampant, la laïche à racines nombreuses, l'anémone des bois) et chênaie-hêtraie acidiphile de plateau (avec la myrtille, la callune vulgaire, la fougère aigle, la molinie bleue, etc.). Les ourlets forestiers (Potentillo erectae-Holcion mollis, non répertorié dans la base de données du logiciel et codé dans la typologie sous l'appellation "groupements mésophiles de hautes herbes des clairières et lisières forestières") sont très intéressants avec notamment le gaillet des bois (espèce médioeuropéenne continentale, proche de sa limite d'aire régionale)

- en fond de vallon, en bas de pente et en périphérie de certains étangs, aulnaie-frênaie (et très localement aulnaie) avec, dans certains secteurs des ormes lisses de belle taille, le cassis (inscrits tous les deux sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne.

Ponctuellement, une végétation relictuelle de lande (Calluno-Genistion) subsiste (aux environs de Quatre-Champs, Marcq et Cornay). La première abrite: le genêt d'Allemagne est une espèce continentale protégée au niveau régional, rare en France (où elle n'existe guère que dans l'est et le centre du pays) et en très forte régression en Champagne-Ardenne (uniquement trois stations dans les Ardennes, avec celles de Toges et de Quatre-Champs, toutes dans un état très précaire)) et la bruyère cendrée, protégée au niveau régional (seule station connue des Ardennes), d'origine atlantique et très à l'est de sa limite normale de répartition (région parisienne).

Diverses zones prairiales complètent l'intérêt de la ZNIEFF, avec une flore caractéristique des prairies fraîches à humides, fauchées ou pâturées, ainsi que des pelouses oligotrophes relevant du Violon caninae.

Les étangs sont nombreux, les plus importants ont fait l'objet de fiches ZNIEFF de type I (étang de Florent-en-Argonne, étangs de Bièvres, étangs de Châtrices), certains sont aménagés pour la chasse, d'autres pour la pisciculture. Leur végétation comprend des roselières (à phragmite, massette à larges feuilles, massette à feuilles étroites, lycopode d'Europe, valériane officinale...) des magnocaricaies (à laïche des marais, laïche des rives, laïche vésiculeuse, laïche pendante, laïche paniculée, laïche faux-souchet), des groupements aquatiques à Nymphéa blanc ainsi que des groupements amphibies et de rives exondées.

De nombreuses espèces végétales rares et/ou protégées se rencontrent sur le territoire de la ZNIEFF comme par exemple l'orme lisse, la stellaire des bois (en limite d'aire), l'épipactis pourpre (orchidée protégée dans la Marne), l'élatine à six étamines (espèce subatlantique rare en France, protégée au niveau régional), la prêle d'hiver (assez rare en plaine), le géranium livide, le calamagrostis faux-roseau, d'origine montagnarde et rare en Champagne, le genêt d'Allemagne (protégé, très rare et menacé de disparition totale en Champagne-Ardenne), la bruyère cendrée (protection régionale), la campanule cervicaria (protection nationale), le scirpe de Sologne (protection départementale), la limoselle aquatique, le gnaphale jaunâtre, la bermudienne aux yeux bleus (espèce introduite et naturalisée depuis un siècle), l'orobanche du genêt, la prêle des bois, la prêle d'hiver, etc. La plupart d'entre elles sont inscrites sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne. Certaines fougères remarquables, rares à très rares en plaine s'y observent au, notamment le polystic des montagnes (protégé en Champagne-Ardenne), le polypode du hêtre et le polypode du chêne (orophyte très rare en plaine) et la fougère écailleuse.

La faune est tout aussi importante et diversifiée (pour des informations plus complètes, se reporter aux listes d'espèces figurant dans les 12 ZNIEFF de type I associées).

Certains ruisseaux possèdent une bonne qualité des eaux, avec de nombreux macro-invertébrés (Trichoptères, Ephémères) spécifiques des ruisseaux montagnards aux eaux vives, peu ou pas altérées et notamment de belles populations d'*Electrogena ujhelyii* au niveau des sources et des têtes de ruisseau. De même, on observe de très importantes stations d'*Osmylus fulvicephalus* (névroptère dont la larve est semi-aquatique) ainsi qu'une espèce rare et en voie de disparition dans toute l'Europe, *Ernodes articularis*.

Les poissons sont également bien représentatifs de la qualité de ces ruisseaux, avec la présence de gîtes de ponte de truite fario et de chabot. Ce dernier est inscrit, comme la lamproie de Planer (qui se reproduit aussi dans la ZNIEFF) à l'annexe II de la Directive Habitats.

Les papillons sont bien représentés et comportent une espèce protégée en France, le damier de la succise : il est inscrit à l'annexe II de la convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive Habitats, dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie "en danger") et sur la liste rouge régionale, de même que le damier noir. D'autres papillons plus communs s'y observent (machaon, paon du jour, argus frêle, demi-argus, carte géographique, échiquier, petite tortue, citron, Robert-le-diable, petit Sylvain, hespérie de la houlque, diverses piérides., etc.).

Les criquets et les sauterelles sont bien représentés : le criquet ensanglanté, inscrit sur la liste rouge des Orthoptères de Champagne-Ardenne se remarque, accompagné par de nombreux criquets chanteurs (criquet duettiste, criquet des pâtures,

criquet des clairières, criquet mélodieux), ainsi que par la grande sauterelle verte phanéroptère porte-queue, le tétrix des clairières, le criquet à long corselet, le criquet riverain, la decticelle cendrée, la decticelle bariolée, la sauterelle ponctuée, le grillon des bois, le grillon champêtre....

Les libellules présentent la même tonalité biogéographique et centreuropéenne qu'une partie de la flore, avec de nombreuses espèces inscrites sur la liste rouge régionale des insectes, comme par exemple le sympétrum jaune d'or, l'agrion nain, l'agrion gracieux et l'agrion mignon, l'aeschna printanière, la grande aeschna et l'aeschna isocèle, le cordulégastre bidenté (belles populations au niveau des sources), l'orthétrum bleuissant et l'orthétrum brun, la cordulie à taches jaunes, la cordulie métallique, la cordulie à deux taches et d'autres plus communes comme par exemple la libellule à quatre taches, la libellule déprimée, la libellule écarlate, le gomphe joli, l'aeschna bleue, la cordulie bronzée, l'agrion à larges pattes, l'agrion porte-coupe, l'agrion jouvencelle, l'agrion élégant, la petite nymphe au corps de feu, la naïade aux yeux rouges, etc.

Les populations des batraciens sont diversifiées grâce à la présence sur le site des étangs avec le triton crêté, le sonneur à ventre jaune, la rainette verte et le crapaud accoucheur, protégés en France (depuis 1993) et en Europe (convention de Berne et directive Habitats), figurant dans le livre rouge de la faune menacée de France et inscrits, avec la salamandre, sur la liste rouge des amphibiens de Champagne-Ardenne.

Pour les reptiles, la coronelle d'Europe et le lézard des souches (annexe IV de la directive Habitats), inscrits sur la liste rouge régionale, sont également présents.

Le site accueille de nombreuses espèces d'oiseaux attirés par des biotopes variés pour se nourrir, pour s'y reposer ou pour s'y reproduire (cf. ZNIEFF I pour listes plus complètes d'oiseaux). Certains sont rares au niveau régional ou national, d'autres sont en régression plus ou moins alarmantes comme la bouscarle de Cetti, nicheur très rare en Champagne-Ardenne, la chouette chevêche (nicheur peu commun et dont les effectifs sont en diminution importante), le milan noir, le milan royal et le faucon hobereau, la rousserolle verderolle et la rousserolle turdoïde (inféodée aux roselières et aux étangs, nicheur rare au niveau de la région), le tarier d'Europe (dont les effectifs régionaux sont faibles et en régression), l'hirondelle des rivages (la moins commune de nos trois espèces d'hirondelles), la pie-grièche grise et la pie grièche écorcheur, toutes deux en régression dans la région, le pigeon colombin et le râle d'eau, nicheurs peu communs. Ils sont tous inscrits sur la liste rouge des oiseaux de Champagne-Ardenne.

De nombreux oiseaux d'eau y séjournent lors des migrations, y hivernent ou même s'y reproduisent : grèbe huppé, grèbe castagneux et foulque (oiseaux nicheurs), sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, canard colvert, fuligule morillon et fuligule milouin, cygne tuberculé, chevalier culblanc, chevalier sylvain, etc. De nombreux rapaces diurnes ou nocturnes survolent les étangs et/ou la forêt environnante : milan noir et milan royal, faucon crécerelle, busard Saint-Martin, chouette hulotte, chouette effraie... Divers oiseaux plus communs fréquentent aussi le site, notamment les pouillots (fitis, siffleur, véloce), le pinson des arbres, le roitelet huppé, le loriot d'Europe, les mésanges (noire, charbonnière et huppée), le troglodyte mignon, la tourterelle des bois, le pigeon ramier, les grives draine et musicienne, etc.

Les mammifères forestiers sont également bien représentés par le gros gibier (cerf, chevreuil, sanglier) et les carnivores (chat sauvage, putois, martre, fouine, etc.). La musaraigne aquatique, inscrite sur la liste rouge régionale, fréquente les étangs.

La ZNIEFF fait partie du réseau international des zones humides de la convention de Ramsar et de la directive Oiseaux (Z.I.C.O. des étangs d'Argonne).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Etang
- Vallée
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone prend en compte le grand massif forestier d'Argonne et certains environs proches biologiquement très riches.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|------------------|-----------------------------|-------|-----------------|
| - Algues | - Bryophytes | | - Amphibiens |
| - Autre Faunes | - Poissons | | - Mammifères |
| - Lichens | - Odonates | | - Oiseaux |
| - Mollusques | - Orthoptères | | - Phanérogames |
| - Crustacés | - Lépidoptères | | - Ptéridophytes |
| - Arachnides | - Autres ordres d'Hexapodes | | - Reptiles |
| - Myriapodes | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | | |
| | 41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i> | | | 40 | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 5 | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 10 | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 6 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 15 | |
| | 83.15 <i>Vergers</i> | | | 1 | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 7 | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |
| | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | 5 | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.87 <i>Clairières forestières</i> | | | | |
| | 35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 6 | |
| | 37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |
| | 8 <i>Terres agricoles et paysages artificiels</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Groupements mésophiles de hautes herbes des clairières et lisières forestières = *Potentillo erectae*-*Holcion mollis*.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Autres insectes | 29002 | <i>Electrogena ujhelyii</i> (Sowa, 1981) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 232764 | <i>Ernodes articularis</i> (Pictet, 1834) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52073 | <i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli, 1763) | <i>Osmyle à tête jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 53867 | <i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53821 | <i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789) | Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Putois d'Europe, Furet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | Murin de Daubenton | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Odonates | 65446 | <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Aeschne (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65460 | <i>Anaciaeschna isosceles</i> (Müller, 1767) | Aeschne isocèle | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | Aeschne printanière (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | Agrion joli | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | Agrion mignon (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65407 | <i>Cordulegaster bidentatus</i> Selys, 1843 | <i>Cordulégastre bidenté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65401 | <i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastre annelé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65387 | <i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825) | <i>Épithèque bimaculée (L'), Cordulie à deux taches (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65225 | <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe vulgaire (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65115 | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825) | <i>Agrion nain (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65265 | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Libellule fauve (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65290 | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | <i>Orthétrum brun (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuissant (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65395 | <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie à taches jaunes (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65393 | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie métallique (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65312 | <i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776) | <i>Sympétrum noir (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65327 | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sympétrum jaune d'or</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | <i>Rousserolle verderolle</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|---|--|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie-grièche grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| Orthoptères | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 87212 | <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide faux-roseau, Roseau des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 87620 | <i>Campanula cervicaria</i> L., 1753 | <i>Cervicaire, Campanule à fleurs en tête, Campanule cervicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 88387 | <i>Carex bohémica</i> Schreb., 1772 | <i>Laïche souchet, Laïche de Bohême, Laïche voyageuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 95858 | <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808 | <i>Élatine à six étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 95919 | <i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe à inflorescence ovoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 96471 | <i>Epipactis purpurata</i> Sm., 1828 | <i>Épipactis pourpre, Épipactis violacée</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 99754 | <i>Genista germanica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 100120 | <i>Geranium phaeum</i> L., 1753 | <i>Géranium brun</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 100480 | <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| 106128 | <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | <i>Limoselle aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109126 | <i>Myosurus minimus</i> L., 1753 | <i>Queue-de-souris naine</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 111647 | <i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799 | <i>Orobanche des genêts, Orobanche du Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 117766 | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | <i>Cassis, Groseillier noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 123933 | <i>Sisyrinchium montanum</i> Greene, 1899 | <i>Bermudienne des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 125021 | <i>Stellaria nemorum</i> L., 1753 | <i>Stellaire des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 128171 | <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | <i>Orme lisse, Orme blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| Poissons | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabot, Chabot commun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | <i>Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67778 | <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 96523 | <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | <i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 96545 | <i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753 | <i>Prêle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100636 | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851 | <i>Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 111239 | <i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969 | <i>Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 113084 | <i>Phegopteris polypodioides</i> Fée, 1852 | <i>Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris Phégoptéris</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lézard des souches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121 | <i>Triturus alpestris</i> <i>(Laurenti, 1768)</i> | <i>Triton alpestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> <i>(Razoumowsky, 1789)</i> | <i>Triton palmé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 179 | <i>Triturus vulgaris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Triton ponctué</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Bryophytes | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> <i>(Hedw.) Ångstr.</i> | <i>Coussinet des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> <i>Hedw.</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 197825 | <i>Sphagnum</i> L., 1753 | <i>Sphaignes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Mammifères | 61498 | <i>Apodemus flavicollis</i> <i>(Melchior, 1834)</i> | <i>Mulot à collier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mulot sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> <i>Miller, 1908</i> | <i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61260 | <i>Arvicola terrestris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Campagnol terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cerf élaphe</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 61290 | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780) | <i>Campagnol roussâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60176 | <i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780) | <i>Crocidure leucode</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60205 | <i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780) | <i>Crocidure musette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61618 | <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Lérot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60596 | <i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier, Chat sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61675 | <i>Lepus capensis auct.</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61543 | <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) | Rat des moissons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | Campagnol agreste | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61568 | <i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758 | Souris grise, Souris domestique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Muscardin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Hermine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Belette d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Lapin de garenne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61427 | <i>Pitymys subterraneus</i> | Campagnol souterrain | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60062 | <i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60038 | <i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766 | Musaraigne pygmée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Sanglier | Passage, migration | | | | | |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Renard roux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | Aeschne bleue (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65451 | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805 | Aeschne mixte | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | Anax empereur (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | Caloptéryx éclatant | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | Caloptéryx vierge | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65126 | <i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840) | Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | Agrion jeune | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cordulie bronzée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naïade aux yeux rouges</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65165 | <i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naïade au corps vert</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|---|---|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65192 | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Leste brun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65348 | <i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sympétrum vulgaire (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Passage, migration | | | | | | |
| 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Alouette des champs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Canard pilet</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Canard colvert</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Sarcelle d'été</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pipit farlouse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| 3723 | <i>Anthus trivialis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pipit des arbres</i> | Passage, migration | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule morillon</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4595 | <i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sizerin flammé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guifette noire</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corbeau freux</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|--|--|---|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4212 | <i>Hypolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolais icterine, Grand contrefaisant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 4215 | <i>Hypolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolais polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | |
| 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration | | | | | | |
| 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Passage, migration | | | | | | |
| 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Passage, migration | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4684 | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4367 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 | Mésange noire | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange bleue | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange huppée | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | Mésange nonnette | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau friquet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | Pie bavarde | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Pic vert, Pivert | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Grèbe huppé | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Accenteur mouchet | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Bouvreuil pivoine | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|----------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | <i>Grèbe castagneux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2607 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier sylvain</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier culblanc</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Grive mauvis</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|--------|----------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| | | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | | |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Chouette effraie, Effraie des clochers | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| | | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | | |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Passage, migration | | | | | | |
| | Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acénaie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | Moschatelline, Adoxe musquée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 80990 | | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante, Consyre moyenne | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 81541 | | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | Ail des ours, Ail à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux</i> , <i>Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | <i>Vulpin roux</i> , <i>Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois</i> , <i>Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire</i> , <i>Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté</i> , <i>Chandelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc</i> , <i>Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché</i> , <i>Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié</i> , <i>Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigéios</i> , <i>Roseau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87245 | <i>Calamagrostis lanceolata</i> Roth, 1788 | <i>Calamagrostide blanchâtre,</i> <i>Calamagrostide lancéolée,</i> <i>Calamagrostis lancéolé,</i> <i>Calamagrostis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Bérue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée,</i> <i>Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88314 | <i>Carex acuta</i> L., 1753 | <i>Laïche aiguë,</i> <i>Laïche grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais,</i> <i>Laïche fausse,</i> <i>Laïche aiguë,</i> <i>Laïche fausse</i> <i>Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88395 | <i>Carex brizoides</i> L., 1755 | <i>Laïche fausse-brize</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88470 | <i>Carex digitata</i> L., 1753 | <i>Laïche digitée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide,</i> <i>Laïche élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque,</i> <i>Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | <i>Laïche jaunâtre,</i> <i>Laïche jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88691 | <i>Carex montana</i> L., 1753 | <i>Laïche des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88747 | <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | <i>Laïche pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche millet,</i> <i>Faux Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | <i>Laïche à épis pendants,</i> <i>Laïche pendante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | <i>Laïche à pilules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux-souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88893 | <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778 | <i>Laïche à épis grêles,</i> <i>Laïche maigre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88927 | <i>Carex umbrosa</i> Host, 1801 | Laïche des ombrages | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90786 | <i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753 | Limoine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91118 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753 | Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | Circée de Paris, Circée commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92864 | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | Aubépine à deux styles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespitose, Canche des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | Foin tortueux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | Digitale pourpre, Gantelée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96123 | <i>Epilobium adenocaulon</i> Hausskn., 1879 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96136 | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | Épilobe des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96448 | <i>Epipactis latifolia</i> All., 1785 | Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre, Fouteau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | Fétuque hétérophylle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine des prés, Spirée Ulmaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99552 | <i>Galium sylvaticum</i> L., 1762 | Gaillet des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100382 | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | <i>Glycérie dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100400 | <i>Glyceria plicata</i> (Fr.) Fr., 1842 | <i>Glycérie pliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105148 | <i>Lathraea squamaria</i> L., 1753 | <i>Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105226 | <i>Lathyrus montanus</i> Bernh., 1800 | <i>Gesse des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106840 | <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 | <i>Luzule blanche, Luzule des bosquets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107158 | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794 | <i>Petit muguet à deux feuilles, Maianthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107168 | <i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fr., 1817 | <i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | Mélampyre des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | Mélitte à feuilles de Mélisse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | Néflier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109151 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753 | Myriophylle verticillé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109750 | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | Nénuphar blanc, Lys des étangs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | Baldingère faux-roseau, Fromenteau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113388 | <i>Phyteuma nigrum</i> F.W.Schmidt, 1793 | <i>Raiponce noire,</i> <i>Raiponce bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun,</i> <i>Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon</i> <i>multiflore,</i> <i>Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée</i> <i>Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114761 | <i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753 | <i>Renouée à feuilles</i> <i>de patience,</i> <i>Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797 | <i>Potentille</i> <i>tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère élevée,</i> <i>Coucou des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116416 | <i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 | <i>Pulmonaire à feuilles longues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116419 | <i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811 | <i>Pulmonaire des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Pulsatille vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116547 | <i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | <i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117940 | <i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900 | <i>Rorippe d'Islande</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119235 | <i>Rubus nessensis</i> Hall, 1794 | Ronce de Nees | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | Patience d'eau, Grande Parelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119533 | <i>Rumex maritimus</i> L., 1753 | Patience maritime | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | Patience sanguine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | Saule cendré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120720 | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | Sureau à grappes, Sureau de montagne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | Scirpe des bois, Scirpe des forêts | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121793 | <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805 | Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | Scrophulaire noueuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | Alouchier, Alisier blanc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124414 | <i>Sparganium neglectum</i> Beeby, 1885 | Rubancier négligé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124740 | <i>Stachys alpina</i> L., 1753 | Épiaire des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Épiaire officinale | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des bois, Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125044 | <i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770 | Stellaire des sources | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127337 | <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753 | Trèfle hybride, Trèfle bâtard | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128193 | <i>Ulmus scabra</i> Mill., 1768 | Orme glabre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Myrtille, Maurette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | Véronique des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | Véronique officinale, Herbe aux ladres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne aquatique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | Vesce des haies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 95547 | <i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 | Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 619337 | <i>Equisetum maximum</i> auct. non Lam., 1779 | <i>Grande prêlé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115057 | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77692 | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787 | <i>Lézard vivipare</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2607 | <i>Tringa glareola</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> <i>(Gmelin, 1803)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisch, 1783) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4212 | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|--|---|--|---|
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> <i>Laurenti, 1768</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 87620 | <i>Campanula cervicaria</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Bryidae | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 197825 | <i>Sphagnum</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 87212 <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 88387 <i>Carex bohemica</i> Schreb., 1772 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 95858 <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 95919 <i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 96471 <i>Epipactis purpurata</i> Sm., 1828 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 96523 <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 96545 <i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 96667 <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 99754 <i>Genista germanica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 100480 <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106128 <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 109126 <i>Myosurus minimus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 111647 <i>Orobanche rapum- genistae Thuill., 1799</i> | | Reproduction certaine ou probable | |
| 117766 <i>Ribes nigrum L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | |
| 125021 <i>Stellaria nemorum L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | |
| 128171 <i>Ulmus laevis Pall., 1784</i> | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | BOURNERIAS M. | 1977 | Quelques observations floristiques sur la feuille Châlons de la carte de la végétation de la France. <i>Natura Mosana</i> , 30/2 :52-59 |
| | BOURNERIAS M. | 1976 | Quelques stations de <i>Calamagrostis arundinacea</i> en forêt d'Argonne. <i>Natura Mosana</i> , 29/1 : 7-11 |
| | DUVIGNEAUD J. | 1975 | Présence d' <i>Elatine hexandra</i> en Argonne. <i>Bulletin de la Soc. Hist. Nat. Ard.</i> , 65 : 48-49 |
| | DUVIGNEAUD J. | 1977 | La flore et la végétation des districts lorrain et champenois dans le département des Ardennes (France). Excursion de la Soc. Bot. de Liège (Juin 76). <i>Natura Mosana</i> , 30/4 : 127-132 |
| Informateur | COPPA Gennaro | | |
| | DIDIER Bernard | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |
| | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | MISSET Claude | | |
| | THEVENIN Stéphane | | |