



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/210009839>



FORET DE LA RIVE DROITE DU VIROIN A VIREUX-MOLHAIN (Identifiant national : 210009839)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01770009)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., . -
210009839, FORET DE LA RIVE DROITE DU VIROIN A VIREUX-MOLHAIN. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/210009839.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centroïde calculé : 769223°-2567842°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 25/06/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 18 |
| 9. SOURCES | 18 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ardennes
- Commune : Vireux-Molhain (INSEE : 08486)

1.2 Superficie

13,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 116

Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210009841](#) - FORETS ET ESCARPEMENTS DE LA VALLEE DE LA SEMOY ET DE SES AFFLUENTS A THILAY ET HAUTES-RIVIERES (Type 1) (Id reg. : 01770011)
- Id nat. : [210001130](#) - MARAIS, PRAIRIES ET BOIS DES HAUTS-BUTTES ET DE SES ENVIRONS A HARGNIES ET MONTHERME (Type 1) (Id reg. : 01770004)
- Id nat. : [210009840](#) - VALLEE DE LA HOUILLE AU SUD DE LANDRICHAMPS (Type 1) (Id reg. : 01770010)
- Id nat. : [210001126](#) - LE PLATEAU ARDENNAIS (Type 2) (Id reg. : 01770000)
- Id nat. : [210001131](#) - BOIS DU TROU CAILLOU ET BOIS DES BOULETTES A REVIN ET MONTHERME (Type 1) (Id reg. : 01770005)
- Id nat. : [210001132](#) - LE VALLON DE L'OURS A THILAY ET HAUTES-RIVIERES (Type 1) (Id reg. : 01770006)
- Id nat. : [210009839](#) - FORET DE LA RIVE DROITE DU VIROIN A VIREUX-MOLHAIN (Type 1) (Id reg. : 01770009)
- Id nat. : [210009838](#) - FORET DU VERSANT GAUCHE DE LA VALLEE DE LA HOUILLE AU SUD DE CHARNOIS (Type 1) (Id reg. : 01770008)
- Id nat. : [210013033](#) - ROCHERS DE LAIFOUR ET BANQUETTE ALLUVIALE DES DAMES DE MEUSE AU SUD D'ANCHAMPS (Type 1) (Id reg. : 01770012)
- Id nat. : [210009361](#) - FORÊT DOMANIALE DE SEDAN ET BOIS ASSOCIÉS AU NORD DE POURRU-AUX-BOIS ET DE FRANCHEVAL (Type 1) (Id reg. : 01770014)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la forêt de la rive droite de la rivière du Viroin est située à l'est de la ville de Vireux-Molhain et est limitée par la frontière belge. D'une superficie d'environ 15 hectares, elle est incluse dans la grande ZNIEFF II du massif Ardennais. Elle occupe un versant raide exposé au nord ainsi qu'une frange alluviale le long du Viroin. La végétation forestière comprend, en fonction de la topographie :

- l'aulnaie-frênaie riveraine avec l'aulne glutineux, le frêne, l'orme de montagne (quelques individus), l'orme lisse (inscrit sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne), surmontant une strate herbacée renfermant l'ail des ours, la stellaire des bois, l'impatiante ne-me-touchez-pas, la fougère femelle, la ficaire fausse-renoncule, la podagraire, le polystic spinuleux, etc.

- la forêt de versant (tendant vers le Tilio-Acerion) correspondant à un jeune taillis dense à orme lisse (avec quelques chênes, érables, tilleuls et charme), abritant une espèce rare dans les Ardennes, l'aconit tue-loup.

- la chênaie-bétulaie acidiphile avec le chêne pédonculé, le chêne sessile et le bouleau pubescent dominant le sorbier des oiseleurs, le tremble, la bourdaine et le chèvrefeuille rampant. La strate herbacée comprend la myrtille, la canche flexueuse, le muguet, la fougère aigle, la luzule blanche, le millepertuis élégant, etc.

Des groupements fontinaux (à cardamine flexueuse, dorine à feuilles opposées, laîche espacée...), des mégaphorbiaies (à cirse des marais, reine des prés, gaillet des fanges, cirse des marais, stellaire alsine, épiaire des marais...) et prairies intensifiées complètent la végétation du site.

La rivière, le ruisseau et les sources attirent de nombreuses libellules (gomphe joli, anax empereur, orthétrum réticulé) et demoiselles (agrion porte-coupe, agrion à larges pattes, naïade aux yeux rouges, petite nymphe au corps de feu, leste fiancé).

La ZNIEFF est dans un bon état de conservation, les menaces éventuelles concernent le mode d'exploitation de la forêt et l'enrésinement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Vallée
- Vallon
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique
- Autre (préciser)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite inférieure de la ZNIEFF suit le cours du ruisseau le Viroin, la limite supérieure englobe la partie la plus pentue du coteau qui surplombe la vallée.

Autre : frontière franco-belge (limite nord ouest de la zone).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Odonates | | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 5 | |
| | 54.1 <i>Sources</i> | | | | |
| | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | 30 | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 60 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | 5 | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |
| | 8 <i>Terres agricoles et paysages artificiels</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 80070 | <i>Aconitum vulparia</i> <i>Rchb., 1819</i> | <i>Coqueluchon jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 128171 | <i>Ulmus laevis</i> <i>Pall., 1784</i> | <i>Orme lisse,</i> <i>Orme blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60596 | <i>Felis sylvestris</i> <i>Schreber, 1775</i> | <i>Chat forestier,</i> <i>Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Martre des pins,</i> <i>Martre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65473 | <i>Anax imperator</i> <i>Leach, 1815</i> | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> <i>(Harris, 1782)</i> | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> <i>(Charpentier, 1840)</i> | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> <i>(Hansemann, 1823)</i> | <i>Naiade aux yeux rouges (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes</i> , <i>Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65101 | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre</i> , <i>Acénaie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore</i> , <i>Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | <i>Moschatelline</i> , <i>Adoxe musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80322 | <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753 | <i>Pogagraire</i> , <i>Herbe aux goutteux</i> , <i>Fausse Angélique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante</i> , <i>Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81195 | <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937 | <i>Alchémille vert jaune, Alchémille commune, Alchémille jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | <i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82656 | <i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753 | <i>Anémone fausse-renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83272 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Arabette de thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87915 | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796 | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87933 | <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753 | <i>Cardamine impatiens</i> , <i>Cardamine impatiente</i> , <i>Herbe au diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés</i> , <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | <i>Laïche à pilules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme</i> , <i>Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles opposées</i> , <i>Hépatique des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris</i> , <i>Circée commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | <i>Cirse des maraicher</i> , <i>Chardon des potagers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais</i> , <i>Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse,</i> <i>Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre,</i> <i>Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96136 | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | <i>Épilobe en épi,</i> <i>Laurier de saint Antoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois,</i> <i>Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | <i>Fétuque géante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés,</i> <i>Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage,</i> <i>Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé,</i> <i>Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit,</i> <i>Ortie royale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102115 | <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803 | <i>Épervière lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon grimpant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant</i> , <i>Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103553 | <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753 | <i>Balsamine des bois</i> , <i>Impatiente ne-me-touchez-pas</i> , <i>Impatiente N'y-touchez-pas</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> , <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104848 | <i>Lamiastrum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966 | <i>Lamier jaune</i> , <i>Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105226 | <i>Lathyrus montanus</i> Bernh., 1800 | <i>Gesse des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois</i> , <i>Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106840 | <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 | <i>Luzule blanche</i> , <i>Luzule des bosquets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule de printemps</i> , <i>Luzule printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des bois</i> , <i>Grande luzule</i> , <i>Troscart à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108331 | <i>Mentha x verticillata</i> L., 1759 | <i>Menthe verticillée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | Stellaire aquatique, Céraiste d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | Baldingère faux-roseau, Fromenteau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | Fléole des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113388 | <i>Phyteuma nigrum</i> F.W.Schmidt, 1793 | Raiponce noire, Raiponce bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114153 | <i>Poa chaixii</i> Vill., 1786 | Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | <i>Chêne sessile,</i> <i>Chêne rouvre,</i> <i>Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | <i>Renoncule à tête d'or,</i> <i>Renoncule Tête-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge,</i> <i>Groseillier à grappes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | <i>Framboisier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses,</i> <i>Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault,</i> <i>Saule des chèvres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120720 | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | <i>Sureau à grappes,</i> <i>Sureau de montagne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai,</i> <i>Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 140977 | <i>Senecio nemorensis</i> subsp. <i>fuchsii</i> (C.C.Gmel.) Ces., 1844 | <i>Séneçon de Fuchs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123471 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125044 | <i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770 | <i>Stellaire des sources</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | <i>Tilleul à grandes feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | <i>Orme glabre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Mammifères | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 80070 <i>Aconitum vulparia</i> Rchb., 1819 | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | BOURNERIAS M. et al. | 1981 | Inventaire des sites botaniques remarquables de la feuille de Mézières (carte de la végétation au 1/200 000ème). Entente Nationale pour la Protection de la Nature, 9 |
| | DUVIGNEAUD J. | 1961 | L'orme lisse en Belgique. Bulletin de la Soc. Roy. Bot. de Belgique, 93 : 78 |
| Informateur | COPPA Gennaro | | |
| | DARGENT Franck | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |