



FORET DOMANIALE DE BELVAL, BOIS ET MARDELLES DE SAINT-PIERREMONT (Identifiant national : 210009875)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000388)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .-
210009875, FORET DOMANIALE DE BELVAL, BOIS ET MARDELLES DE SAINT-
PIERREMONT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009875.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne
Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E.
Centroïde calculé : 793611°-2508059°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/06/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 25/06/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 17 |
| 9. SOURCES | 18 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ardennes
- Commune : Yoncq (INSEE : 08502)
- Commune : Berlière (INSEE : 08061)
- Commune : Besace (INSEE : 08063)
- Commune : Stonne (INSEE : 08430)
- Commune : Saint-Pierremont (INSEE : 08394)

1.2 Superficie

366,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180

Maximale (mètre): 215

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210009850](#) - PRAIRIES DES PETITS CLAIRS CHENES A L'OUEST DE BEAUMONT-EN-ARGONNE (Type 1) (Id reg. : 00000369)
- Id nat. : [210001124](#) - FORET DOMANIALE DU MONT-DIEU (Type 1) (Id reg. : 00000173)
- Id nat. : [210009888](#) - FORETS DE DIEULET, DE JAULNAY ET BOIS DE LA VACHE ENTRE BEAUMONT-EN-ARGONNE ET LANEUVILLE-SUR-MEUSE (Type 2) (Id reg. : 03970000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF regroupant les bois de l'Excommunière, de Culée Brisette et du Grand Dieulet (Forêt Domaniale de Belval) ainsi que le bois et les mares de Saint-Pierremont se situe entre les communes de la Besace, la Berlière, Saint-Pierremont et Yoncq dans le département des Ardennes (région naturelle des Crêtes préardennaises).

Les deux types forestiers dominants sont la chênaie-charmaie mésotrophe et la chênaie acidiphile aux arbres âgés, avec un taillis bien développé. La strate arborescente comprend le chêne sessile, le chêne pédonculé, le merisier, le hêtre, le bouleau verruqueux et le charme. La flore est riche et diversifiée et comprend la petite pyrole (inscrite sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne), le millepertuis élégant, le maianthème à deux feuilles, la laïche à pilules et de nombreuses fougères (fougère femelle, polystic dilaté, etc.). Les talus et les chemins forestiers recèlent deux espèces protégées, l'une au niveau national, la campanule cervicaria (médioeuropéenne rare en France) et la seconde au niveau régional, le lycopode en massue (seule station connue en dehors de l'Ardenne primaire), tous les deux étant inscrits sur la liste rouge régionale.

L'aulnaie et l'aulnaie-frênaie ont colonisé les fonds de vallons : on peut y observer diverses laïches (laïche maigre, laïche espacée, laïche pendante, laïche allongée, etc.), le scirpe des bois et au niveau des nombreuses sources, la cardamine amère, la dorine à feuilles opposées et la dorine à feuilles alternes .

L'intérêt de la ZNIEFF est également dû à la présence de mares souvent colonisées par les lentilles d'eau (lentille à trois lobes et petite lentille d'eau) ; l'une d'elles est totalement recouverte de sphagnes (phénomène rare en dehors de l'Ardenne primaire) sur une quarantaine de cm de profondeur.

Le massif forestier est parcouru par tout un réseau de ruisseaux et de ruisselets temporaires collectant les eaux de surface (d'octobre à juin suivant les précipitations). Leur entomofaune est particulièrement remarquable : elle recèle un éphémère rare en Europe, lié aux ruisseaux argileux plus ou moins temporaires, *Metreletus bolcanicus*, ainsi qu'une phrygane, *Oligostomis reticulata*, en danger d'extinction dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) et un névroptère assez peu fréquent, l'hémérobe aquatique. C'est de plus une zone de frayère pour la lotte de rivière. Les Odonates sont également bien représentés avec une population de demoiselles particulièrement bien diversifiée (agrion jovencelle, agrion élégant, agrion à larges pattes, petite nymphe au corps de feu, leste fiancé, caloptéryx éclatant, caloptéryx vierge, etc.) et certaines libellules telles que l'anax empereur, la cordulie bronzée, la libellule déprimée, la libellule à quatre taches et l'orthétrum réticulé. Les sauterelles

et criquets possèdent deux espèces rares inscrites sur la liste des Orthoptères de Champagne-Ardenne, le conocéphale des roseaux et le criquet ensanglanté, ainsi que d'autres plus communs, comme par exemple le conocéphale bigarré, la decticelle bariolée, la decticelle cendrée, le criquet des clairières, le criquet des pâtures, etc. Une douzaine d'espèces de papillons de jour a été répertoriée, dont le damier de la succise protégé en France (depuis 1993) et en Europe (annexes II de la directive Habitats et de la convention de Berne), inscrit dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie "en danger d'extinction"). Il figure également, avec le petit collier argenté, sur la liste rouge régionale des Lépidoptères.

Le site abrite une des plus belles populations de salamandre tachetée des Ardennes : protégée au niveau national, elle est inscrite sur la liste rouge des amphibiens de Champagne-Ardenne. La forêt est fréquentée par de nombreuses espèces d'oiseaux, notamment certains pics (pic noir, pic mar inscrit sur la liste rouge régionale en tant que nicheur rare), rapaces (zone de chasse de l'autour des palombes, épervier d'Europe) et passereaux forestiers (pouillot siffleur, grosbec casse noyaux, etc.). Le putois et le muscardin sont également présents sur le site.

La ZNIEFF est dans un bon état général de conservation, mais elle est menacée par le drainage et les enrésinements.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF est fonction des limites naturelles des boisements les plus riches en faune et en flore.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 31.87 <i>Clairières forestières</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 10 | |
| | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | 50 | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 30 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 4 | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | 1 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 54.1 <i>Sources</i> | | | | |
| | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres insectes | 29049 | <i>Metreletus balcanicus</i> (Ulmer, 1920) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 232633 | <i>Oligostomis reticulata</i> (Linnaeus, 1761) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52073 | <i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli, 1763) | <i>Osmyle à tête jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 53938 | <i>Clossiana selene</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | <i>Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53867 | <i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Orthoptères | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 87620 | <i>Campanula cervicaria</i> L., 1753 | <i>Cervicaire, Campanule à fleurs en tête, Campanule cervicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 116543 | <i>Pyrola minor</i> L., 1753 | <i>Petite pyrole</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| Ptéridophytes | 107003 | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | <i>Lycopode en massue, Éguaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aurore (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53688 | <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tristan (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53724 | <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Carte géographique (La), Jaspé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53315 | <i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771) | Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53773 | <i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53604 | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | Mégère (La), Satyre (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54322 | <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | Hespérie de la Houque (L'), Thumas (Le), Bande noire (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61543 | <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) | Rat des moissons | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Muscardin | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|---|---|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois</i> <i>d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptéryx vierge</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cordulie</i> <i>bronzée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule</i> <i>déprimée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule</i> <i>quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum</i> <i>réticulé</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes</i> , <i>Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 65101 | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Orthoptères | 66138 | <i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815) | <i>Criquet duettiste, Sauteriot</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66161 | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66077 | <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834) | <i>Criquet des clairières</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66113 | <i>Gomphocerus rufus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65889 | <i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773) | <i>Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65722 | <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | <i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | <i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65740 | <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773) | <i>Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66032 | <i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66036 | <i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806) | <i>Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais,</i> <i>Laïche fausse,</i> <i>Laïche aiguë,</i> <i>Laïche fausse</i> <i>Laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88493 | <i>Carex elongata</i> L., 1753 | <i>Laïche allongée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | <i>Laïche à épis pendants,</i> <i>Laïche pendante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | <i>Laïche à pilules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux-souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88893 | <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778 | <i>Laïche à épis grêles,</i> <i>Laïche maigre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse,</i> <i>Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91118 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher,</i> <i>Cresson doré,</i> <i>Hépatique dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | Lentille d'eau à trois sillons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107158 | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794 | Petit muguet à deux feuilles, Maianthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113432 | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 | Épicéa commun, Sérente | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117164 | <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 | Renoncule peltée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | Saule cendré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des bois,</i> <i>Scirpe des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée,</i> <i>Sauge des bois,</i> <i>Germandrée</i> <i>Scorodoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 68336 | <i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lote</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle,</i> <i>Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté,</i> <i>Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77692 | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787 | <i>Lézard vivipare</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 87620 | <i>Campanula cervicaria</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 107003 | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 87620 <i>Campanula cervicaria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 107003 <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 116543 <i>Pyrola minor</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|-------------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | COPPA Gennaro | | |
| | EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE | | |