



VALLONS DES RUISSEAUX DU VAL DARDE, DES RIAUX ET DE LEURS AFFLUENTS A MARNAY-SUR-MARNE ET FOULAIN (Identifiant national : 210020064)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000542)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210020064, VALLONS DES RUISSEAUX DU VAL DARDE, DES RIAUX ET DE LEURS AFFLUENTS A MARNAY-SUR-MARNE ET FOULAIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020064.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne
Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.
Centroïde calculé : 815261°-2339334°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/06/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 27 |
| 9. SOURCES | 27 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne
- Commune : Foulain (INSEE : 52205)
- Commune : Marnay-sur-Marne (INSEE : 52315)

1.2 Superficie

200,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 290

Maximale (mètre): 414

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210020199](#) - COTEAUX ET VALLEE DE LA SUIZE ENTRE CHAUMONT ET VILLIERS-SUR-SUIZE (Type 2) (Id reg. : 05110000)
- Id nat. : [210020019](#) - FORÊTS, PRAIRIES ET RUISSEAUX DU VAL MOIRON ENTRE FOULAIN ET BIESLES (Type 2) (Id reg. : 04980000)
- Id nat. : [210000649](#) - LA HAUTE VALLEE DE LA MARNE DE MARNAY-SUR-MARNE A FOULAIN ET POULANGY (Type 1) (Id reg. : 00000103)
- Id nat. : [210020010](#) - GRAND VALLON DE VERBIESLES (Type 1) (Id reg. : 00000507)
- Id nat. : [210000650](#) - BOIS DE LA COMBE VEUTET A L'EST DE MARNAY-SUR-MARNE (Type 1) (Id reg. : 00000104)
- Id nat. : [210008926](#) - VALLON BOISE DE PECHEUX A FOULAIN (Type 1) (Id reg. : 00000243)
- Id nat. : [210020168](#) - VALLONS DE TRIMEULE ET DE SINCERON A VESAIGNES-SUR-MARNE (Type 1) (Id reg. : 00000613)
- Id nat. : [210020106](#) - VALLEE DE LA SUIZE, COMBE EMERY ET COMBE DE LA LOGE AU NORD DE VILLIERS-SUR-SUIZE (Type 1) (Id reg. : 05110004)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF dite des vallons des ruisseaux du Val Darde, des Riaux et de leurs affluents est située entre Marnay et Foulain, dans la région naturelle du plateau de Langres, en Haute-Marne. D'une superficie d'environ 200 hectares, les boisements recouvrent plus de 80% de son territoire ; elle est traversée par des ruisseaux aux eaux vives (issus de sources plus ou moins incrustantes) qui rejoignent au nord la vallée de la Marne. On y rencontre également des fruticées, des prairies et des pelouses variées, ponctuellement des marais tufeux, une carrière (périodiquement utilisée), des jachères et quelques cultures.

Les pentes, raides et boisées présentent des types forestiers variés suivant leur orientation :

- hêtraie neutrophile à mésotrophe sur pente forte, à bois joli, mélisque à une fleur, euphorbe faux-amandier, violette des bois, etc.
- hêtraie sèche (*Carici albae-Fagetum*) et chênaie xérophile (plus rarement) sur les pentes les mieux exposées, avec une strate arborescente essentiellement constituée par le hêtre et le chêne sessile, plus rarement par l'alisier blanc, l'érable champêtre et le chêne pubescent. La strate herbacée comprend la laïche digitée, le brachypode penné, la primevère officinale, la mercuriale vivace, la mélisque penchée... Les lisières sont très intéressantes, on peut y observer le trèfle rougeâtre, la violette hérissée, l'hellébore fétide, le grémil officinal, le thlaspi perfolié, l'euphorbe verruqueuse ainsi que certaines espèces transgressives des pelouses proches.
- chênaie-charmaie calcicole sur pente faible, avec une strate arborescente largement dominée par le chêne sessile et le charme. Ils surmontent un tapis herbacé où se remarquent la primevère élevée, le lamier jaune, l'anémone des bois, l'ornithogale des Pyrénées, la renoncule des bois, le lierre, la raiponce en épi, etc.

- aulnaie-frênaie rivulaire et chênaie-charmaie humide de fond de vallon (répertoriée, dans le paragraphe concernant la typologie des milieux, dans "autres bois décidus" du code CORINE biotopes) où se remarquent l'anémone fausse-renoncule, l'oxalide petite oseille, la moschatelline, la laïche des bois, la reine des prés...

- pinèdes de pins sylvestres (plantations plus ou moins claires) et quelques plantations de pins noirs.

Une végétation particulière se développe au niveau des corniches et gradins rocheux, dans les clairières des bois thermophiles et sous les frondaisons clairsemées des pins sylvestres, avec divers groupements bien caractéristiques des pelouses calcaires (Mesobromion et ponctuellement Alysso-Sedion). On y rencontre les espèces typiques de ce type de milieux, avec l'anémone pulsatile, hélianthème jaune, le séséli des montagnes, le polygala calcaire, le cytise pédonculé, le brome dressé, le brachypode penné, la laïche glauque et diverses orchidées (orchis mâle, orchis pourpre, orchis pyramidal, listère ovale). Sur quelques dalles, dans la végétation plus clairsemée, apparaissent l'orpin âcre, le pâturin bulbeux et de nombreuses annuelles comme par exemple la drave printanière et le calament acinos.

Plusieurs petits marais tufeux se développent en pied de versant. Cette végétation palustre dense à base de molinie bleue et de laïches (laïche de Davall, laïche fauve, laïche écailleuse) renferme une espèce rare, protégée au niveau régional et inscrite sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne, la linaigrette à larges feuilles. Il s'agit des derniers marais tufeux typiques au nord du plateau de Langres (avec ceux plus réduits du Val Moiron et de Crenay).

Dans les jachères ou les cultures se rencontrent certaines messicoles telles que le peigne de Vénus, le moroir de Vénus, la noix de terre, la petite linaire, le sainfoin...

Les marais recèlent une libellule inscrite sur la liste rouge des Odonates de Champagne-Ardenne : le cordulégastre annelé.

Les reptiles fréquentent les forêts clairiérées, les pelouses, les falaises et rochers : on y observe la couleuvre verte et jaune (la plus méridionale des couleuvres de Champagne-Ardenne, très rare en Haute-Marne où se situe sa limite d'aire de répartition, inscrite sur la liste rouge régionale), la vipère aspic, le lézard des murailles (inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats). Pour les amphibiens, une espèce de la liste rouge régionale a été recensée sur le site, il s'agit de la salamandre tachetée.

L'avifaune est intéressante à plus d'un titre ; sur les 47 espèces inventoriées, six font partie de la liste rouge des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne dont le cincle plongeur (nicheur rare en diminution en Champagne-Ardenne) dans les zones humides et la pie-grièche écorcheur dans les buissons. Des pics variés, dont le pic épeiche, le pic vert, le pic épeichette, le pic mar (inscrit sur la liste rouge régionale) fréquentent les boisements. Le pic cendré y est signalé comme nicheur potentiel. La carrière dénudée accueille un couple de petits gravelots et l'alouette lulu.

La forêt est aussi fréquentée par le grosbec casse-noyaux, le geai des chênes, le roitelet à triple bandeau, le troglodyte mignon, le pinson des arbres, la grive musicienne, la sittelle torchepot, de nombreuses mésanges et des passereaux divers (bouvreuil pivoine, pipit des arbres, pouillot siffleur, pouillot véloce, pouillot fitis, fauvette à tête noire, tourterelle des bois, pigeon ramier...). Les zones embroussaillées accueillent le troglodyte mignon, l'accenteur mouchet, la fauvette des jardins, la linotte mélodieuse et les milieux ouverts attirent la locustelle tachetée, la fauvette grisette, la grive litorne, etc.

Les ruisseaux (du Val Darde, des Riaux, de Frétivaux) qui parcourent la ZNIEFF sont protégés par un Arrêté de Protection de Biotope pour la truite fario (reproduction et alimentation) depuis la source Saint-François en amont jusqu'à la confluence avec la Marne au lieu-dit "le Pré Darde" en aval, soit une longueur de 3,2 km de cours d'eau. Ils sont en partie temporaires.

La ZNIEFF est en bon état.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

A.P.B. pris le 12/12/94 sur 3,2 km de ruisseau en vue de la conservation d'un biotope à truite fario

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Odonates - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géologique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites correspondent au vallon d'un affluent de la Marne avec extension vers l'est à une zone naturelle bordée par des cultures. A l'est, la ZNIEFF est limitée à la clôture d'un parc à gibier.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| - Algues | - Poissons | - Amphibiens | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Odonates | - Mammifères | - Phanérogames |
| - Bryophytes | | - Reptiles | - Ptéridophytes |
| - Lichens | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.66 <i>Hêtraies calcicoles médio-européennes</i> | 41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i> | | | 15 | |
| C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i> | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | 1 | |
| E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | 34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i> | | | 5 | |
| | 41.H <i>Autres bois caducifoliés</i> | | | 5 | |
| D4.1 <i>Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i> | 54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | 82 <i>Cultures</i> | | | 4 | |
| | 54.12 <i>Sources d'eaux dures</i> | | | | |
| F3.16 <i>Fourrés à Juniperus communis</i> | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | 3 | |
| G3.4 <i>Pinèdes à Pinus sylvestris au sud de la taïga</i> | 42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i> | | | 5 | |
| E5.2 <i>Ourllets forestiers thermophiles</i> | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | 2 | |
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | | 1 | |
| G1.7 <i>Forêts caducifoliées thermophiles</i> | 41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> | | | 8 | |
| G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i> | 41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i> | | | 8 | |
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | 1 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i> | <i>34.11 Pelouses médio- européennes sur débris rocheux</i> | | | | |
| <i>H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques</i> | <i>62.1 Végétation des falaises continentales calcaires</i> | | | | |
| <i>G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i> | <i>41.2 Chênaies-charmaies</i> | | | 25 | |
| <i>G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | <i>44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 7 | |
| <i>G5.8 Coupes forestières récentes</i> | <i>31.87 Clairières forestières</i> | | | | |
| <i>E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i> | <i>38.2 Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | 5 | |
| <i>G3.F Plantations très artificielles de conifères</i> | <i>83.31 Plantations de conifères</i> | | | 4 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <i>24.1 Lits des rivières</i> | | | | |
| <i>G Boisements, forêts et autres habitats boisés</i> | <i>4 Forêts</i> | | | | |
| | <i>8 Terres agricoles et paysages artificiels</i> | | | | |
| <i>J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | <i>86.2 Villages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Autres bois décidus : chênaie-charmaie humide de fond de vallon.

Chênaies-charmaies (412) = chênaie-charmaie-hêtraie calcicole à *Scilla bifolia* substitutive de l'Asperulo-Fagion (4113).

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2000 - 2000 |
| Odonates | 65401 | <i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastre annelé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3136 | <i>Charadrius dubius Scopoli, 1786</i> | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2000 - 2000 |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cincle plongeur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2000 - 2000 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2000 - 2000 |
| | 3601 | <i>Picus canus Gmelin, 1788</i> | <i>Pic cendré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 96852 | <i>Eriophorum latifolium Hoppe, 1800</i> | <i>Linaigrette à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 116751 | <i>Quercus pubescens Willd., 1805</i> | <i>Chêne pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| Poissons | 67778 | <i>Salmo trutta fario Linnaeus, 1758</i> | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Reptiles | 77947 | <i>Coluber viridiflavus</i> <i>Lacepède, 1789</i> | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|---|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 317 | <i>Rana complexa</i> <i>esculenta</i> | <i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mulot sylvestre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61260 | <i>Arvicola terrestris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2000 - 2000 |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60596 | <i>Felis sylvestris</i> <i>Schreber, 1775</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> <i>Pallas, 1778</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2000 - 2016 |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 60636 | <i>Meles meles</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | <i>Campagnol des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2012 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2013 - 2013 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Corneille noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2012 |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2000 - 2000 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2016 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2016 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2016 |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2011 - 2011 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2012 - 2012 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | | | 2000 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2011 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4367 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2013 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2016 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2000 - 2000 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2016 |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2012 - 2016 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2012 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2011 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardennes | | | | 2016 - 2016 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acénaie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79779 | <i>Acer platanoides</i> L., 1753 | Érable plane, Plane | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79991 | <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | Moschatelline, Adoxe musquée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante, Consyre moyenne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81041 | <i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop., 1771 | Alchémille des champs, Aphane des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | Anémone des bois, Anémone sylvie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82656 | <i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753 | <i>Anémone fausse-renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85152 | <i>Atropa belladonna</i> L., 1753 | <i>Belladone, Bouton-noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86537 | <i>Bromus arvensis</i> L., 1753 | <i>Brome des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86983 | <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753 | <i>Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88459 | <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800 | <i>Laîche de Davall, Carex de Davall</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88470 | <i>Carex digitata</i> L., 1753 | Laïche digitée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | Laïche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | Laïche blonde | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | Laïche écailleuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88702 | <i>Carex muricata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89574 | <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 89697 | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 | Centauree scabieuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | Cirse des maraicher, Chardon des potagers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | Clématite des haies, Herbe aux gueux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | Colchique d'automne, Safran des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92497 | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92864 | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | Aubépine à deux styles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94111 | <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845 | Cytise pédonculé, Cytise retombant, Cytise rampant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespitose, Canche des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97008 | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | Drave de printemps | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97466 | <i>Euphorbia brittingeri</i> Opiz ex Samp., 1914 | <i>Euphorbe verruqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99272 | <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804 | <i>Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 135215 | <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub, 1964 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Hellébore fétide, Pied-de-griffon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103415 | <i>Iberis amara</i> L., 1753 | <i>Ibérís amer</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105410 | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | <i>Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106192 | <i>Linaria minor</i> (L.) Desf., 1799 | <i>Petite linaire, Petit Chaenorhinum</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Grande Listère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106379 | <i>Lithospermum arvense</i> L., 1753 | <i>Charée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107871 | <i>Melica nutans</i> L., 1753 | <i>Mélique penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108103 | <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762 | Menthe à longues feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110139 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772 | Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | Orchis mâle, Herbe à la couleuvre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | Orchis pourpre, Grivollée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | Coquelicot | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | Raiponce en épi | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113435 | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841 | Épicéa commun, Sérente | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113683 | <i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | <i>Pin noir d'Autriche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère élevée, Coucou des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Pulsatille vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | <i>Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117135 | <i>Ranunculus nemorosus</i> DC., 1817 | <i>Renoncule serpent, Renoncule radicante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117587 | <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777 | <i>Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | <i>Petit cocriste, Petit Rhinanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117787 | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 | <i>Groseillier à maquereaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121449 | <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753 | <i>Scandix Peigne-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | <i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | <i>Poivre de muraille, Orpin acre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125940 | <i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênnette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126376 | <i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753 | <i>Tabouret perfolié</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | <i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127463 | <i>Trifolium rubens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | | | 2008 - 2008 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | <i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129906 | <i>Viscum album</i> L., 1753 | <i>Gui des feuillus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 129906 | <i>Viscum album</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|-----------------------------------|---------|
| 3136 <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 3670 <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | |
| 3958 <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | C2.21 Épirhithron et métarhithron | Reproduction certaine ou probable | |
| 67778 <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758 | C2.21 Épirhithron et métarhithron | Reproduction certaine ou probable | |
| 96852 <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800 | D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires | Reproduction certaine ou probable | |
| 116751 <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | F3.16 Fourrés à <i>Juniperus communis</i> | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | ROYER J.M. & DIDIER B. | 1996 | Flore et végétation des marais tufeux du Plateau de Langres. Mémoire 2. Bulletin de la S.S.N.A.H.M., 112 pages |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | MIONNET Aymeric | | |
| | ROYER Jean-Marie | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Base de données Flora CBNBP | | |
| | Source inconnue - MAJ 2020 Collectif Faune Champagne-Ardenne | | |