

Pelouses des coteaux de Corbeny à Givray (Identifiant national : 220030005)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 214)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MESSEAN Adrien (Conservatoire des sites naturels de Picardie) ; COCQUEMPOT Marine (Conservatoire botanique national de Bailleul), .- 220030005, Pelouses des coteaux de Corbeny à Givray. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220030005.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) :MESSEAN Adrien (Conservatoire des sites naturels de Picardie) ; COCQUEMPOT Marine (Conservatoire botanique national de Bailleul)

Centroïde calculé : 680736°-2467893°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/10/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 10/07/2019

Date de première diffusion INPN : 16/01/2020

Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 14 |
| 9. SOURCES | 14 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Bruyères-sur-Fère (INSEE : 02127)

1.2 Superficie

15,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100

Maximale (mètre): 115

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les coteaux de la ZNIEFF étaient autrefois pâturés (au moins en partie comme l'attestent les restes de baillage) sont aujourd'hui abandonnés et soumis à la fermeture du milieu.

On peut retrouver des pelouses calcicoles rases sur de petites superficies, de rares pelouses calcaro-sableuses sur des corniches. Cependant, la majeure partie des coteaux est occupée par un ourlet à Brachypode des rochers (*Brachypodium rupestre*). Un cortège floristique d'intérêt prend place dans ces pelouses. Une jachère sèche, présente sur le haut du coteau, présente un intérêt patrimonial, avec une très grosse population d'Orobanche de la Picride (*Orobanche picridis*).

Dans la partie ouest de la ZNIEFF, les boisements ont colonisé les pentes des coteaux. On y trouve une végétation forestière dominée par la hêtraie calcaricole.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF comprend un ensemble de coteaux calcaires exposés au sud du Lutétien supérieur sur les plateaux et du Lutétien moyen au niveau des pentes.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ces pelouses sur calcaires du Lutétien moyen et supérieur, se situent sur coteaux (vallée du ru de l'Ourcq, en amont du marais de Givray) et sur le rebord sud du plateau de Cramaille.

Les contours englobent les pelouses sur coteau, les fourrés thermophiles et les bois de pente (complémentaires fonctionnellement) et des jachères mésoxérophiles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

L'abandon du pâturage, qui entretenait autrefois des végétations de pelouses rases et des écorchures, engendre une colonisation progressive de ces milieux par des espèces d'ourlets des sols secs riches en bases.

Dans certains secteurs, en lisières de haies et de boisements, ce sont des fourrés (*Crataego monogynae* – *Prunetea spinosae*) qui colonisent peu à peu les milieux ouverts.

Sans entretien particulier, à terme, les milieux ouverts tendent à disparaître au profit de boisements. Avec eux disparaîtront les éléments patrimoniaux pelousaires caractérisant l'intérêt de la ZNIEFF.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| - Algues | - Mammifères | - Lépidoptères | - Oiseaux |
| - Amphibiens | - Ptéridophytes | | - Phanérogames |
| - Autre Faunes | - Reptiles | | |
| - Bryophytes | - Diptères | | |
| - Lichens | | | |
| - Poissons | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |
| G1.631 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes collinéennes</i> | 41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i> | | Informateur : COCQUEMPOT M. | 10 | 2018 - 2018 |
| | 34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i> | | | | |
| | 34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| E5.22 <i>Ourllets mésophiles</i> | 34.42 <i>Lisières mésophiles</i> | | | | |
| E5.11 <i>Habitats des plaines colonisés par de hautes herbacées nitrophiles</i> | 87.1 <i>Terrains en friche</i> | | Informateur : COCQUEMPOT M. | 3 | 2018 - 2018 |
| F3.11 <i>Fourrés médio-européens sur sols riches</i> | 31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i> | | | 5 | 2018 - 2018 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| I1.1 <i>Monocultures intensives</i> | 82.11 <i>Grandes cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Les végétations de l'*Avenulo pratensis-Festucetum lemanii* et les ourlets associés (*Trifolio medii-Geranietea sanguinei*) sont inscrites à l'Annexe I de la directive * Habitats *.

Historiquement, des végétations des corniches calcaro-sableuses du *Koelerio macranthae* – *Phleion phleoidis* (également inscrites à l'annexe I de la directive * Habitats *) étaient observées. Aujourd'hui, leur état est vraiment dégradé et les surfaces qu'elles occupent sont minimales.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOBIGNY V.,PICARDIE NATURE,VAROQUEAUX V. | | | | 2016 - 2016 |
| Phanérogames | 131033 | <i>Ajuga chamaepitys</i> subsp. <i>chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 | Bugle petit-pin, Petite ivette, Bugle jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 81878 | <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L. | Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 84843 | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 | Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89968 | <i>Cerastium arvense</i> L. | Céraiste des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 91898 | <i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891 | Ziziphora acinos, Clinopode acinos, Clinopode des champs, Calament acinos, Thym basilic, Sarriette des champs, Petit basilic | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2008 - 2018 |
| | 93680 | <i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762 | Bleuet des moissons, Bleuet, Barbeau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 718359 | <i>Helictochloa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011 | <i>Hélictochloa des prés, Avénule des prés, Avoine des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 718368 | <i>Koeleria macrantha</i> subsp. <i>macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824 | <i>Koélérie à grandes fleurs, Koélérie grêle, Koélérie à grosses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 105273 | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753 | <i>Gesse tubéreuse, Macusson, Sanard, Gland-de-terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 107658 | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | <i>Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANCOIS R. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2009 - 2009 |
| | 612517 | <i>Microthlaspi perfoliatum</i> subsp. <i>perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973 | <i>Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 108597 | <i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischkin | <i>Minuartie à petites feuilles, Sabline à petites feuilles, Alsine à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill. | <i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., LAUGROS H. | | | | 2008 - 2018 |
| | 138286 | <i>Ophrys fuciflora</i> subsp. <i>fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M., LAUGROS H. | | | | 2008 - 2018 |
| | 111454 | <i>Orobanche amethystea</i> Thuill. | <i>Orobanche améthyste, Orobanche violette, Orobanche du panicaut</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111628 | <i>Orobanche picridis</i> F.W. Schultz | <i>Orobanche de la picride, Orobanche du picris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2008 - 2018 |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L. | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 115694 | <i>Potentilla verna</i> L., 1753 | <i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2008 - 2018 |
| | 140522 | <i>Salvia pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés, Sauge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 141045 | <i>Seseli montanum</i> subsp. <i>montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L. | <i>Épiaire droit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2008 - 2018 |
| | 141558 | <i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>germanicum</i> (F.Herm.) Rech.f., 1941 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | | | 2018 - 2018 |
| | 128970 | <i>Veronica praecox</i> All. | <i>Véronique précoce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRIMIN D.,MESSEAN A. | | | | 2006 - 2008 |
| | 129322 | <i>Vicia tenuifolia</i> Roth | <i>Vesce à feuilles ténues, Vesce à petites feuilles, Vesce à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Diptères | 192310 | <i>Eristalis latreillei</i> , 1804 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOBIGNY V.,VAROQUEAUX V. | | | | 2016 - 2016 |
| Lépidoptères | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Céphale (Le), Arcanie (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GERARD T. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAROQUEAUX V. | | | | 2016 - 2016 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOBIGNY V.,VAROQUEAUX V. | | | | 2016 - 2016 |
| | 186233 | <i>Chiroptera Blumenbach</i> , 1779 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOBIGNY V.,PICARDIE NATURE,VAROQUEAUX V. | | | | 2016 - 2016 |
| Oiseaux | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAROQUEAUX V. | | | | 2017 - 2017 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOBIGNY V.,VAROQUEAUX V. | | | | 2016 - 2016 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAROQUEAUX V. | | | | 2017 - 2017 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAROQUEAUX V. | | | | 2017 - 2017 |
| Phanérogames | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | <i>Aigremoine eupatoire, Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M. Rich. | <i>Anacamptide pyramidale</i> , <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptide en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 82369 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808 | <i>Lycopside des champs</i> , <i>Lycopsis des champs</i> , <i>Buglosse des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 85438 | <i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868 | <i>Hélictochloa des prés</i> , <i>Avénule des prés</i> , <i>Avoine des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 132169 | <i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 86512 | <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 | <i>Brome érigé</i> , <i>Brome dressé</i> , <i>Faux brome érigé</i> , <i>Faux brome dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 133004 | <i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>scabiosa</i> L., 1753 | <i>Centaurée scabieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L. | <i>Vipérine commune</i> , <i>Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L. | <i>Panicaut champêtre</i> , <i>Chardon Roland</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 98334 | <i>Festuca lemanii</i> Bast. | <i>Fétuque de Léman</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 134957 | <i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i> | <i>Gaillet vrai</i> , <i>Gaillet jaune</i> , <i>Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100144 | <i>Geranium rotundifolium</i> L. | <i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. | <i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD T., PICHARD O. | | | | 2008 - 2009 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L. | <i>Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 103406 | <i>Hyssopus officinalis</i> L. | <i>Hysope officinale, Hysope, Herbe sacrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 107027 | <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753 | <i>Lycopside des champs, Lycopsis des champs, Buglosse des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 110227 | <i>Ononis repens</i> L. | <i>Bugrane étalée, Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds. | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A., PICHARD O. | | | | 2008 - 2009 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L. | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115789 | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 139857 | <i>Reseda lutea</i> subsp. <i>lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 117459 | <i>Reseda luteola</i> L. | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 123683 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke | <i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |
| | 141299 | <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. | | | | 2008 - 2008 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Mammifères | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 186233 | <i>Chiroptera Blumenbach, 1779</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Oiseaux | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|
| Informateur | COCQUEMPOT M. | | |
| | COCQUEMPOT M.,LAUGROS H. | | |
| | DOBIGNY V.,PICARDIE NATURE,VAROQUEAUX V. | | |
| | DOBIGNY V.,VAROQUEAUX V. | | |
| | FRANCOIS R. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | |
| | FRIMIN D.,MESSEAN A. | | |
| | GERARD T. (CENP) | 0 | GERARD T. (CENP) |
| | GERARD T. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | |
| | GERARD T.,MESSEAN A. | | |
| | GERARD T.,PICHARD O. | | |
| | MESSEAN A. | | |
| | MESSEAN A. (CENP) | 0 | MESSEAN A. (CENP) |
| | MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | |
| MESSEAN A.,PICHARD O. | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---------------|----------------------|-------|
| | VAROQUEAUX V. | | |