

LE COTEAU DU MONT PLAISANT (Identifiant national : 230030568)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 72070000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230030568, LE COTEAU DU MONT PLAISANT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/230030568.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE

Centroïde calculé : 535652°-2537432°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2022

Date de première diffusion INPN : 08/06/2022

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 8 |
| 9. SOURCES | 8 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Saint-Pierre-des-Jonquières (INSEE : 76635)
- Commune : Bailleul-Neuville (INSEE : 76052)

1.2 Superficie

9,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 135

Maximale (mètre): 175

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le coteau calcaire du Mont plaisant, situé sur la commune de Bailleul-Neuville, est exposé Sud. Il est limité par un pâturage mésophile en haut de pente, par des champs en cultures en contre bas, un chemin à l'Ouest et un bois à l'Est.

L'intérêt biologique du site provient du fait qu'il persiste une flore et une faune caractéristique ayant un caractère patrimonial, formant des habitats calcicoles en bon état de conservation. Le site est bien visible de la route allant de Bailleul-Neuville à Smermesnil et garde un aspect paysager indéniable. Les principaux habitats sont une pelouse calcicole du mesobromion bien caractérisée et une junipéraie de grande taille. Une petite partie du mésobromion est envahie par le brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*) et des fourrés à prunellier (*Prunus spinosa*).

Les espèces végétales les plus remarquables sont l'orchis militaire (*Orchis militaris*) et la gymnadenie moucheron (*Gymnadenia conopsea*) qu'accompagne un cortège diversifié d'espèces calcicoles comprenant la chlore perfoliée (*Blackstonia perfoliata*), la carline commune (*Carlina vulgaris*), l'hippocrévide en ombelle (*Hippocrepis comosa*), le lin purgatif (*Linum catharticum*), l'ophrys abeille (*Ophrys apifera*), la platanthère des montagnes (*Platanthera chlorantha*), la véronique germandrée (*Veronica teucrium*).

Une espèce rarissime d'orthoptère a été observée en 2001, la decticelle bicolore (*Metrioptera bicolor*) dont c'est la deuxième station pour toute la région et la seule qui soit récente. L'entomofaune mériterait véritablement des compléments d'inventaires car d'autres espèces remarquables sont probablement présentes. Nous pouvons également signaler la présence sur le site du lézard vivipare (*Lazerta vivipara*), de zygènes ainsi que de nombreux autres lépidoptères.

La principale menace pesant sur le site est l'envahissement par le brachypode et le développement des fourrés en bas de pente. De même, la volonté apparente de "valoriser" ces milieux en les plantant est un risque fort de banaliser la flore et la faune. La colonisation par le brachypode entraîne la disparition ou la régression des populations d'autres espèces calcicoles. Il est nécessaire de rétablir un pâturage extensif et de supprimer les plantations afin de conserver la richesse du milieu.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | <p>31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i></p> | | Informateur : BRUNET L. | 35 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | <p>31.8 <i>Fourrés</i></p> | | Informateur : BRUNET L. | 5 | |
| | <p>41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i></p> | | Informateur : BRUNET L. | 5 | |
| | <p>34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i></p> | | Informateur : BRUNET L. | 40 | |
| | <p>86.4 <i>Sites industriels anciens</i></p> | | Informateur : BRUNET L. | 2 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i> | | Informateur : BRUNET L. | 13 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 82.11 <i>Grandes cultures</i> | | Informateur : BRUNET L. | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNET L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 132169 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i> | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL) | | | | 2021 - 2021 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i> , <i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNET L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL) | | | | 2002 - 2021 |
| | 111124 | <i>Orchis x hybrida</i> Boenn. ex Rchb., 1830 | <i>Orchis hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL) | | | | 2021 - 2021 |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | <i>Parnassie des marais</i> , <i>Hépatique blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MORA F. (CBNBL) | | | | 2006 - 2006 |
| | 128942 | <i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830 | <i>Véronique d'Orsini</i> , <i>Véronique douteuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABON Y. (CBNBL) | | | | 2021 - 2021 |
| | 129022 | <i>Veronica teucrium</i> L., 1762 | <i>Véronique germandrée</i> , <i>Véronique faux petit-chêne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNET L. | | | | 2002 - 2002 |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|------------------|----------------------|-------|
| Informateur | BRUNET L. | | |
| | CABON Y. (CBNBL) | | |
| | MORA F. (CBNBL) | | |