# Prairie humide de Chaudénéant (Identifiant national : 240031646)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 1412)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (BESLIN O.), .- 240031646, Prairie humide de Chaudénéant. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031646.pdf*

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) :CBNBP (BESLIN O.)
Centroïde calculé : 584202°-2261207°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 7
9. SOURCES ..... 7

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 240008370 - HAUTE-VALLEE DE LA RERE ET AFFLUENTS (Id reg. : 10270000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Cher
- Commune : Nançay (INSEE : 18159)

## 1.2 Superficie

2,62 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 118
Maximale (mètre): 125

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240008370 - HAUTE-VALLEE DE LA RERE ET AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 10270000)

## 1.5 Commentaire général

Cette zone se situe au sud du lieu-dit de Chaudénéant à 4 km de l'ouest de Nançay.

Au sein d'un versant de pente moyenne et majoritairement boisé, ce site présente une végétation landicole à Molinie plus ou moins fermée par de la Fougère aigle. Cet ensemble est creusé perpendiculairement et parallèlement à la pente, de drains qui constituent le principal intérêt du site. Ils sont bordés par des landes humides à Erica tetralix et colonisés au fond par une végétation pionnière à Rhynchospora alba, protégée régionalement, Drosera intermedia et Drosera rotundifolia, espèces protégées au niveau national.

Deux autres espèces protégées au niveau régional ponctuent le site, la Gentiane pneumonanthe au sud de cette prairie à Molinie et l'Osmonde royale sur les bords ombragés du drain.

Au total, sept espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont été observées, dont cinq sont protégées.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Versant de faible pente

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Floristique | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le contour de cette zone a été tracé à partir des limites de la prairie visibles sur l'orthophotoplan de 2011, en suivant les chemins en bordure pour la majorité du contour, et les zones de fourrés et de jeune boisement de Bouleau développés à l'ouest. Cette zone jouxte dans les parties sèches des plantations de pins, des fragments de lande et des formations à Fougère aigle, et dans la partie basse du versant, des jeunes boisements et fourrés frais, et d'une jeune plantation de pins.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *31.11*<br>*Landes humides atlantiques septentrionales* | *4010*<br>*Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix* | Informateur :<br>CBNBP (BESLIN O.) | 1 | 2014 |
| | *37.312*<br>*Prairies à Molinie acidiphiles* | *6410*<br>*Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)* | Informateur :<br>CBNBP (BESLIN O.) | 89 | 2014 |
| | *54.6*<br>*Communautés à Rhynchospora alba* | *7150*<br>*Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion* | Informateur :<br>CBNBP (BESLIN O.) | | 2014 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *31.861 Landes subatlantiques à Fougères* | | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | 10 | 2014 |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *41.B112 Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens* | | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | | 2014 |
| | *83.3112 Plantations de Pins européens* | | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | | 2014 |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

La prairie est d'une assez grande surface et de composition spécifique faible, comme c'est généralement le cas pour ce type de végétation. Quelques espèces typiques de cet habitat manquent (Carum verticillatum), et cela probablement dû au drainage. L'est de la zone est en partie fermé par de la Fougère aigle.

Il existe toutefois un net avantage lié à ces drains créés et entretenus : ils permettent à certains habitats tourbeux pionniers de s'exprimer et abritent ainsi les deux Drosera (rotundifolia et intermedia) en assez grand nombre, ainsi que quelques pieds de Rhynchospora alba.

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | *Rossolis intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | Fort | 200 | | 2014 |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | Moyen | 140 | | 2014 |
| | 96695 | *Erica tetralix L., 1753* | *Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | Fort | 1000 | | 2014 |
| | 99922 | *Gentiana pneumonanthe L., 1753* | *Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | Faible | 10 | | 2014 |
| | 104334 | *Juncus squarrosus L., 1753* | *Jonc rude, Jonc raide, Brossière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | Faible | | | 2014 |
| | 117731 | *Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805* | *Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | Faible | 30 | | 2014 |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (BESLIN O.) | Faible | 2 | | 2014 |

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Angiospermes | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Informateur | CBNBP (BESLIN O.) | | |