



COTEAU DE BONDIEUSE (Identifiant national : 260002932)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 24005052)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : J.Ch. Weidmann (DIREN), SHNA (BALAY G., BELLENFANT S.), - 260002932, COTEAU DE BONDIEUSE .
- INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260002932.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) : J.Ch. Weidmann (DIREN), SHNA (BALAY G., BELLENFANT S.)
Centroïde calculé : 667478°-2257112°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 12 |
| 9. SOURCES | 13 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260009930](#) - MASSIFS FORESTIERS, PELOUSES ET PETITES VALLEES AU NORD DU PLATEAU NIVERNAIS (Id reg. : 24005000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Nièvre
- Commune : Châteauneuf-Val-de-Bargis (INSEE : 58064)
- Commune : Saint-Malo-en-Donzinois (INSEE : 58252)
- Commune : Cessy-les-Bois (INSEE : 58048)

1.2 Superficie

78,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 265

Maximale (mètre): 310

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260009930](#) - MASSIFS FORESTIERS, PELOUSES ET PETITES VALLEES AU NORD DU PLATEAU NIVERNAIS (Type 2) (Id reg. : 24005000)

1.5 Commentaire général

Au cœur des plateaux du Nivernais, le site couvre un coteau festonné très pentu avec des friches, des pelouses, des pâtures et des boisements associés à quelques bordures cultivées.

Ce site est d'intérêt régional pour sa faune et sa flore des pelouses sèches.

Cet ensemble thermophile paraît être le plus remarquable du secteur. La diversité des espèces déterminantes montre une richesse exceptionnelle. Le cortège floristique compte notamment de nombreuses orchidées. Parmi les espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF qui ont été répertoriées figurent :

- la Céphalanthère rouge (*Cephalanthera rubra*), protégée réglementairement,
- le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*), protégée réglementairement,
- l'Orobanche grêle (*Orobanche gracilis*),
- la Céphalanthère à longues feuilles (*Cephalanthera longifolia*).

Plusieurs espèces végétales, dont la Pulsatille vulgaire (*Anemone pulsatilla*), l'Orobanche grêle (*Orobanche gracilis*), la Blackstonie perfoliée (*Blackstonia perfoliata*) et le Genêt des teinturiers (*Genista tinctoria*) caractérisent ces pelouses marneuses.

Une grosse population d'ascalaphes, insectes névroptères, exploite les pelouses. La Cigale des montagnes (*Cicadetta montana*) a été observée dans la fruticée.

Le site est par ailleurs intéressant pour les reptiles avec la présence du Lézard vert (*Lacerta bilineata*) et de la Couleuvre d'Esculape (*Zamenis longissima*), ainsi que pour la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), rapace diurne d'intérêt européen.

Les quelques cultures et jachères accueillent enfin le Peigne de Vénus (*Scandix pecten-veneris*), plante assez rare.

Des secteurs en déprise, sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Escarpement, versant pentu
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par les secteurs exposés au sud (avec pelouses et boisements secs). Les cultures et les forêts de plateau sont exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----|
| - Algues | - Oiseaux | - Phanérogames | |
| - Amphibiens | - Reptiles | - Ptéridophytes | |
| - Autre Faunes | | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Mammifères | | | |
| - Poissons | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |
| | 31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i> | | | | |
| | 34.42 <i>Lisières mésophiles</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i> | | | | |
| | 41.271 <i>Chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i> | | | | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne (WEIDMANN J.Ch.) | | | | 1999 |
| Phanérogames | 89926 | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888 | <i>Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE | | | | |
| | 89928 | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne (WEIDMANN J.Ch.) | | | 50 | 1999 |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE | | | | |
| Reptiles | 77993 | <i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne (WEIDMANN J.Ch.) | | | | 1999 |
| | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | <i>Lézard à deux raies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne (WEIDMANN J.Ch.) | | | | 1999 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 52113 | <i>Ascalaphus libelluloides</i> Schäffer, 1763 | <i>Ascalaphe soufré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Hémiptères | 51911 | <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772) | <i>Cigale des montagnes, Petite cigale montagnarde</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aurore (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54339 | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53621 | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | <i>Fadet des Laïches (Le), Oedipe (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54386 | <i>Colias australis</i> Verity, 1911 | <i>Fluoré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53747 | <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | <i>Campagnol des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mollusques | 64247 | <i>Cepaea hortensis</i> (O.F. Müller, 1774) | <i>Escargot des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 64248 | <i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Escargot des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 62032 | <i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774) | <i>Élégante striée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Oiseaux | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88560 | <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779 | <i>Laïche de Haller</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90905 | <i>Chlora perfoliata</i> (L.) L., 1767 | <i>Chlorette, Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | <i>Coronille naine, Coronille mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99846 | <i>Genistella sagittalis</i> (L.) Gams, 1923 | <i>Genêt ailé, Genistrolle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Globulaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Grande Listère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106623 | <i>Loroglossum hircinum</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre, Grivollée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111012 | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | <i>Orchis brûlé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Pulsatille vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116712 | <i>Quercus lanuginosa</i> (Lam.) Thuill., 1799 | <i>Chêne pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116751 | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | <i>Chêne pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés, Sauge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121449 | <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753 | <i>Scandix Peigne-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne manciennne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|--|---|
| Insectes | 53621 | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE | | |
| | Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne (WEIDMANN J.Ch.) | | |
| | PRONAT : Etude et Gestion Milieux naturels en Nivernais-Morvan. | | |