

BAS MORVAN SUD OUEST (Identifiant national : 260014856)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 04004000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CELLULE D'APPLICATION EN ECOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE DIJON, S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.), - 260014856, BAS MORVAN SUD OUEST. - INPN, SPN-MNHN Paris, 37P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014856.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) : CELLULE D'APPLICATION EN ECOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE DIJON, S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)

Centroïde calculé : 721027°-2188571°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 04/10/2022

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 6 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 6 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 6 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 7 |
| 6. HABITATS | 8 |
| 7. ESPECES | 23 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 37 |
| 9. SOURCES | 37 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [260014369](#) - (Id reg. : 04004058)
- Id nat. : [260014858](#) - (Id reg. : 04004035)
- Id nat. : [260030292](#) - (Id reg. : 04004049)
- Id nat. : [260005561](#) - (Id reg. : 04004028)
- Id nat. : [260030299](#) - (Id reg. : 04104013)
- Id nat. : [260030289](#) - (Id reg. : 04004031)
- Id nat. : [260014857](#) - (Id reg. : 04004043)
- Id nat. : [260030030](#) - (Id reg. : 04004038)
- Id nat. : [260014859](#) - (Id reg. : 04004041)
- Id nat. : [260030293](#) - (Id reg. : 04004026)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Département : Nièvre
- Commune : Millay (INSEE : 58168)
- Commune : Tazilly (INSEE : 58287)
- Commune : Gilly-sur-Loire (INSEE : 71220)
- Commune : Chapelle-au-Mans (INSEE : 71088)
- Commune : Guerreaux (INSEE : 71229)
- Commune : Bourbon-Lancy (INSEE : 71047)
- Commune : Poil (INSEE : 58211)
- Commune : Avrée (INSEE : 58019)
- Commune : Sainte-Radegonde (INSEE : 71474)
- Commune : Chalmoux (INSEE : 71075)
- Commune : Larochemillay (INSEE : 58140)
- Commune : Sémelay (INSEE : 58276)
- Commune : Thil-sur-Arroux (INSEE : 71537)
- Commune : Rigny-sur-Arroux (INSEE : 71370)
- Commune : Toulon-sur-Arroux (INSEE : 71542)
- Commune : Saint-Honoré-les-Bains (INSEE : 58246)
- Commune : Cuzy (INSEE : 71166)
- Commune : Montmort (INSEE : 71317)
- Commune : Marly-sous-Issy (INSEE : 71280)
- Commune : Rémillly (INSEE : 58221)
- Commune : Ternant (INSEE : 58289)
- Commune : Lesme (INSEE : 71255)
- Commune : Charbonnat (INSEE : 71098)
- Commune : Gueugnon (INSEE : 71230)
- Commune : Fléty (INSEE : 58114)
- Commune : Maltat (INSEE : 71273)
- Commune : Vitry-sur-Loire (INSEE : 71589)
- Commune : Perrigny-sur-Loire (INSEE : 71348)
- Commune : Saint-Agnan (INSEE : 71382)
- Commune : Nucle-Maulaix (INSEE : 58195)
- Commune : Issy-l'Évêque (INSEE : 71239)
- Commune : Chiddes (INSEE : 58074)
- Commune : Cronat (INSEE : 71155)
- Commune : Luzy (INSEE : 58149)
- Commune : Lanty (INSEE : 58139)
- Commune : Curdin (INSEE : 71161)
- Commune : Savigny-Poil-Fol (INSEE : 58274)
- Commune : Cressy-sur-Somme (INSEE : 71152)
- Commune : Motte-Saint-Jean (INSEE : 71325)
- Commune : Montambert (INSEE : 58172)
- Commune : Vendennes-sur-Arroux (INSEE : 71565)
- Commune : Villapourçon (INSEE : 58309)

- Commune : Saint-Didier-sur-Arroux (INSEE : 71407)
- Commune : Neuvy-Grandchamp (INSEE : 71330)
- Commune : Digoïn (INSEE : 71176)
- Commune : Saint-Seine (INSEE : 58268)
- Commune : Grury (INSEE : 71227)
- Commune : Uxeau (INSEE : 71552)
- Commune : Saint-Aubin-sur-Loire (INSEE : 71389)
- Commune : Mont (INSEE : 71301)

1.2 Superficie

92376,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 211

Maximale (mètre): 470

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260030289](#) - BOIS MARGOSSON ET CHAMOIS (Type 1) (Id reg. : 04004031)
- Id nat. : [260030030](#) - BOCAGE DE VITRY-SUR-LOIRE (Type 1) (Id reg. : 04004038)
- Id nat. : [260014857](#) - LES ETANGS DE BRIFFAUT (Type 1) (Id reg. : 04004043)
- Id nat. : [260014859](#) - ETANG DE GARNOT ET BOIS DE SERRE (Type 1) (Id reg. : 04004041)
- Id nat. : [260014369](#) - BOIS DE LA MOTTE ET VALLEE DE LA TESSONNE A LA MOTTE-SAINT-JEAN (Type 1) (Id reg. : 04004058)
- Id nat. : [260030292](#) - CARRIERE DES BRUYERES FOUGEANTS (Type 1) (Id reg. : 04004049)
- Id nat. : [260030293](#) - BOCAGE D' ISSY-L'EVEQUE ET SAINTE RADEGONDE (Type 1) (Id reg. : 04004026)
- Id nat. : [260030299](#) - BOCAGE ET RUISSEAUX DE SAVIGNY A LUZY ET ISSY-L'EVEQUE (Type 1) (Id reg. : 04104013)
- Id nat. : [260005561](#) - LANDES SECHES ET MILIEUX TOURBEUX DU BOIS DU BREUIL (Type 1) (Id reg. : 04004028)
- Id nat. : [260014858](#) - SIGNAL DE MONT ET LANDES SECHES DE MALTAT (Type 1) (Id reg. : 04004035)

1.5 Commentaire général

Le territoire, qui s'étend de la Loire au sud-ouest au pied des collines du Morvan, est assis sur les terrains cristallins et volcaniques (au niveau du Signal de Mont) appartenant au Bas-Morvan sud. Il comprend des collines dominées par des prairies bocagères, associées à des boisements et localement à quelques étangs. L'ensemble est drainé par un dense chevelu de cours d'eau.

Ce site est d'intérêt régional pour ses forêts, ses prairies bocagères, ses étangs, ses tourbières et ses cours d'eau, avec la faune et la flore associées.

1) Le fond prairial est constitué de prairies pâturées sur sols sains. A la faveur de sols superficiels développées au niveau des granites et des basaltes, des milieux d'intérêt régional s'expriment tels que :

- végétations des affleurements de rochers siliceux , d'intérêt européen,
- pelouses acidiphiles à vivaces sur sols sains et acides, d'intérêt européen,
- pelouses calcaréo-siliceuses à Fétuque à longues feuilles (*Festuca longifolia*), d'intérêt européen,
- landes sèches relictuelles, d'intérêt européen.

Tandis que dans les fonds de vallons humides se développent :

- des prairies humides sur sols paratourbeux, d'intérêt européen,
- des tourbières, d'intérêt européen,
- des landes humides, d'intérêt européen,

- des bas-marais acides, d'intérêt régional.

Ces milieux hébergent une grande diversité d'espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- Spiranthe d'été (*Spiranthes aestivalis*), orchidée de tourbières, exceptionnelle en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France, protégée réglementairement,
- Utriculaire mineure (*Utricularia minor*), plante carnivore aquatique exceptionnelle en Bourgogne,
- Anarrhine à feuilles de pâquerette (*Anarrhinum bellidifolium*), plante de rochers et arènes siliceuses, très rare en Bourgogne, proche de la limite nord de son aire de répartition, protégée réglementairement.

Au niveau de sources de suintements en prairies, une faune déterminante pour l'inventaire ZNIEFF a été répertoriée :

- Agrion orné (*Coenagrion ornatum*), libellule d'intérêt européen,
- Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*), crapaud d'intérêt européen.

2) Quelques étangs (Briffault, Grandchamps,...), dont le niveau d'eau baisse en été, présentent des successions végétales variées avec :

- divers herbiers aquatiques de plans d'eau, d'intérêt régional à européen,
- végétations amphibies des grèves sableuses exondées, d'intérêt européen,
- divers types de caricaies et de roselières,
- saulaies marécageuses.

La Littorelle à une fleur (*Littorella uniflora*), plante amphibie protégée réglementairement, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France, caractérise les berges d'étangs exondées.

3) Les ruisseaux, et les petites rivières, bordés de ripisylves d'aulnes et de frênes, habitat d'intérêt européen, accueillent une faune aquatique déterminante pour l'inventaire ZNIEFF, avec notamment le Chabot (*Cottus gobio*), poisson d'intérêt européen.

4) Les boisements sont constitués de chênaies-charmaies sur sols neutres à peu acides et de chênaies sessiliflores sur terrains acides dans les parties à basse altitude. La hêtraie-chênaie acidiphile, d'intérêt européen, couvre les reliefs. Des aulnaies marécageuses voire tourbeuses, d'intérêt régional, sont notées dans les vallons.

5) Le Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*), rapace d'intérêt européen, est considéré comme nicheur rare en Bourgogne et est connu pour nicher dans les zones de carrières ou d'affleurement rocheux naturels.

6) Le complexe des milieux présents sur le site (prairies, forêts, étangs, cours d'eau) accueille une avifaune déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), rapace nocturne menacé par la disparition du bocage et notamment des vieux arbres qu'il utilise préférentiellement pour nidifier,
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*), passereau nicheur assez rare en Bourgogne, menacé par l'altération de son habitat de reproduction,
- Busard cendré (*Circus pygargus*), rapace diurne nicheur rare en Bourgogne, menacé par la régression de son habitat de reproduction et par la destruction directe des nids en milieux cultivés.

Ce patrimoine dépend :

- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours et plans d'eau, et des zones humides,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, coupes),

- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation, privilégiant notamment des berges sans enrochements ainsi qu'une limitation des engrais.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les ripisylves.

Les zones tourbeuses et certaines pelouses sèches en déprise agricole sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration (déboursoillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Des parties du site sont désignées au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat :

A l'ouest : LANDES SECHES ET TOURBIERE DU BOIS DU BREUIL ,

A l'est : BOCAGE, FORET ET MILIEUX HUMIDES DU SUD MORVAN.

Une frange ouest du site est désignée au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : VALLEE DE LA LOIRE DE IGUERANDE A DECIZE.

Site classé:

-Signal de Mont ;

-Tilleul de Grury.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Etang
- Vallée
- Colline
- Vallon

- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Soutien naturel d'étiage - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par un vaste secteur de prairies bocagères, riches en milieux secs et humides d'intérêt régional et hébergeant des espèces végétales et animales également d'intérêt régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Odonates - Lépidoptères - Basidiomycètes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|--|--------------------------|-------------|-------------|
| G1.622 <i>Hêtraies acidophiles subatlantiques</i> | 41.122 <i>Hêtraies acidophiles sub-atlantiques</i> | 9120 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| E1.91 <i>Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines</i> | 35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C1.232 <i>Formations à petits Potamots</i> | 22.422 <i>Groupements de petits Potamots</i> | 3150 <i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C3.513 <i>Communautés naines à Jonc des crapauds</i> | 22.323 <i>Communautés naines à Juncus bufonius</i> | 3130 <i>Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C3.53 <i>Communautés eurosibériennes annuelles des vases fluviatiles</i> | 24.52 <i>Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| E3.41B <i>Prairies à Joncs et à Crételle</i> | 37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| E5.41 <i>Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces</i> | 37.715 <i>Ourllets riverains mixtes</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| D5.2142 <i>Cariçaises à Laïche vésiculeuse</i> | 53.2142 <i>Cariçaises à Carex vesicaria</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| G1.631 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes collinéennes</i> | 41.131 <i>Hêtraies à Mélisque</i> | 9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C3.53 <i>Communautés eurosibériennes annuelles des vases fluviatiles</i> | 24.52 <i>Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles</i> | 3270 <i>Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodium rubri p.p. et du Bidention p.p.</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| G1.111 <i>Saulais à Salix alba médio-européennes</i> | 44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i> | 91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|
| C3.511 <i>Communautés naines des eaux douces à Eleocharis</i> | 22.321 <i>Communautés à Eleocharis</i> | 3130 <i>Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i> | 37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i> | 6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C2.34 <i>Végétations eutrophes des cours d'eau à débit lent</i> | 24.44 <i>Végétation des rivières eutrophes</i> | 3260 <i>Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitriche-Batrachion</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| E2.22 <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i> | 38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i> | 6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| G1.212 <i>Bois des rivières à débit rapide à Fraxinus et Alnus</i> | 44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i> | 91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| D5.2142 <i>Cariçaias à Laïche vésiculeuse</i> | 53.2142 <i>Cariçaias à Carex vesicaria</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C3.4111 <i>Pelouses à Littorelle</i> | 22.3111 <i>Gazons de Littorelles</i> | 3110 <i>Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i> | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| G1.631 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes collinéennes</i> | 41.131 <i>Hêtraies à Mélisque</i> | 9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i> | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C1.2411 <i>Tapis de Nénuphar</i> | 22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| G1.A13 <i>Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior</i> | 41.23 <i>Frênaies-chênaies subatlantiques à primevère</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| | 42.425 <i>Forêts de Pins de montagne à Pulsatille</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| | 51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| A5.344 <i>Agrégats de Ocnus planci sur sédiment vaseux abrité subtidal</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 24.31 <i>Bancs de sable des rivières sans végétation</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| B1.321 <i>Dunes blanches atlantiques</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| | 31.61 <i>Broussailles d'Aulnes verts</i> | 9430 <i>Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)</i> | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| A2.53 <i>Roselières, jonchaies et cariçaies salines et saumâtres de la partie moyenne à supérieure des marais salés</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| A5.283 <i>Faciès à Loripes lucinalis (anciennement Loripes lacteus), Tapes spp.</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| | 22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| | 22.3 <i>Communautés amphibiens</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| A1.232 <i>Concrétion de Neogoniolithon brassica-florida</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| A5.343 <i>Philine aperta et Virgularia mirabilis dans de la vase meuble stable infralittorale</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| | 41.131 <i>Hêtraies à Mélique</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| A1.232 <i>Concrétion de Neogoniolithon brassica-florida</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| A2.53 <i>Roselières, jonchaies et cariçaies salines et saumâtres de la partie moyenne à supérieure des marais salés</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| | 36.345 <i>Pelouses à Oreochloa disticha de l'Allgau</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| | 42.425 <i>Forêts de Pins de montagne à Pulsatille</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| E2.22 <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i> | 38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i> | 6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i> | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2013 - 2013 |
| E1.92 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i> | 35.22 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2013 - 2013 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|
| G1.622 <i>Hêtraies acidophiles subatlantiques</i> | 41.122 <i>Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2013 - 2013 |
| C1.221 <i>Couvertures de lentilles d'eau</i> | 22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i> | 3150 <i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i> | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2013 - 2013 |
| G1.2111 <i>Aulnaies-frênaies à Laïches</i> | 44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i> | 91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i> | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2013 - 2013 |
| E1.28 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses d'Europe centrale</i> | 34.341 <i>Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux</i> | 6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i> | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2013 - 2013 |
| D2.222 <i>Bas-marais subatlantiques à Laïche vulgaire, Laïche blanchâtre et Laïche étoilée</i> | 54.422 <i>Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i> | | | | |
| D1.112 <i>Cuvettes des tourbières hautes (schlenken)</i> | 51.12 <i>Tourbières basses (Schlenken)</i> | | | | |
| C1.131 <i>Communautés des eaux oligotrophes à Potamots</i> | 22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i> | | | | |
| C1.22 <i>Végétations flottant librement des plans d'eau mésotrophes</i> | 22.41 <i>Végétations flottant librement</i> | | | | |
| E1.72 <i>Pelouses à Agrostis et Festuca</i> | 35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i> | | | | |
| D2.3 <i>Tourbières de transition et tourbières tremblantes</i> | 54.5 <i>Tourbières de transition</i> | | | | |
| G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| D2.3H <i>Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et acides, avec Rhynchospora alba et Drosera</i> | 54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i> | | | | |
| E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i> | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | | | | |
| G1.412 <i>Aulnaies marécageuses oligotrophes</i> | 44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| F4.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | 31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | | | | |
| F4.11 <i>Landes humides septentrionales</i> | 31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i> | | | | |
| E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i> | 37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i> | | | | |
| G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i> | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | | |
| C3.513 <i>Communautés naines à Jonc des crapauds</i> | 22.323 <i>Communautés naines à Juncus bufonius</i> | | | | |
| C3.412 <i>Gazons à Scirpe épingle en eaux peu profondes</i> | 22.312 <i>Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes</i> | | | | |
| G1.A13 <i>Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior</i> | 41.23 <i>Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère</i> | | | | |
| E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i> | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | | |
| C3.511 <i>Communautés naines des eaux douces à Eleocharis</i> | 22.321 <i>Communautés à Eleocharis</i> | | | | |
| G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| G1.41 <i>Aulnaies marécageuses ne se trouvant pas sur tourbe acide</i> | 44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i> | | | | |
| | 51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i> | | | | |
| | 44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i> | | | | |
| | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | 37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i> | | | | |
| | 35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | | | |
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 24.32 <i>Bancs de sable riverains pourvus de végétation</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i> | | | | |
| D1.1112 <i>Pelouses et bases des buttes vertes à Linaigrette vaginée et Sphaignes</i> | 51.112 <i>Bases des buttes et pelouses de Sphaignes vertes</i> | | | | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |
| | 22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i> | | | | |
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | | |
| | 54.5 <i>Tourbières de transition</i> | | | | |
| | 54.4 <i>Bas-marais acides</i> | | | | |
| | 54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i> | | | | |
| | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | | |
| | 51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i> | | | | |
| | 37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i> | | | | |
| | 35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes</i> | | | | |
| | 34.34 <i>Pelouses calcaréo- siliceuses de l'Europe centrale</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E1.9 Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales</i> | <i>35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i> | | | | |
| <i>D1.1121 Cuvettes à Sphaignes</i> | <i>51.121 Chenaux, cuvettes profondes</i> | | | | |
| <i>D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i> | <i>54.4 Bas-marais acides</i> | | | | |
| <i>G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | <i>44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| <i>E3.512 Prairies acidoclines à Molinie bleue</i> | <i>37.312 Prairies à Molinie acidiphiles</i> | | | | |
| <i>G1.5 Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide</i> | <i>44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i> | | | | |
| <i>G1.81 Bois atlantiques de Quercus robur et Betula</i> | <i>41.51 Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i> | | | | |
| <i>G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i> | <i>41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | | |
| <i>D1.121 Tourbières hautes dégradées, inactives, envahies par Molinia</i> | <i>51.2 Tourbières à Molinie bleue</i> | | | | |
| <i>E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus</i> | <i>37.22 Prairies à Jonc acutiflore</i> | | | | |
| <i>C2.1 Sources, ruisseaux de sources et geysers</i> | <i>54.1 Sources</i> | | | | |
| <i>D1.112 Cuvettes des tourbières hautes (schlenken)</i> | <i>51.12 Tourbières basses (Schlenken)</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>C1 Eaux dormantes de surface</i> | <i>22.1 Eaux douces</i> | | | | |
| <i>C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i> | <i>24.1 Lits des rivières</i> | | | | |
| <i>X10 Bocages</i> | <i>84.4 Bocages</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| F3.1 <i>Fourrés tempérés</i> | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| F9.2 <i>Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix</i> | 44.92 <i>Saussaies marécageuses</i> | | | | |
| | 41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| X10 <i>Bocages</i> | 84.4 <i>Bocages</i> | | | 3 | |
| C3.53 <i>Communautés eurosibériennes annuelles des vases fluviales</i> | 24.32 <i>Bancs de sable riverains pourvus de végétation</i> | | | | |
| J2.61 <i>Terrains vagues des constructions rurales abandonnées</i> | 86.413 <i>Carrières de pierres</i> | | | | |
| G1.A13 <i>Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior</i> | 41.23 <i>Frênaies-chênaies subatlantiques à primevère</i> | | | | |
| F3.13 <i>Fourrés atlantiques sur sols pauvres</i> | 31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i> | | | | |
| E5.4 <i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i> | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| G1.2112 <i>Aulnaies-frênaies fontinales</i> | 44.312 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes fontinales</i> | | | | |
| G1.82 <i>Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques</i> | 41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i> | | | | |
| G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i> | 84.3 <i>Petits bois, bosquets</i> | | | | |
| C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i> | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i> | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | 1 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés | 83.32 Plantations d'arbres feuillus | | | | |
| G1 Forêts de feuillus caducifoliés | 41 Forêts caducifoliées | | | | |
| J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines | 86.2 Villages | | | | |
| C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide | 24.1 Lits des rivières | | | | |
| I1 Cultures et jardins maraîchers | 82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés | | | | |
| G5.8 Coupes forestières récentes | 31.87 Clairières forestières | | | | |
| H3 Falaises continentales, pavements rocheux et affleurements rocheux | 62 Falaises continentales et rochers exposés | | | | |
| | 24.1 Lits des rivières | | | | |
| | 22.1 Eaux douces | | | | |
| | 86.41 Carrières | | | | |
| | 86.2 Villages | | | | |
| | 84.4 Bocages | | | | |
| | 83.31 Plantations de conifères | | | | |
| | 53.2 Communautés à grandes Laïches | | | | |
| | 53.1 Roselières | | | | |
| | 41.5 Chênaies acidiphiles | | | | |
| G1.82 Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques | 41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres | | | | |
| C2.21 Épirhithron et métarhithron | 24.12 Zone à Truites | | | | |
| C2.16 Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source) | 24.11 Ruisselets | | | | |
| C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents | 22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines | 86.2 Villages | | | | |
| X10 Bocages | 84.4 Bocages | | | | |
| E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | |
| F3.162 Landes subatlantiques à Genévrier | 31.882 Landes à Genévriers | | | | |
| C2.1A Végétations mésotrophes des ruisseaux de sources | 24.43 Végétation des rivières mésotrophes | | | | |
| F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista | 31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune | | | | |
| X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle | 82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée | | | | |
| H3.1 Falaises continentales siliceuses acides | 62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses | | | | |
| G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria | 41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques | | | | |
| G5.8 Coupes forestières récentes | 31.87 Clairières forestières | | | | |
| E3.512 Prairies acidoclines à Molinie bleue | 37.312 Prairies à Molinie acidiphiles | | | | |
| F3.11 Fourrés médio- européens sur sols riches | 31.81 Fourrés médio- européens sur sol fertile | | | | |
| G1.212 Bois des rivières à débit rapide à Fraxinus et Alnus | 44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide | | | | |
| G1.872 Chênaies acidophiles thermophiles des chaînes hercyniennes occidentales | 41.572 Chênaies acidiphiles xéro-thermophiles | | | | |
| E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines | 35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines | | | | |
| J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines | 86.2 Villages | | | | |
| C1 Eaux dormantes de surface | 22.1 Eaux douces | | | | |
| C2.11 Sources d'eau douce | 54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| H3.5 <i>Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires</i> | 62.3 <i>Dalles rocheuses</i> | | | 1 | |
| G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i> | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| J3 <i>Sites industriels d'extraction</i> | 86.41 <i>Carrières</i> | | | | |
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.11 <i>Pâturages continus</i> | | Informateur : Biotope | | 2013 - 2013 |
| C3.251 <i>Glycériales</i> | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| E3.41B <i>Prairies à Joncs et à Crételle</i> | 37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i> | | Informateur : Biotope | | 2013 - 2013 |
| E2.113 <i>Pâturages collinéens subatlantiques</i> | 38.112 <i>Pâturages à Cynosurus-Centaurea</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| C3.52 <i>Communautés à Bidens (des rives des lacs et des étangs)</i> | 22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i> | | Informateur : Biotope | 1 | 2013 - 2013 |
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.11 <i>Pâturages continus</i> | | Informateur : Biotope | | 2013 - 2013 |
| G5.85 <i>Clairières à couvert arbustif</i> | 31.872 <i>Clairières à couvert arbustif</i> | | Informateur : Biotope | | 2013 - 2013 |
| G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i> | 83.312 <i>Plantations de conifères exotiques</i> | | Informateur : Biotope | | 2013 - 2013 |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| C1.25 <i>Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau mésotrophes</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2015 - 2015 |
| G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i> | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | | 2013 - 2013 |
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.11 <i>Pâturages continus</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | | 2013 - 2013 |
| | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | | Informateur : Lesieur-Maquin N. (PNRM) | | 2014 - 2014 |
| I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i> | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| G1.8 <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i> | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| E2.6 <i>Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i> | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i> | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | | |
| C1 <i>Eaux dormantes de surface</i> | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| G1.87 <i>Chênaies acidophiles médio-européennes</i> | 41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i> | | | | |
| J4.3 <i>Réseaux ferroviaires</i> | 86.43 <i>Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts</i> | | | | |
| G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i> | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| F3.1 <i>Fourrés tempérés</i> | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| X10 <i>Bocages</i> | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |
| C2.16 <i>Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i> | 24.11 <i>Ruisselets</i> | | | | |
| C1 <i>Eaux dormantes de surface</i> | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| C3.24A <i>Tapis de Scirpe des marais</i> | 53.14A <i>Végétation à Eleocharis palustris</i> | | | | |
| D5.3 <i>Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d'autres grands Juncus</i> | 53.5 <i>Jonchaies hautes</i> | | | | |
| C2.11 <i>Sources d'eau douce</i> | 54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i> | | | | |
| D2.3 <i>Tourbières de transition et tourbières tremblantes</i> | 54.5 <i>Tourbières de transition</i> | | | | |
| C3.247 <i>Communautés à Prêle des eaux</i> | 53.147 <i>Communautés de Prés de l'eau</i> | | | | |
| C3.52 <i>Communautés à Bidens (des rives des lacs et des étangs)</i> | 22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| D5.216 <i>Cariçaises à Laîche paniculée</i> | 53.216 <i>Cariçaises à Carex paniculata</i> | | | | |
| E2.112 <i>Pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea</i> | 38.112 <i>Pâturages à Cynosurus-Centaurea</i> | | | | |
| C1.32 <i>Végétations flottant librement des plans d'eau eutrophes</i> | 22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i> | | | | |
| E3.419 <i>Prairies à Scirpe des bois</i> | 37.219 <i>Prairies à Scirpe des bois</i> | | | | |
| D2 <i>Tourbières de vallée, bas-marais acides et tourbières de transition</i> | 54 <i>Bas-marais, tourbières de transition et sources</i> | | | | |
| J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i> | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | | |
| E3 <i>Prairies humides et prairies humides saisonnières</i> | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| C1 <i>Eaux dormantes de surface</i> | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i> | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i> | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | | |
| G5.8 <i>Coupes forestières récentes</i> | 31.87 <i>Clairières forestières</i> | | | | |
| G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i> | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i> | 84.3 <i>Petits bois, bosquets</i> | | | | |
| G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i> | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | | |
| C1.1 <i>Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents</i> | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | | | |
| F4.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | 31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | | | | |
| F4.11 <i>Landes humides septentrionales</i> | 31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| X10 Bocages | 84.4 Bocages | | | | |
| E1.92 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes | 35.22 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes | | | | |
| E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines | 35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines | | | | |
| C3.51 Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies | 22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux | | | | |
| C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes | 22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales | | | | |
| E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | |
| E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales | 81 Prairies améliorées | | | | |
| I1 Cultures et jardins maraîchers | 82 Cultures | | | | |
| X10 Bocages | 84.4 Bocages | | | | |
| D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre | 53.2 Communautés à grandes Laïches | | | | |
| E3 Prairies humides et prairies humides saisonnières | 37 Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélrophytes autres que les roseaux | 53.1 Roselières | | | | |
| C1.2 Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents | 22.12 Eaux mésotrophes | | | | |
| X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle | 82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| C1 Eaux dormantes de surface | 22 Eaux douces stagnantes | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1 Forêts de feuillus caducifoliés | 41 Forêts caducifoliées | | | | |
| G1 Forêts de feuillus caducifoliés | 41 Forêts caducifoliées | | | | |
| I1.3 Terres arables à monocultures extensives | 82.3 Culture extensive | | | | |
| E2 Prairies mésiques | 38 Prairies mésophiles | | | | |
| E3 Prairies humides et prairies humides saisonnières | 37 Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus | 41.2 Chênaies-charmaies | | | | |
| E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes | 38.2 Prairies de fauche de basse altitude | | | | |
| | 88 Mines et passages souterrains | | | | |
| | 38.2 Prairies de fauche de basse altitude | | | | |
| E2 Prairies mésiques | 38 Prairies mésophiles | | | | |
| I1 Cultures et jardins maraîchers | 82 Cultures | | | | |
| | 82 Cultures | | | | |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | |
| G1 Forêts de feuillus caducifoliés | 41 Forêts caducifoliées | | | | |
| I1 Cultures et jardins maraîchers | 82 Cultures | | | | |
| E2 Prairies mésiques | 38 Prairies mésophiles | | | | |
| E2 Prairies mésiques | 38 Prairies mésophiles | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : COTTEY E. | | | | 2005 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 2001 |
| | 179 | <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Triton ponctué</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 2001 |
| Lépidoptères | 53783 | <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Petit Mars changeant</i> (Le), <i>Petit Mars</i> (Le), <i>Miroitant</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |
| | 53867 | <i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |
| Mammifères | 60596 | <i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier</i> , <i>Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe</i> , <i>Putois</i> , <i>Furet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | Passage, migration | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Faible | | | 2002 |
| Odonates | 65139 | <i>Coenagrion ornatum</i> (Selys, 1850) | Agrion orné | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2009 |
| Oiseaux | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit farlouse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 2000 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1993 - 2005 |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand-duc d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1997 - 2008 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard Saint-Martin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1994 - 2002 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard cendré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1996 - 2008 |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Pic mar | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 2001 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeichette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1994 - 2008 |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Aigrette garzette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1996 - 2004 |
| | 2651 | <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Aigle botté | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1997 - 2008 |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche à tête rousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 2002 - 2008 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1993 - 2008 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bihoreau gris, Héron bihoreau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 2004 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1993 - 2008 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1993 - 2008 |
| Phanérogames | 82356 | <i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) <i>Willd., 1800</i> | <i>Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.) | | | | 2002 - 2006 |
| | 88614 | <i>Carex lasiocarpa</i> <i>Ehrh., 1784</i> | <i>Laïche à fruits velus, Laïche filiforme, Laïche à fruits barbus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2004 - 2006 |
| | 93929 | <i>Cyperus flavescens</i> L., 1753 | <i>Souchet jaunissant, Pycréus jaunissant, Souchet jaunâtre, Pycréus jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis</i> <i>intermédiaire</i> , <i>Droséra</i> <i>intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2004 - 2006 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> , <i>Droséra à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2004 - 2006 |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Éléocharide à tiges nombreuses</i> , <i>Scirpe à tiges nombreuses</i> , <i>Souchet à tiges nombreuses</i> , <i>Éléocharis à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2003 - 2006 |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactide des marais</i> , <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée</i> , <i>Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | | | 2002 - 2005 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles</i> , <i>Bruyère quaternée</i> , <i>Bruyère des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2004 - 2006 |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | <i>Gratiolle officinale</i> , <i>Herbe au pauvre homme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | | | 2005 |
| | 103245 | <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis androsème</i> , <i>Androsème officinale</i> , <i>Toute-bonne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | | | 2005 - 2005 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2004 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106128 | <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | <i>Limoselle aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAMBAUD F. | | | | 1999 |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | <i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | | | 2001 |
| | 106634 | <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753 | <i>Lotier très étroit, Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites, Lotier à fruits très étroits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.) | | | | 2004 - 2006 |
| | 112590 | <i>Pedicularis palustris</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 112853 | <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785 | <i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | | | 2002 - 2005 |
| | 112871 | <i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Oréosélin noir, Persil des montagnes, Persil de cerf, Peucedan persil des montagnes, Sélin des montagnes noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.) | | | | 2002 - 2006 |
| | 112873 | <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Thyssélin des marais, Peucedan des marais, Persil des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2004 - 2006 |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Pulicaire commune, Pulicaire annuelle, Herbe de Saint-Roch</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2005 |
| | 117056 | <i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753 | <i>Renoncule lierre, Renoncule à feuilles de lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN), ET LAROCHE M., VERNOCHE N., VAILLAULT M., MINOIS J. (SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT) | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | <i>Rhynchospora</i> blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2006 |
| | 117732 | <i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810 | <i>Rhynchospora</i> brun, <i>Rhynchospora</i> fauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2006 |
| | 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Isolépide flottante</i> , <i>Éléogiton flottant</i> , <i>Scirpe flottant</i> , <i>Isolépis flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 124517 | <i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847 | <i>Spargoute de Morison</i> , <i>Spargoute printanière</i> , <i>Spergule de Morison</i> , <i>Espargoute de printemps</i> , <i>Espargoute de Morison</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.) | | | | 2005 - 2006 |
| | 124699 | <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817 | <i>Spiranthe d'été</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2006 |
| | 124701 | <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Spiranthe d'automne</i> , <i>Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2004 |
| | 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | <i>Trèfle souterrain</i> , <i>Trèfle semeur</i> , <i>Trèfle enterreur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.) | | | | 2001 - 2006 |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | <i>Ajonc mineur</i> , <i>Ajonc nain</i> , <i>Petit ajonc</i> , <i>Petit landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2005 - 2006 |
| | 128315 | <i>Utricularia minor</i> L., 1753 | <i>Utriculaire mineure</i> , <i>Petite utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | | | 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |
| Poissons | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabot, Chabot commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ONEMA | | | | 2000 |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | | | 2003 |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | | | 2003 |
| Reptiles | 77947 | <i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789 | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 77993 | <i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | <i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.) | | | | 2006 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.) | | | | 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Basidiomycètes | 39079 | <i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamarck | <i>Amanite tue-mouches, Fausse oronge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29937 | <i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers. | <i>Trompette des morts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31038 | <i>Marasmius oreades</i> (Bolt. : Fr.) Fr. | <i>Faux mousseron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 53913 | <i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780) | <i>Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | | | | 1996 |
| Mammifères | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen, Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Passage, migration | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Moyen | | | 2002 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Passage, migration | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Faible | | | 1999 |
| Oiseaux | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GASSER L. (AOMSL) | | | | 2000 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OBERTI D. | | | | 2000 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASSER L. (AOMSL) | | | | 2000 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GASSER L. (AOMSL) | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79921 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | <i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81041 | <i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Aphane des champs, Alchémille des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | <i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88489 | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770 | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88802 | <i>Carex pulicaris</i> L., 1753 | <i>Laïche puce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111419 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | <i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | <i>Patience élégante, Oseille élégante, Rumex joli, Violon, Patience jolie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | <i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121750 | <i>Scirpus michelianus</i> L., 1753 | <i>Souchet de Michel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | <i>Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère péliade (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | | | | |
| 310 | <i>Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Insectes | 65139 | <i>Coenagrion ornatum</i> (Selys, 1850) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|---|--|
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | | | | |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | | | | |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 124699 | <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | Osmunda regalis L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 | X10 Bocages | Reproduction certaine ou probable | Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.) |
| 82356 Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800 | H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.) |
| 124517 Spergula morisonii Boreau, 1847 | H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.) |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | CHAMBAUD F., OBERTI D., LEMAIRE E. | 1996 | Opération locale Val de Loire 71. C.A.E., université de Bourgogne, Chambre d'Agriculture 71. |
| | D.I.R.E.N. Bourgogne | 1997 | Fiches de présentation des sites susceptibles d'être désignés dans le réseau Natura 2000. |
| Informateur | ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | |
| | BARDET O. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | |
| | Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du réseau de correspondants du CBNBP | | |
| | Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP | | |
| | BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | |
| | BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN), ET LAROCHE M., VERNOCHE N., VAILLAULT M., MINOIS J. (SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT) | | |
| | BELLENFANT (S.H.N.A.) | | |
| BOUARD H. | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | |
| | CHAMBAUD F. | | |
| | COTTEY E. | | |
| | DUCERF G. | | |
| | GASSER L. (AOMSL) | | |
| | GROUPE ECREEVISSE BOURGUIGNON | | |
| | OBERTI D. | | |
| | ONEMA | | |
| | Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | |