# FORET DE LA SERRE
# (Identifiant national : 430002173)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 14202000)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430002173, FORET DE LA SERRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 101P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002173.pdf*

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 844594°-2248842°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 6
6. HABITATS ..... 6
7. ESPECES ..... 11
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 101
9. SOURCES ..... 101

# 1. DESCRIPTION

## ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430015358 - (Id reg. : 14202001)
- Id nat. : 430020214 - (Id reg. : 14202003)
- Id nat. : 430010520 - (Id reg. : 14202004)
- Id nat. : 430015367 - (Id reg. : 14202002)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Menotey (INSEE : 39323)
- Commune : Gredisans (INSEE : 39262)
- Commune : Malange (INSEE : 39308)
- Commune : Offlanges (INSEE : 39392)
- Commune : Amange (INSEE : 39008)
- Commune : Vriange (INSEE : 39584)
- Commune : Châtenois (INSEE : 39121)
- Commune : Serre-les-Moulières (INSEE : 39514)
- Commune : Saligney (INSEE : 39499)
- Commune : Thervay (INSEE : 39528)
- Commune : Moissey (INSEE : 39335)
- Commune : Brans (INSEE : 39074)
- Commune : Archelange (INSEE : 39014)
- Commune : Frasne-les-Meulières (INSEE : 39238)

## 1.2 Superficie

3727,34 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 199
Maximale (mètre): 390

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430020214 - BOIS DE BRANS, DU BOLET, DE MONTMIREY ET DE SERRE (Type 1) (Id reg. : 14202003)
- Id nat. : 430010520 - ETANG DANS LA VALLEE DE LA VEZE (Type 1) (Id reg. : 14202004)
- Id nat. : 430015358 - BOIS DE MOISSEY ET DE LA SERRE (Type 1) (Id reg. : 14202001)
- Id nat. : 430015367 - PELOUSES DU ROUTEAU ET FONTAINE BATAILLE (Type 1) (Id reg. : 14202002)

## 1.5 Commentaire général

DESCRIPTION DU SITE - INTERET

La forêt de la Serre se situe au nord-est de Dole et couvre un massif original dans le Jura qui est le seul grand affleurement de socle cristallin dans le Jura. Il se présente comme une butte (horst) allongée du nord -est vers le sud-ouest et qui a gardé une grande partie de sa couverture sédimentaire. Ces terrains  sédimentaires couvrent localement le socle cristallin (conglomérats d'argiles et grès d'âge primaire, grés, argiles du Trias) et les rebords de la butte. L'altitude oscille généralement entre 300 et 350 m, les points hauts étant inférieurs à 400 m.

Les terrains cristallins et gréseux supportent une végétation acidiphile* qui forme un contraste avec le rebord de la butte et les vallées calcaires de l'Ognon au nord et du Doubs au sud où la végétation est calcicole*.

La forêt couvre en majeure partie ce massif et la zone est occupée par :

- des chênaies sessiliflores acidiphiles pauvres en espèces, établies sur sols acides, superficiels, rocailleux ou sableux. Dans la forêt de la Serre, elles sont bien typées et couvrent de grandes surfaces. Sur plusieurs secteurs, des boisements résineux (pins) leur ont été substitués pour améliorer la rentabilité. Sur la partie sommitale, se développe une chênaie sessiliflore hyperacidiphile à tendance xérophile*. Cette tendance confère au groupement un aspect encore plus clairsemé ;

- des chênaies-charmaies à stellaire holos-tée qui sont des formations acidiclines* se confinent dans les bas de versant et les fonds de vallon ;

- en bordure de ruisseaux, les conditions stationnelles permettent la venue d'aulnaies à sphaignes rares en basse altitude où l'on observe l'osmonde royale, typique des sols acides ;

- des aulnaies marécageuses.

A l'intérieur de cette forêt, plusieurs stations particulières méritent d'être mentionnées :

- stations botaniques saxicoles avec de nombreux rochers à asplenium septentrionale. L'un des plus remarquables, situé dans le bois d'Amange au bord de la route départementale 37, recèle au moins 7 espèces végétales à très forte valeur patrimoniales, certaines connaissant là une de leurs rares stations départementales.

- tourbière à sphaigne (très rare en plaine) aux prés du Girard malheureusement plantée de résineux ;

- clairières où fut exploité le sable.

Quelques anciennes petites sablières artisanales ont donné naissance à des mares. Ces petits plans d'eau, situés au sommet et au centre de la forêt, ont un rôle écologique remarquable ; ils abritent 11 des 15 espèces d'amphibiens présentes en Franche-Comté et les 4 espèces de tritons de la région, fait relativement exceptionnel.

Certains ruisseaux intraforestiers présentent une qualité optimale des eux et du milieu propice à la présence d'espèces rares comme l'écrevisse à pattes blanches. L'isolement de telles populations les rendent particulièrement sensibles à toutes travaux, forestiers en particulier.

En même temps, la forêt abrite une intéressante avifaune nicheuse dont le milieu de vie d'un certain nombre d'espèces doit être préservé au niveau européen (engoulevent d'Europe, alouette-lulu et gélinotte des bois).

En périphérie du massif de la Serre, se situent des pelouses mésophiles*calcicoles. Leur intérêt est élevé avec la présence de plusieurs espèces végétales protégées comme sur la pelouse du Routeau (trèfle strié, ophrys apifera). A Malange-Vriange, une pelouse sur marne abrite plusieurs espèces originales. Là, le sol est soumis à des contrastes hydriques importants (teneur en eau très variable selon les saisons) et les espèces présentes doivent supporter des périodes de sécheresse et d'engorgement. Au delà des groupements végétaux et des espèces de flore, ces pelouses abritent également des espèces animales particulières : lézard vert, alouette lulu, engoulevent, pie grièche écorcheur. Il faut cependant noter que ces milieux sont menacés par l'enfrichement progressif suite à l'abandon des pratiques pastorales traditionnelles.

L'intérêt de ce massif pour les chiroptères est primordial autant pour sa qualité de territoire de chasse que pour la présence de gites arboricoles de mise bas. Parmi les 17 espèces identifiées avec certitude, 6 sont fortement liées à la forêt pour l'accomplissement de leur cycle biologique. Parmi ces dernières, 4 occupent des gîtes arboricoles (décollement d'écorce, trous de pics, gélivures ...) pour mettre bas et élever leurs jeunes. L'espèce remarquable est le Murin de bechstein avec une population estimée à 55 individus adultes répartis en 3 colonies distinctes. Actuellement, l'insuffisance de recul ne permet pas de préciser la localisation exacte des arbres préférentiellement occupés bien qu'une fidélidé pour les trous de pics soit observée. Parallèlement, il convient de noter la présence, en périphérie de ce massif forestier, de nombreuses colonies situées en habitat humain ou souterrain (près de 6000 individus). Pour beaucoup, la forêt de la Serre constitue leur territoire de chasse.

OBJECTIFS ET MOYENS DE PRESERVATION ET DE GESTION

Les objectifs de gestion et les moyens de préservation découlent de la sensibilité particulière des milieux naturels et des atteintes observées. Sur l'ensemble du site, plusieurs objectifs se dégagent ; les moyens et actions permettant de les atteindre devront faire l'objet d'une définition au niveau local sur les thèmes qui suivent.

Dans le domaine forestier, ce massif a déjà fait l'objet d'enrésinements conséquents et il convient à présent de les limiter. De façon générale, les formations forestières peu productives séchardes sur sols squelettiques et humides en fond de vallon sont à maintenir. De même, il convient d'assurer la préservation de la chênaie xéro-acidiphile sommitale et, dans les aulnaies à sphaignes bordant les ruisseaux, une gestion forestière conservatoire adaptée doit être conduite. Enfin, Il y aurait lieu d'introduire une diversité de structure des peuplements dans la gestion forestière actuelle. Celle-ci devrait être favorable à la gélinotte des bois afin d'assurer son extension sur l'ensemble du massif.

Plusieurs milieux intra-forestiers présentent un grand intérêt ; leur maintien ou leur restauration est synonyme de préservation de la biodiversité en particulier grâce à :

- la protection des parois siliceuses situées en bordure de la route départementale 37 dans le bois d'Amange,

- la réhabilitation de l'ancienne tourbière des prés du Girard en enlevant la plantation de résineux qui a été opérée,

- l'entretien des mares, nécessaire lorsque leur état et l'envahissement par la végétation l'imposent. En même temps, dans les mares où il est présent, le poisson-chat devrait être éliminé car il concurence fortement les différentes espèces de batraciens au point de les mettre en danger,

- la protection des ruisseaux intraforestiers,

- le maintien des milieux naturels non boisés inclus au sein des massifs forestiers,

- la mise en place d'îlots de vieillissement,

- la protection des chênes à cavité.

Les pelouses présentent un intérêt élevé. Compte tenu de la déprise agricole, elles sont cependant menacées et certaines pratiques doivent être restaurées en vue d'éviter la fermeture du milieu :

- reconquérir les landes fermées et les milieux en voie de boisement spontané, par une gestion conservatoire de fauche ou de pâturage extensif,

- contrôler l'embroussaillement par un défrichement raisonné suivi d'une élimination des refus,

- promouvoir les pratiques extensives de gestion et limiter strictement la fertilisation de ces pelouses.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

Arrêté Préfectoral de Biotope en cours sur la pelouse du Routeau

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Affleurement rocheux
- Montagne

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Amphibiens<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Crustacés<br>- Autre Faune (préciser)<br>- Floristique<br>- Bryophytes<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Géomorphologique<br>- Géologique<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Lichens<br>- Poissons<br>- Mollusques<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Diptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Autres Fonges | - Algues<br>- Bryophytes<br>- Crustacés | - Autre Faunes<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Hyménoptères | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *34.41 Lisières xéro-thermophiles* | | Informateur : Bouard H. (Gagea) | 34,44 | 2005 - 2005 |
| | *41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées* | | Informateur : Bouard H. (Gagea) | ,03 | 2005 - 2005 |
| | *34.42 Lisières mésophiles* | | Informateur : Bouard H. (Gagea) | ,31 | 2005 - 2005 |
| | *34.41 Lisières xéro-thermophiles* | | Informateur : Bouard H. (Gagea) | ,35 | 2005 - 2005 |
| | *37.219 Prairies à Scirpe des bois* | | Informateur : Bouard H. (Gagea) | 0 | 2005 - 2005 |
| | *37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques* | | Informateur : Bouard H. (Gagea) | ,06 | 2005 - 2005 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents* | *22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire* | | Informateur : ALBRECHT Emma | | 1984 - 2017 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus | 41.2 Chênaies-charmaies | | | | |
| G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus | 41.2 Chênaies-charmaies | | Informateur : ALBRECHT Emma | | 1984 - 2017 |
| G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus | 41.5 Chênaies acidiphiles | | Informateur : ALBRECHT Emma | | 1984 - 2017 |
| G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés | 83.3 Plantations | | Informateur : ALBRECHT Emma | | 1984 - 2017 |
| G3.F Plantations très artificielles de conifères | 83.31 Plantations de conifères | | | | |
| G5 Alignements d'arbres, petits bois anthropiques, boisements récemment abattus, stades initiaux de boisements et taillis | 84 Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs | | | | |
| J2.61 Terrains vagues des constructions rurales abandonnées | 86.4 Sites industriels anciens | | | | |
| E5.2 Ourlets forestiers thermophiles | 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles | | | | |
| F3.1 Fourrés tempérés | 31.8 Fourrés | | | | |
| E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques | 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides | | | | |
| I1 Cultures et jardins maraîchers | 82 Cultures | | | | |
| G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus | 41.2 Chênaies-charmaies | | | | |
| G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | | |
| C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes | 22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales | | | | |
| G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes | 38.2 Prairies de fauche de basse altitude | | | | |
| E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | |
| C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes | 22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales | | | | |
| E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques | 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides | | | | |
| E1.1 Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux | 34.1 Pelouses pionnières médio-européennes | | | | |
| E5.2 Ourlets forestiers thermophiles | 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles | | | | |
| G3.F Plantations très artificielles de conifères | 83.31 Plantations de conifères | | | | |
| J3.3 Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d'extraction | 86.41 Carrières | | | | |
| G1.4 Forêts marécageuses de feuillus ne se trouvant pas sur tourbe acide | 44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais | | | | |
| D5.1 Roselières normalement sans eau libre | 53.1 Roselières | | | | |
| G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés | 83.32 Plantations d'arbres feuillus | | | | |
| G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus | 41.2 Chênaies-charmaies | | | | |
| G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus | 41.5 Chênaies acidiphiles | | | | |
| H3.1 Falaises continentales siliceuses acides | 62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses | | | | |
| G1.A4 Forêts de ravin et de pente | 41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins | | | | |
| G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| F3.1 Fourrés tempérés | 31.8 Fourrés | | | | |
| G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes | 41.13 Hêtraies neutrophiles | | | | |
| G1.61 Hêtraies acidophiles médio-européennes | 41.11 Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion | | | | |
| G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria | 41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques | | | | |
| F3.1 Fourrés tempérés | 31.8 Fourrés | | | | |
| G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés | 83.3 Plantations | | | | |
| G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | | |
| G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus | 41.2 Chênaies-charmaies | | | | |
| G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus | 41.5 Chênaies acidiphiles | | | | |
| G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes | 41.13 Hêtraies neutrophiles | | | | |
| G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria | 41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques | | | | |
| C2.21 Épirhithron et métarhithron | 24.12 Zone à Truites | | | | |
| G1.61 Hêtraies acidophiles médio-européennes | 41.11 Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion | | | | |
| C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes | 22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales | | | | |
| D5.1 Roselières normalement sans eau libre | 53.1 Roselières | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *G1 Forêts de feuillus caducifoliés* | *41 Forêts caducifoliées* | | Informateur : ALBRECHT Emma | | 1984 - 2017 |
| *G Boisements, forêts et autres habitats boisés* | *4 Forêts* | | | | |
| *G1 Forêts de feuillus caducifoliés* | *41 Forêts caducifoliées* | | | | |
| *I1 Cultures et jardins maraîchers* | *82 Cultures* | | | | |
| *E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales* | *81 Prairies améliorées* | | | | |
| *G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés* | *83.3 Plantations* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 197 | *Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)* | *Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples | | | | |
| | 259 | *Crapaud commun* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Paris M. | | 4 | 20 | 2012 - 2020 |
| | 310 | *Grenouille agile* | *Grenouille agile (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Paris M. | | 4 | 160 | 2012 - 2020 |
| | 351 | *Grenouille rousse* | *Grenouille rousse (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Paris M. | | 6 | 36 | 2012 - 2020 |
| | 444431 | *Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)* | *Triton ponctué (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Paris M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 212 | *Sonneur à ventre jaune* | *Sonneur à ventre jaune (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Paris M. | | 20 | 100 | 2011 - 2020 |
| | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | *Triton crêté (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 179 | *Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)* | *Triton ponctué (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Bryophytes | 6279 | *Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crustacés | 18437 | *Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)* | *Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Mammifères | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | *Barbastelle d'Europe, Barbastelle* | Passage, migration | | | | | 2006 - 2006 |
| | 60546 | *Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817)* | *Minioptère de Schreibers* | Passage, migration | | | | | 2003 - 2003 |
| | 60414 | *Myotis bechsteini (Kuhl, 1817)* | *Murin de Bechstein* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | 50 | 60 | 2004 - 2004 |
| | 60396 | *Myotis brandti (Eversmann, 1845)* | *Murin de Brandt* | Reproduction certaine ou probable | | | | 7 | 2006 - 2006 |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | *Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées* | Reproduction certaine ou probable | | | 190 | 210 | 2004 - 2004 |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Passage, migration | | | | | 2004 - 2004 |
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | *Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer* | Reproduction certaine ou probable | | | 8 | 10 | 2004 - 2004 |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | *Grand rhinolophe* | Reproduction certaine ou probable | | | 65 | 85 | 2004 - 2004 |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | *Petit rhinolophe* | Reproduction certaine ou probable | | | 60 | 80 | 2004 - 2004 |
| Oiseaux | 4657 | *Bruant jaune* | *Bruant jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 8 | 2010 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3540 | *Engoulevent d'Europe* | *Engoulevent d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GNFC | | 2 | 2 | 2013 - 2013 |
| | 4254 | *Fauvette des jardins* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 8 | 2010 - 2019 |
| | 4319 | *Gobemouche gris* | *Gobemouche gris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 2 | 2 | 2010 - 2018 |
| | 4510 | *Grand Corbeau* | *Grand corbeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 10 | 30 | 2010 - 2021 |
| | 3696 | *Hirondelle rustique* | *Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 6 | 6 | 2010 - 2021 |
| | 3803 | *Loriot d'Europe* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 12 | 2018 - 2021 |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 |
| | 3630 | *Pic épeichette* | *Pic épeichette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 6 | 6 | 2010 - 2021 |
| | 3619 | *Pic mar* | *Pic mar* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 6 | 18 | 2010 - 2016 |
| | 3608 | *Pic noir* | *Pic noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 12 | 12 | 2012 - 2021 |
| | 3601 | *Picus canus Gmelin, 1788* | *Pic cendré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3807 | *Pie-grièche écorcheur* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 2 | 4 | 2016 - 2021 |
| | 3723 | *Pipit des arbres* | *Pipit des arbres* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 2 | 2 | 2010 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4272 | *Pouillot siffleur* | *Pouillot siffleur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 4 | 2013 - 2020 |
| | 4308 | *Roitelet huppé* | *Roitelet huppé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 8 | 80 | 2010 - 2021 |
| | 3439 | *Tourterelle des bois* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 4 | 2010 - 2014 |
| | 4580 | *Verdier d'Europe* | *Verdier d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 8 | 2010 - 2021 |
| Phanérogames | 80155 | *Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay, 1836* | *Adénocarpe plié, Adénocarpe à feuilles pliées, Adénocarpe changé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Prost J.-F. | | | | 1986 - 1986 |
| | 88794 | *Carex pseudocyperus L., 1753* | *Laîche faux souchet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98669 | *Filago arvensis L., 1753* | *Cotonnière des champs, Immortelle des champs, Logfie des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98678 | *Filago gallica L., 1753* | *Logfie de France, Cotonnière de France* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98689 | *Filago minima (Sm.) Pers., 1807* | *Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99549 | *Galium spurium L., 1753* | *Gaillet bâtard, Petit gratteron* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103536 | *Illecebrum verticillatum L., 1753* | *Illécèbre verticillé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104022 | *Jasione montana L., 1753* | *Jasione des montagnes, Herbe à midi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104855 | *Lamium amplexicaule L., 1753* | *Lamier embrassant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105441 | *Lemna trisulca L., 1753* | *Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106419 | *Littorella uniflora (L.) Asch., 1864* | *Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106448 | *Logfia arvensis (L.) Holub, 1975* | *Cotonnière des champs, Immortelle des champs, Logfie des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y., Millet P. et Bailly G. | | | | 2006 - 2006 |
| | 106828 | *Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806* | *Luzule de Forster* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bessard S. | | | | 2006 |
| | 108869 | *Muscari botryoides (L.) Mill., 1768* | *Muscari fausse botryde, Muscari faux botrys, Muscari botryoïde, Muscari en grappe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Prost J.-F. | | | | 1988 - 1988 |
| | 110335 | *Ophrys apifera Huds., 1762* | *Ophrys abeille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111647 | *Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799* | *Orobanche du genêt* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115554 | *Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805* | *Potentille à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117096 | *Ranunculus lingua L., 1753* | *Renoncule langue, Grande douve* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Prost J.-F. | | | | 1982 - 1982 |
| | 121065 | *Saxifraga granulata L., 1753* | *Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 1985 - 2010 |
| | 121839 | *Scleranthus perennis L., 1753* | *Scléranthe vivace, Scléranthe pérenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mange M. | | | | 1990 - 1990 |
| | 122162 | *Sedum forsterianum Sm., 1808* | *Orpin de Forster* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Millet P. | | | | 1990 - 1990 |
| | 127495 | *Trifolium striatum L., 1753* | *Trèfle strié* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84526 | *Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795* | *Doradille du Nord, Doradille septentrionale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Pascal B. | | | | 1995 - 2011 |
| | 126276 | *Thelypteris palustris Schott, 1834* | *Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algues | 73556 | *Chara fragilis Desv., 1810* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 73574 | *Chara vulgaris L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Amphibiens | 699564 | *Lissotriton vulgaris vulgaris (Linnaeus, 1758)* | *Triton ponctué (Le)* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2012 - 2012 |
| | 444440 | *Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)* | *Grenouille verte (La), Grenouille commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Paris M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 444443 | *Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)* | *Grenouille rieuse (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Paris M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 318 | *Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758* | *Grenouille verte (La), Grenouille commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 337 | *Rana lessonae Camerano, 1882* | *Grenouille de Lessona (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Paris M. | | | | 2007 |
| | 342 | *Rana ridibunda Pallas, 1771* | *Grenouille rieuse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 92 | *Salamandre tachetée* | *Salamandre tachetée (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Paris M. | | 7 | 1050 | 2012 - 2021 |
| | 444430 | *Triton alpestre* | *Triton alpestre (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Paris M. | | 12 | 84 | 2007 - 2020 |
| | 444432 | *Triton palmé* | *Triton palmé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Paris M. | | 5 | 45 | 2007 - 2020 |
| | 121 | *Triturus alpestris (Laurenti, 1768)* | *Triton alpestre (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 155 | *Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ascomycètes | 45799 | *Bisporella citrina (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 46240 | *Chlorosplenium aeruginascens (Nylander) Karsten* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 48977 | *Orbilia xanthostigma (Fr. ex Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Basidiomycètes | 38089 | *Agaricus silvicola (Vittad.) Peck* | *Agaric anisé, Agaric anisé des bois, Psalliote anisé des bois* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 38975 | *Amanita asteropus Sabo ex Romagn.* | *Amanite à bulbe étoilé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38993 | *Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Pers.* | *Amanite des césars* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39001 | *Amanita citrina (J.C. Sch.) Pers.* | *Amanite citrine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39020 | *Amanita eliae Quélet* | *Amanite isabelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39040 | *Amanita fulva (J.C. Sch. ?) Fr.* | *Amanite fauve* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39057 | *Amanita gemmata (Fr.) Bertillon* | *Amanite jonquille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39079 | *Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck* | *Amanite tue-mouches, Fausse oronge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39099 | *Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombholz* | *Amanite panthère* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39106 | *Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link* | *Amanite phalloïde, Oronge verte, Calice de la mort, Agaric bulbeux, Oronge ciguë* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39119 | *Amanita porphyria Alb. & Schw. : Fr.* | *Amanite porphyre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39128 | *Amanita rubescens (Pers. : Fr.) Pers.* | *Amanite rougissante, Oronge vineuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39140 | *Amanita spissa (Fr.) Opiz* | *Amanite épaisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39155 | *Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittadini* | *Grisette, Coulemelle, Amanite vaginee* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39177 | *Amanita verna (Bull. : Fr.) Lamarck* | *Amanite printanière, Oronge ciguë blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40257 | *Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer* | *Anthurus étoilé, Anthurus d'Archer, Doigts du diable, Pieuvre des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31683 | *Armillariella mellea (Vahl : Fr.) P. Karsten* | *Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32710 | *Asterophora parasitica (Bull. : Fr.) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41571 | *Auricularia auricula-judae (Bull. : Fr.) Wettstein* | *Oreille de Judas* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29360 | *Boletus aestivalis (Paulet) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29377 | *Boletus calopus Pers. : Fr.* | *Bolet à beau pied* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29388 | *Boletus edulis Bull. : Fr.* | *Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29392 | *Boletus erythropus Pers. : Fr.* | *Bolet à pied rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29418 | *Boletus luridus J.C. Sch. : Fr.* | *Bolet blafard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 41746 | *Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr.* | *Calocère petite-corne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31701 | *Calocybe chrysenteron (Bull. : Fr.) Singer ex Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29904 | *Cantharellus cibarius Fr. : Fr.* | *Girolle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29925 | *Cantharellus lutescens (Pers. : Fr.) Fr.* | *Chanterelle jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29932 | *Cantharellus tubiformis (Fr. ex Fr.) Fr., sensu Cooke, non Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30883 | *Clitocybe cerussata (Fr. : Fr.) Kummer* | *Clitocybe cérusé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30887 | *Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Kummer* | *Tête de moine, Clitocybe à pied en massue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 509707 | *Clitocybe dicolor (Fr.) J.E. Lange* | *Clitocybe bicolore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31758 | *Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) Kummer* | *Clitocybe en entonnoir* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31934 | *Clitocybe hydrogramma sensu auct.* | *Clitocybe à odeur de poulailler* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30585 | *Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kummer* | *Collybie beurrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30593 | *Collybia confluens (Pers. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30603 | *Collybia distorta (Fr.) Quélet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30606 | *Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer* | *Collybie des chênes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30626 | *Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quélet* | *Souchette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30654 | *Collybia maculata (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer* | *Collybie maculée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30666 | *Collybia peronata (Bolt. : Fr.) Kummer* | *Marasme guêtré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 37327 | *Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr.* | *Coprin micacé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44913 | *Coriolus versicolor (L. : Fr.) Quélet* | *Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34600 | *Cortinarius alboviolaceus (Pers. : Fr.) Fr.* | *Cortinaire blanc et violet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34135 | *Cortinarius bolaris (Pers. : Fr.) Fr.* | *Cortinaire teint en rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34796 | *Cortinarius decipiens sensu R. Henry, Kühner & Romagn.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 511011 | *Cortinarius elatior sensu auct. p.p.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35248 | *Cortinarius nemorensis (Fr.) J.E. Lange* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35314 | *Cortinarius orellanoides R. Henry* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35315 | *Cortinarius orellanus Fr.* | *Cortinaire à couleur de rocou, Cortinaire des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35329 | *Cortinarius paleaceus (Weinmann) Fr.* | *Cortinaire pailleté* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35475 | *Cortinarius purpurascens Fr.* | *Cortinaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35763 | *Cortinarius trivialis J.E. Lange ex J.E. Lange* | *Cortinaire trivial* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35827 | *Cortinarius veregregius R. Henry* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35832 | *Cortinarius vibratilis (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33129 | *Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) Kummer* | *Crépidote variable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38156 | *Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod* | *Cystoderme furfuracé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38165 | *Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42185 | *Daedalea quercina (L. : Fr.) Pers.* | *Lenzite du chêne, Dédalée du chêne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34459 | *Dermocybe cinnamomeolutea (P.D. Orton) Moser* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35606 | *Dermocybe semisanguinea (Fr. : Fr.) Moser ex Moser* | *Cortinaire à demi sanguin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33780 | *Entoloma nidorosum (Fr.) Quélet* | *Entolome rose-gris* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33901 | *Entoloma rhodopolium (Fr. : Fr.) Kummer* | *Entolome rose-gris* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33741 | *Entoloma sinuatum (Bull. : Fr.) Kummer* | *Entolome livide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42280 | *Femsjonia luteoalba Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42445 | *Fistulina hepatica (J.C. Sch. : Fr.) Withering* | *Langue de bœuf, Fistuline hépatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42504 | *Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.* | *Amadouvier, Polypore allume-feu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42644 | *Grifola frondosa (Dicks. : Fr.) S.F. Gray* | *Polypore en touffes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 45021 | *Guepinia helvelloides (DC. : Fr.) Fr.* | *Guépinie en helvelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36933 | *Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Murrill* | *Gymnopile pénétrant, Pholiote pénétrante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29528 | *Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quélet* | *Bolet châtain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36182 | *Hebeloma radicosum (Bull. : Fr.) Ricken* | *Hébélome radicant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36191 | *Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gillet* | *Hébélome brûlant, Hébélome couleur moutarde* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42757 | *Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karsten* | *Hydne ferrugineux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42792 | *Hydnum repandum L. : Fr.* | *Pied de mouton* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42796 | *Hydnum rufescens Pers. : Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30389 | *Hygrophorus eburneus (Bull. : Fr.) Fr.* | *Hygrophore blanc d'ivoire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30447 | *Hygrophorus nemoreus (Pers. : Fr.) Fr.* | *Hygrophore des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36977 | *Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer* | *Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé, Géophile, Nématolome en touffes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36995 | *Hypholoma sublateritium (Fr.) Quélet* | *Hypholome à couleur de briques* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36334 | *Inocybe gausapata Kühner ex Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36338 | *Inocybe geophylla (Sow. : Fr.) Kummer* | *Inocybe à lames couleur de terre, Inocybe terreux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 37002 | *Kuehneromyces mutabilis (J.C. Sch. : Fr.) Singer & A.H. Smith* | *Pholiote changeante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32178 | *Laccaria amethystina (Hudson ? Kummer) Cooke* | *Laque améthyste* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32192 | *Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke* | *Clitocybe laqué* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39246 | *Lactarius blennius (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire muqueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39249 | *Lactarius blumii Bon* | *Lactaire pubescent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39261 | *Lactarius camphoratus (Bull. : Fr.) Fr.* | *Lactaire à odeur de chicorée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39264 | *Lactarius chrysorrheus Fr.* | *Lactaire à lait jaunissant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39285 | *Lactarius decipiens Quélet* | *Lactaire trompeur* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39306 | *Lactarius fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire fuligineux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39346 | *Lactarius lacunarum (Romagn.) ex Hora* | *Lactaire des bourbiers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39366 | *Lactarius mitissimus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire très doux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39380 | *Lactarius pallidus Pers. : Fr.* | *Lactaire pâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39391 | *Lactarius piperatus (L. : Fr.) Pers.* | *Lactaire poivré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39415 | *Lactarius quietus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire tranquille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39465 | *Lactarius subdulcis (Pers. : Fr.) S.F. Gray* | *Lactaire douceâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39478 | *Lactarius tabidus Fr.* | *Lactaire chiffonné* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39489 | *Lactarius torminosus (J.C. Sch. : Fr.) Pers.* | *Lactaire à toison, Lactaire aux coliques, Lactaire aux tranchées* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39396 | *Lactarius turpis (Weinmann) Fr.* | *Lactaire plombé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39497 | *Lactarius vellereus (Fr.) Fr., 1838* | *Lactaire velouté* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29545 | *Leccinum aurantiacum (Bull.) S.F. Gray* | *Bolet orangé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29559 | *Leccinum griseum (Quélet ?) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29628 | *Leccinum scabrum (Bull. : Fr.) S.F. Gray* | *Bolet rude* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29651 | *Leccinum testaceoscabrum Secrétan ex Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34238 | *Lentinellus cochleatus (Pers. : Fr.) P. Karsten* | *Lentin en colimaçon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 43251 | *Lenzites betulinus (L. : Fr.) Fr.* | *Lenzite du bouleau, Tramète du bouleau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32249 | *Lepista inversa (Scop. : Fr.) Patouillard* | *Clitocybe inversé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32272 | *Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harmaja* | *Clitocybe nébuleux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32276 | *Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke* | *Pied bleu, Tout-bleu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40543 | *Lycoperdon mammiforme Pers. ex Pers.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40561 | *Lycoperdon perlatum Pers. : Pers.* | *Vesse de loup perlée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40565 | *Lycoperdon pyriforme J.C. Sch. : Pers.* | *Vesse de loup en poire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40569 | *Lycoperdon umbrinum Pers. : Pers.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38670 | *Macrolepiota mastoidea (Fr. : Fr.) Singer* | *Lépiote mamelonnée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38682 | *Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer* | *Lépiote élevée, Grande coulemelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38704 | *Macrolepiota rhacodes (Vittadini) Singer* | *Lépiote déguenillée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30959 | *Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30980 | *Marasmius androsaceus (L. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30594 | *Marasmius confluens (Pers. : Fr.) P. Karsten* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31041 | *Marasmius prasiosmus (Fr. ex Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 519092 | *Marasmius splachnoides sensu auct.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 43410 | *Merulius papyrinus (Bull.) Quélet* | *Mérule papyracée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31089 | *Micromphale inodorum (Pat.) Svr#ek* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 31249 | *Mycena epipterygia (Scop. : Fr.) S.F. Gray* | *Mycène des fougères* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31292 | *Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F. Gray* | *Mycène casquée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30788 | *Mycena inclinata (Fr.) Quélet* | *Mycène inclinée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31320 | *Mycena maculata P. Karsten* | *Mycène tachetée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31393 | *Mycena polygramma (Bull. : Fr.) S.F. Gray* | *Mycène à pied strié* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31409 | *Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer* | *Mycène pur* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31465 | *Mycena rubromarginata (Fr. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31608 | *Oudemansiella longipes (Bull. ? Kummer) Moser* | *Collybie à poils ras, Collybie à long pied* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31601 | *Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.) von Höhnel* | *Collybie visqueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31079 | *Oudemansiella platyphylla (Pers. : Fr.) Moser ex Moser* | *Collybie à lames larges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31610 | *Oudemansiella radicata (Rehl. : Fr.) Singer* | *Mucicule radicante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34329 | *Panellus serotinus (Pers. : Fr.) Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34332 | *Panellus stipticus (Bull. : Fr.) P. Karsten* | *Panelle astringente* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29879 | *Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr.* | *Paxille enroulé, Paxille à bords enroulés, Paxille involuté, Bolet à lamelles, Chanterelle brune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40654 | *Phallus impudicus L. : Pers.* | *Satyre puant, Phallus impudique, Morille du diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 37635 | *Phellinus robustus (P. Karsten) Bourdot & Galzin* | *Polypore robuste, Phellin robuste* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 37120 | *Pholiota lenta (Pers. : Fr.) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 37160 | *Pholiota tuberculosa (J.C. Sch. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44020 | *Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karsten* | *Polypore du bouleau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38811 | *Pluteus cervinus (J.C. Sch. ?) Kummer* | *Plutée couleur de cerf* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38874 | *Pluteus pellitus (Pers. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44057 | *Polyporus brumalis (Pers. : Fr.) Fr.* | *Polypore d'hiver* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 37530 | *Psathyrella hydrophila (Bull. : Fr.) R. Maire* | *Hypholome hydrophile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37821 | *Psathyrella spadicea (J.C. Sch. ? Kummer) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32865 | *Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer* | *Clitocybe en coupe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29666 | *Pulveroboletus cramesinus (Secrétan ex E.-J. Gilbert) Moser ex Singer* | *Bolet cramoisi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36627 | *Rozites caperatus (Pers. : Fr.) P. Karsten* | *Pholiote ridée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39548 | *Russula albonigra (Krombholz) Fr.* | *Russule blanche et noire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39569 | *Russula amoena Quélet* | *Russule veloutée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39579 | *Russula amoenolens Romagn.* | *Russule à odeur de topinambour* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39841 | *Russula atropurpurea (Krombholz) Britzelmayr* | *Russule pourpre et noire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39636 | *Russula brunneoviolacea Crawshay* | *Russule brun violacé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39676 | *Russula curtipes F.H. Møller & J. Schäffer* | *Russule à pied court* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39680 | *Russula cyanoxantha (J.C. Sch.) Fr.* | *Russule charbonnière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39682 | *Russula cyanoxantha var. peltereaui Maire* | *Russule charbonnière verte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39686 | *Russula delica Fr.* | *Russule faux-lactaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39689 | *Russula densifolia Gillet* | *Russule à lames serrées* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 518831 | *Russula emetica f. silvestris Singer, 1932* | *Russule émétique des chênes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 39741 | *Russula fellea (Fr. : Fr.) Fr.* | *Russule de fiel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39756 | *Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr.* | *Russule fragile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39810 | *Russula heterophylla (Fr. : Fr.) Fr.* | *Russule à lames fourchues* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39816 | *Russula illota Romagn.* | *Russule mal lavée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39862 | *Russula laurocerasi Melzer* | *Russule laurier-cerise, Russule frangipane, Russule à odeur d'amandes amères* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39870 | *Russula lepida Fr.* | *Russule jolie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40024 | *Russula lutea (Huds. : Fr.) S.F. Gray* | *Russule caméléon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39887 | *Russula luteotacta Rea* | *Russule jaunissante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39731 | *Russula mairei sensu Romagn.* | *Russule émétique compacte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39909 | *Russula melliolens Quélet* | *Russule à odeur de miel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39925 | *Russula nigricans (Bull. ?) Fr.* | *Russule noircissante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39939 | *Russula ochroleuca Pers.* | *Russule ocre et blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39948 | *Russula olivacea (J.C. Sch.) Fr.* | *Russule olivacée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40012 | *Russula raoultii Quélet* | *Russule jaune pâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 518576 | *Russula rosea (J.C. Sch.) Quélet* | *Russule aurore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40110 | *Russula vesca Fr.* | *Russule vieux-rose* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40133 | *Russula violeipes Quélet* | *Russule à pied violet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40139 | *Russula virescens (J.C. Sch.) Fr.* | *Palomet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40147 | *Russula xerampelina (J.C. Sch.) Fr.* | *Russule écrevisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40723 | *Scleroderma verrucosum (Bull. : Pers.) Pers.* | *Scléroderme verruqueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40748 | *Scleroderma vulgare Hornemann* | *Scléroderme vulgaire, Scléroderme commun, Scléroderme citron, Scléroderme orangé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44619 | *Stereum gausapatum (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44622 | *Stereum hirsutum (Willdenow : Fr.) S.F. Gray* | *Stérée hirsute* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32654 | *Stropharia aeruginosa (Curt. : Fr.) Quélet* | *Strophaire vert-de-gris* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44887 | *Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr.* | *Tramète bossue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44992 | *Tremella mesenterica Retz. : Fr.* | *Trémelle mésentérique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44141 | *Tremellodon gelatinosus (Scopoli ex Fr.) Pers.* | *Faux hydne gélatineux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33157 | *Tricholoma acerbum (Bull. : Fr.) Quélet* | *Tricholome acerbe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33219 | *Tricholoma columbetta (Fr. : Fr.) Kummer* | *Colombette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33229 | *Tricholoma equestre p.p.* | *Tricholome équestre, Chevalier, Tricholome chevalier, Tricholome des chevaliers, Canari, Jaunet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33349 | *Tricholoma saponaceum (Fr. : Fr.) Kummer* | *Tricholome à odeur de savon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33362 | *Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quélet* | *Tricholome gravé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33366 | *Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33371 | *Tricholoma sejunctum (Sow. : Fr.) Quélet* | *Jaunet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33418 | *Tricholoma ustaloides Romagn. ex Romagn.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33429 | *Tricholoma virgatum (Fr. : Fr.) Kummer* | *Tricholome vergeté* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 43504 | *Tyromyces caesius (Schrad. : Fr.) Murrill* | *Polypore bleuté des conifères* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29779 | *Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert* | *Bolet bai* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29831 | *Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) Quélet* | *Bolet subtomenteux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39336 | *Lactarius impolitus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 31120 | *Mycena alcalina* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Coléoptères | 12380 | *Clytus arietis (Linnaeus, 1758)* | *Clyte d'Eastwood, Clyte bélier (Le), Clyte guêpe (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12490 | *Compsidia populnea (Linnaeus, 1758)* | *Petite Saperde* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10936 | *Hoplia argentea (Poda, 1761)* | *Hoplie argentée* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10502 | *Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)* | *Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10958 | *Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)* | *Hanneton des jardins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12214 | *Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)* | *Lepture du milieu* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10990 | *Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)* | *Trichie barrée, Trichie fasciée* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Hyménoptères | 52972 | *Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52745 | *Chrysis mediata Linsenmaier, 1951* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52949 | *Crossocerus pusillus Lepeletier & Brullé, 1835* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52475 | *Dolerus ferrugatus Audinet-Serville, 1823* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53015 | *Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53016 | *Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53130 | *Halictus maculatus Smith, 1848* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52758 | *Hedychridium infans Abeille de Perrin, 1878* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52522 | *Macrophya diversipes (Schrank, 1782)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53158 | *Megachile circumcincta (Kirby, 1802)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53161 | *Megachile nigriventris Schenck, 1870* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53020 | *Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53176 | *Osmia cornuta (Latreille, 1805)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53185 | *Osmia rufa (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53039 | *Passaloecus corniger Shuckard, 1837* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52997 | *Pemphredon lugens Dahlbom, 1842* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53048 | *Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52392 | *Pseudospinolia neglectus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53066 | *Trypoxylon clavicerum Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1828* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 159443 | *Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)* | *Écaille chinée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 60360 | *Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)* | *Sérotine commune* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | *Hérisson d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2012 - 2012 |
| | 60430 | *Myotis daubentoni* | *Murin de Daubenton* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60383 | *Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)* | *Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60461 | *Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)* | *Noctule de Leisler* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60493 | *Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817)* | *Pipistrelle de Kuhl* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | *Pipistrelle commune* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60527 | *Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)* | *Oreillard gris, Oreillard méridional* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Odonates | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | *Libellula depressa Linnaeus, 1758* | *Libellule déprimée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3978 | *Accenteur mouchet* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 2 | 2 | 2010 - 2017 |
| | 2891 | *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)* | *Autour des palombes* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | *Alouette des champs* | Reproduction indéterminée | | | 6 | 8 | 2018 - 2019 |
| | 2641 | *Aquila clanga Pallas, 1811* | *Aigle criard* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2020 - 2020 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2021 - 2021 |
| | 3941 | *Bergeronnette grise* | *Bergeronnette grise* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 20 | 2010 - 2021 |
| | 2832 | *Bondrée apivore* | *Bondrée apivore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 2 | 8 | 2007 - 2011 |
| | 2623 | *Buse variable* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 8 | 48 | 2010 - 2021 |
| | 3420 | *Columba livia Gmelin, 1789* | *Pigeon biset* | Reproduction indéterminée | | | 10 | 10 | 2021 - 2021 |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | *Pigeon colombin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 3465 | *Coucou gris* | *Coucou gris* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 2 | 2 | 2010 - 2019 |
| | 534742 | *Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | 4 | 16 | 2017 - 2021 |
| | 3703 | *Delichon urbica (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de fenêtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 459478 | *Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de fenêtre* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2021 - 2021 |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | *Bruant zizi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2895 | *Épervier d'Europe* | *Épervier d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 2 | 2 | 2012 - 2018 |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2021 - 2021 |
| | 4257 | *Fauvette à tête noire* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 16 | 2010 - 2021 |
| | 4252 | *Fauvette grisette* | *Fauvette grisette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 2 | 2 | 2010 - 2018 |
| | 3070 | *Fulica atra Linnaeus, 1758* | *Foulque macroule* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2019 - 2019 |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 3791 | *Grimpereau des jardins* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 7 | 14 | 2010 - 2021 |
| | 4142 | *Grive draine* | *Grive draine* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 12 | 2010 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4129 | *Grive musicienne* | *Grive musicienne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 5 | 30 | 2010 - 2021 |
| | 4625 | *Grosbec casse-noyaux* | *Grosbec casse-noyaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 40 | 2010 - 2021 |
| | 4215 | *Hypolaïs polyglotte* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 1 | 1 | 2010 - 2021 |
| | 534750 | *Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange huppée* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2012 - 2012 |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2019 - 2019 |
| | 3551 | *Martinet noir* | *Martinet noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 1 | 1 | 2010 - 2021 |
| | 4117 | *Merle noir* | *Merle noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 7 | 126 | 2010 - 2021 |
| | 4342 | *Mésange à longue queue* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | 6 | 18 | 2010 - 2018 |
| | 3764 | *Mésange charbonnière* | *Mésange charbonnière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 7 | 42 | 2010 - 2021 |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 6 | 2016 - 2021 |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4361 | *Parus cristatus Linnaeus, 1758* | *Mésange huppée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 4351 | *Parus palustris Linnaeus, 1758* | *Mésange nonnette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | *Moineau domestique* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2021 - 2021 |
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | *Rougequeue noir* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2021 - 2021 |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | *Rougequeue à front blanc* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2018 - 2021 |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 3611 | *Pic épeiche* | *Pic épeiche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 10 | 20 | 2010 - 2021 |
| | 3603 | *Pic vert* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 7 | 7 | 2010 - 2021 |
| | 4564 | *Pinson des arbres* | *Pinson des arbres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 8 | 800 | 2010 - 2021 |
| | 534753 | *Poecile palustris (Linnaeus, 1758)* | *Mésange nonnette* | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 6 | 2013 - 2019 |
| | 4280 | *Pouillot véloce* | *Pouillot véloce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 8 | 32 | 2010 - 2021 |
| | 459638 | *Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 2 | 2012 - 2012 |
| | 4314 | *Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4001 | *Rougegorge familier* | *Rougegorge familier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 4 | 24 | 2010 - 2021 |
| | 3774 | *Sittelle torchepot* | *Sittelle torchepot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 9 | 45 | 2010 - 2021 |
| | 3429 | *Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)* | *Tourterelle turque* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2021 - 2021 |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2019 - 2019 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Joveniaux A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 3967 | *Troglodyte mignon* | *Troglodyte mignon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Joveniaux A. | | 6 | 36 | 2010 - 2021 |
| Phanérogames | 79319 | *Abies alba Mill., 1768* | *Sapin blanc, Sapin pectiné* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79816 | *Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton, 1789* | *Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79921 | *Achillea ptarmica L., 1753* | *Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80243 | *Adoxa moschatellina L., 1753* | *Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80322 | *Aegopodium podagraria L., 1753* | *Égopode podagraire, Podagraire, Herbe aux goutteux, Fausse angélique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80358 | *Aethusa cynapium L., 1753* | *Petite cigüe, Faux persil, Éthuse ache-des-chiens* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80410 | *Agrimonia eupatoria L., 1753* | *Aigremoine eupatoire, Francormier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80414 | *Agrimonia odorata auct. non Mill., 1768* | *Aigremoine élevée, Aigremoine odorante, Aigremoine rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80499 | *Agropyron repens (L.) P.Beauv., 1812* | *Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80805 | *Agrostis vulgaris With., 1796* | *Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80857 | *Aira caryophyllea L., 1753* | *Aïra caryophyllé, Canche caryophyllée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81041 | *Alchemilla arvensis (L.) Scop., 1771* | *Aphane des champs, Alchémille des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81294 | *Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb., 1819* | *Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne, Vergne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81637 | *Alopecurus geniculatus L., 1753* | *Vulpin genouillé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82288 | *Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817* | *Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83267 | *Aquilegia vulgaris L., 1753* | *Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83272 | *Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842* | *Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83282 | *Arabis arenosa (L.) Scop., 1772* | *Fausse arabette des sables, Fausse cardamine des sables, Arabette des sables, Cholot* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83499 | *Arctium lappa L., 1753* | *Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84203 | *Arundo phragmites L., 1753* | *Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84318 | *Asperula odorata L., 1753* | *Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85152 | *Atropa belladonna L., 1753* | *Belladone, Bouton-noir, Atrope belladone* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85557 | *Barbarea vulgaris R.Br., 1812* | *Barbarée commune, Herbe de Sainte-Barbe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette vivace, Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85774 | *Berberis vulgaris L., 1753* | *Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbéris commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85909 | *Betula verrucosa Ehrh., 1790* | *Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | *Bromus erectus Huds., 1762* | *Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86680 | *Bromus mollis L., 1762* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86763 | *Bromus sterilis L., 1753* | *Brome stérile, Anisanthe stérile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87227 | *Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788* | *Calamagrostide épigéios, Calamagrostide commune, Roseau des bois, Calamagrostide terrestre, Calamagrostis épigéios* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87336 | *Calamintha clinopodium Benth., 1834* | *Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87354 | *Calamintha officinalis Moench, 1794* | *Clinopode népéta, Calament népéta, Sarriette népéta* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87481 | *Callitriche polymorpha Lönnr., 1854* | *Callitriche à fruits obtus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87484 | *Callitriche stagnalis Scop., 1772* | *Callitriche des eaux stagnantes, Callitriche des étangs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87693 | *Campanula persicifolia L., 1753* | *Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87712 | *Campanula rapunculus L., 1753* | *Campanule raiponce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87720 | *Campanula rotundifolia L., 1753* | *Campanule à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87742 | *Campanula trachelium L., 1753* | *Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87849 | *Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792* | *Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87915 | *Cardamine flexuosa With., 1796* | *Cardamine flexueuse, Cardamine des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87933 | *Cardamine impatiens L., 1753* | *Cardamine impatiente, Herbe au diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88395 | *Carex brizoides L., 1755* | *Laîche fausse brize* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88441 | *Carex contigua Hoppe, 1835* | *Laîche en épi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88477 | *Carex distans L., 1759* | *Laîche à épis distants, Laîche distante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88478 | *Carex disticha Huds., 1762* | *Laîche distique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88483 | *Carex divulsa Stokes, 1787* | *Laîche écartée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88493 | *Carex elongata L., 1753* | *Laîche allongée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88538 | *Carex glauca Scop., 1772* | *Laîche glauque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88545 | *Carex gracilis Curtis, 1786* | *Laîche aiguë, Laîche grêle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88569 | *Carex hirta L., 1753* | *Laîche hérissée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88626 | *Carex leporina L., 1753* | *Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche à épis ovales* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88747 | *Carex pallescens L., 1753* | *Laîche pâlissante, Laîche pâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche panic, Laîche bleuâtre, Laîche millet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88766 | *Carex pendula Huds., 1762* | *Laîche à épis pendants, Laîche pendante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88775 | *Carex pilulifera L., 1753* | *Laîche à pilules* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88783 | *Carex polyrrhiza Wallr., 1822* | *Laîche des ombrages, Laîche des lieux ombragés, Laîche à racines nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée, Laîche à épis espacés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88833 | *Carex riparia Curtis, 1783* | *Laîche des rives* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88916 | *Carex tomentosa L., 1767* | *Laîche tomenteuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | *Carex vesicaria L., 1753* | *Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | *Carpinus betulus L., 1753* | *Charme commun, Charme, Charmille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89619 | *Centaurea jacea L., 1753* | *Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89653 | *Centaurea nigra L., 1753* | *Centaurée noire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 619051 | *Centaurium umbellatum sensu P.Fourn., 1938* | *Érythrée petite-centaurée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89920 | *Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906* | *Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89927 | *Cephalanthera pallens (Sw.) Rich., 1818* | *Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89933 | *Cephalanthera xiphophyllum (L.f.) Rchb.f., 1851* | *Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89981 | *Cerastium caespitosum Gilib. ex Asch., 1864* | *Céraiste commun , Mouron d'alouette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90091 | *Cerastium semidecandrum L., 1753* | *Céraiste à cinq étami étamines, Céraiste variable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90208 | *Ceratophyllum demersum L., 1753* | *Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90420 | *Chamaecytisus supinus (L.) Link, 1831* | *Cytise hirsute, Cytise hérissé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90526 | *Chamaespartium sagittale (L.) P.E.Gibbs, 1968* | *Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90669 | *Chelidonium majus L., 1753* | *Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90681 | *Chenopodium album L., 1753* | *Chénopode blanc, Senousse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90786 | *Chenopodium polyspermum L., 1753* | *Lipandra polysperme, Chénopode polysperme, Chénopode à graines nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91053 | *Chrysanthemum leucanthemum L., 1753* | *Marguerite commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91118 | *Chrysosplenium alternifolium L., 1753* | *Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91120 | *Chrysosplenium oppositifolium L., 1753* | *Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91356 | *Cirsium lanceolatum (L.) Scop., 1772* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92127 | *Colchicum autumnale L., 1753* | *Colchique d'automne, Safran des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | *Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92353 | *Convolvulus sepium L., 1753* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92546 | *Coronilla varia L., 1753* | *Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92880 | *Crataegus oxyacantha L., 1754* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93015 | *Crepis biennis L., 1753* | *Crépide bisannuelle, Crépide des prés, Crépis bisannuel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93157 | *Crepis vesicaria L., 1753* | *Crépide vésiculeuse, Crépis à vésicules* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93936 | *Cyperus fuscus L., 1753* | *Souchet brun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94111 | *Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845* | *Cytise couché, Cytise pédonculé, Genêt prostré, Cytise rampant, Cytise retombant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94169 | *Cytisus supinus L., 1753* | *Cytise hirsute, Cytise hérissé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94266 | *Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962* | *Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94432 | *Daphne laureola L., 1753* | *Daphné lauréole, Laurier des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94628 | *Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836* | *Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94693 | *Dianthus armeria L., 1753* | *Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94945 | *Digitalis lutea L., 1753* | *Digitale jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94995 | *Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771* | *Digitaire sanguine, Digitaire commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 133916 | *Dipsacus fullonum subsp. sylvestris (Huds.) P.Fourn., 1939* | *Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95671 | *Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812* | *Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95980 | *Elodea canadensis Michx., 1803* | *Élodée du Canada* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96136 | *Epilobium angustifolium L., 1753* | *Épilobe à feuilles étroites, Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96150 | *Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826* | *Épilobe des collines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96191 | *Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818* | *Épilobe lancéolé, Épilobe à feuilles lancéolées* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96208 | *Epilobium montanum L., 1753* | *Épilobe des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96220 | *Epilobium obscurum Schreb., 1771* | *Épilobe à feuilles sombres, Épilobe obscur, Épilobe vert foncé, Épilobe foncé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96229 | *Epilobium parviflorum Schreb., 1771* | *Épilobe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96251 | *Epilobium roseum Schreb., 1771* | *Épilobe rosé, Épilobe rose* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L., 1753* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96749 | *Erigeron canadensis L., 1753* | *Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96803 | *Erigeron ramosus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888* | *Érigéron maigre, Vergerette maigre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97903 | *Euonymus vulgaris Mill., 1768* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97490 | *Euphorbia cyparissias L., 1753* | *Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97502 | *Euphorbia dulcis L., 1753* | *Euphorbe douce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97616 | *Euphorbia platyphyllos L., 1753* | *Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97699 | *Euphorbia verrucosa auct. non L., 1753* | *Euphorbe verruqueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97801 | *Euphrasia rostkoviana Hayne, 1825* | *Euphraise de Roskov, Euphraise des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97811 | *Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809* | *Euphraise raide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98250 | *Festuca gigantea (L.) Vill., 1787* | *Schédonore géant, Fétuque géante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98280 | *Festuca heterophylla Lam., 1779* | *Fétuque hétérophylle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98425 | *Festuca ovina L., 1753* | *Fétuque ovine, Fétuque des moutons* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98460 | *Festuca pratensis Huds., 1762* | *Schédonore des prés, Fétuque des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98651 | *Ficaria verna Huds., 1762* | *Ficaire printanière, Renoncule ficaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98680 | *Filago germanica (L.) L., 1759* | *Cotonnière pyramidale, Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées, Cotonnière en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98868 | *Fragaria viridis Weston, 1771* | *Fraisier vert* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99289 | *Galeopsis dubia Leers, 1775* | *Galéopsis des moissons, Galéopsis douteux, Galéopsis des champs, Galéopse des moissons, Galéopse velu, Galéopse douteux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99334 | *Galeopsis tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéopse tétrahit* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99552 | *Galium sylvaticum L., 1762* | *Gaillet des forêts, Gaillet des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99683 | *Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812* | *Gaudinie fragile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99754 | *Genista germanica L., 1753* | *Genêt d'Allemagne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99798 | *Genista pilosa L., 1753* | *Genêt poilu, Genêt velu, Genette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99828 | *Genista tinctoria L., 1753* | *Genêt des teinturiers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100516 | *Gnaphalium sylvaticum L., 1753* | *Gnaphale des bois, Omalothèque des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100519 | *Gnaphalium uliginosum L., 1753* | *Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100607 | *Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813* | *Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100677 | *Gypsophila muralis L., 1753* | *Gypsophile des murailles, Gypsophile des moissons, Gypsophile des murs, Gypsophile des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100956 | *Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768* | *Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101188 | *Helleborus foetidus L., 1753* | *Ellébore fétide, Pied-de-griffon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101412 | *Herniaria hirsuta L., 1753* | *Herniaire hirsute, Herniaire velue, Herniaire hérissée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159698 | *Hieracium auricula* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 102235 | *Hieracium murorum L., 1753* | *Épervière des murs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | *Pilloselle officinale, Épervière piloselle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102354 | *Hieracium piloselloides Vill., 1779* | *Piloselle fausse piloselle, Épervière fausse piloselle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102383 | *Hieracium praecox Sch.Bip., 1851* | *Épervière fragile, Épervière précoce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102483 | *Hieracium sabaudum L., 1753* | *Épervière de Savoie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102671 | *Hieracium umbellatum L., 1753* | *Épervière en ombelle, Épervière à fleurs en ombelle, Accipitrine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102797 | *Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826* | *Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103287 | *Hypericum hirsutum L., 1753* | *Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103288 | *Hypericum humifusum L., 1753* | *Millepertuis couché, Petit millepertuis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103320 | *Hypericum pulchrum L., 1753* | *Millepertuis élégant, Millepertuis joli* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103364 | *Hypochaeris glabra L., 1753* | *Porcelle glabre, Porcelle des sables* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée, Salade-de-porc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx commun, Houx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103553 | *Impatiens noli-tangere L., 1753* | *Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas, Balsamine des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103608 | *Inula conyza DC., 1836* | *Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104155 | *Juncus compressus Jacq., 1762* | *Jonc comprimé, Jonc à tiges comprimées* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104200 | *Juncus glaucus Ehrh. ex Sibth., 1794* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104228 | *Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104345 | *Juncus supinus Moench, 1777* | *Jonc bulbeux, Jonc couché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104348 | *Juncus sylvaticus auct. non Reichard* | *Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104353 | *Juncus tenuis Willd., 1799* | *Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | *Juniperus communis L., 1753* | *Genévrier commun, Genièvre, Peteron* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104516 | *Knautia arvensis (L.) Coult., 1828* | *Knautie des champs, Oreille-d'âne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104665 | *Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812* | *Koelérie pyramidale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104889 | *Lamium maculatum (L.) L., 1763* | *Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105201 | *Lathyrus hirsutus L., 1753* | *Gesse hérissée, Gesse hirsute* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105226 | *Lathyrus montanus Bernh., 1800* | *Gesse à feuilles de Lin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | *Lathyrus pratensis L., 1753* | *Gesse des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105266 | *Lathyrus sylvestris L., 1753* | *Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105273 | *Lathyrus tuberosus L., 1753* | *Gesse tubéreuse, Macusson, Sanard, Gland-de-terre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105400 | *Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788* | *Leersie faux riz* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | *Leontodon hispidus L., 1753* | *Liondent hispide, Liondent variable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troène commun, Troène, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106288 | *Linum catharticum L., 1753* | *Lin purgatif* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106370 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace, Ray-grass anglais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106595 | *Lonicera xylosteum L., 1753* | *Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotier pédonculé, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106811 | *Luzula albida (Hoffm.) DC., 1805* | *Luzule fausse luzule, Luzule blanchâtre, Luzule blanche, Luzule des bosquets* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106818 | *Luzula campestris (L.) DC., 1805* | *Luzule champêtre, Luzule des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106854 | *Luzula pilosa (L.) Willd., 1809* | *Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106863 | *Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811* | *Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107072 | *Lysimachia nemorum L., 1753* | *Lysimaque des bois, Mouron jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107168 | *Malachium aquaticum (L.) Fr., 1817* | *Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107282 | *Malva moschata L., 1753* | *Mauve musquée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107446 | *Matricaria discoidea DC., 1838* | *Matricaire discoïde, Matricaire fausse camomille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107795 | *Melampyrum pratense L., 1753* | *Mélampyre des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107824 | *Melandrium sylvestre (Schkuhr) Röhl., 1812* | *Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | *Melica uniflora Retz., 1779* | *Mélique uniflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107886 | *Melilotus albus Medik., 1787* | *Mélilot blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107942 | *Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779* | *Mélilot officinal, Mélilot jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108308 | *Mentha x rotundifolia (L.) Huds., 1762* | *Menthe à feuilles rondes, Menthe du Nil* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108421 | *Mespilus germanica L., 1753* | *Néflier d'Allemagne, Néflier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108537 | *Milium effusum L., 1753* | *Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108597 | *Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936* | *Minuartie à petites feuilles, Sabline à petites feuilles, Alsine à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108770 | *Monotropa hypopitys L., 1753* | *Monotrope sucepin, Sucepin, Hypopitys monotrope* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108961 | *Mycelis muralis (L.) Dumort., 1827* | *Laitue des murs, Mycélide des murs, Mycélis des murs, Pendrille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108996 | *Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764* | *Myosotis des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109084 | *Myosotis ramosissima Rochel, 1814* | *Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109506 | *Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817* | *Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110392 | *Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802* | *Ophrys bourdon, Ophrys frelon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110914 | *Orchis mascula (L.) L., 1755* | *Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110920 | *Orchis militaris L., 1753* | *Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110927 | *Orchis morio L., 1753* | *Anacamptide bouffon, Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111289 | *Origanum vulgare L., 1753* | *Origan commun, Marjolaine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111369 | *Ornithogalum pyrenaicum L., 1753* | *Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111419 | *Ornithopus perpusillus L., 1753* | *Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | *Oxalis acetosella L., 1753* | *Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112355 | *Papaver rhoeas L., 1753* | *Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112421 | *Paris quadrifolia L., 1753* | *Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112550 | *Pastinaca sativa L., 1753* | *Panais cultivé, Pastinacier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112844 | *Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr., 1813* | *Cervaire de Rivinus, Herbe-aux-cerfs, Peucédan des cerfs, Peucédan herbe-aux-cerfs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113221 | *Phleum pratense L., 1753* | *Fléole des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | *Phyteuma spicatum L., 1753* | *Raiponce en épi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113474 | *Picris hieracioides L., 1753* | *Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113579 | *Pimpinella major (L.) Huds., 1762* | *Boucage élevé, Grand boucage, Grande pimpinelle, Pimpinelle élevée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | *Pinus sylvestris L., 1753* | *Pin sylvestre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113906 | *Plantago media L., 1753* | *Plantain moyen* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114011 | *Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817* | *Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114160 | *Poa compressa L., 1753* | *Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114297 | *Poa nemoralis L., 1753* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114545 | *Polygala comosa Schkuhr, 1796* | *Polygale chevelu, Polygala chevelu, Polygale à toupet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114595 | *Polygala vulgaris L., 1753* | *Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114658 | *Polygonum aviculare L., 1753* | *Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114698 | *Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc., 1846* | *Renouée du Japon, Reynoutrie du Japon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114745 | *Polygonum hydropiper L., 1753* | *Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114761 | *Polygonum lapathifolium L., 1753* | *Persicaire à feuilles de patience, Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114784 | *Polygonum minus Huds., 1762* | *Persicaire mineure, Petite renouée, Petite persicaire, Renouée fluette, Renouée mineure* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier tremble, Tremble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115245 | *Potamogeton crispus L., 1753* | *Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115280 | *Potamogeton natans L., 1753* | *Potamot nageant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115305 | *Potamogeton pusillus L., 1753* | *Potamot fluet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115402 | *Potentilla anserina L., 1753* | *Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115407 | *Potentilla argentea L., 1753* | *Potentille argentée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115482 | *Potentilla fragariastrum Ehrh., 1792* | *Potentille stérile, Potentille faux fraisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | *Potentilla tormentilla Neck., 1770* | *Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115694 | *Potentilla verna sensu L., 1753* | *Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115865 | *Primula elatior (L.) Hill, 1765* | *Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115900 | *Primula officinalis Hill, 1765* | *Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Herbe Catois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Prunier merisier, Cerisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116421 | *Pulmonaria obscura Dumort., 1865* | *Pulmonaire obscure, Pulmonaire sombre, Herbe-de-cœur* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116574 | *Pyrus communis L., 1753* | *Poirier commun, Poirier cultivé, Poirier domestique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116593 | *Pyrus malus L., 1753* | *Pommier nain, Pommier, Pomme, Pommier 'Paradis'* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | *Quercus pedunculata Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116936 | *Ranunculus auricomus L., 1753* | *Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116948 | *Ranunculus breyninus Crantz, 1763* | *Renoncule de Breyne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117221 | *Ranunculus sardous Crantz, 1763* | *Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | *Rhamnus frangula L., 1753* | *Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117587 | *Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777* | *Rhinanthe crête-de-coq, Rhinanthe velu, Grand rhinanthe, Rhinanthe hérissé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117616 | *Rhinanthus minor L., 1756* | *Rhinanthe mineur, Petit cocriste, Petit rhinanthe, Rhinanthe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117774 | *Ribes rubrum L., 1753* | *Groseillier rouge, Groseillier à grappes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117986 | *Rosa agrestis Savi, 1798* | *Rosier agreste, Rosier des haies, Églantier agreste* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118073 | *Rosa canina L., 1753* | *Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 118993 | *Rubus caesius L., 1753* | *Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119149 | *Rubus idaeus L., 1753* | *Ronce framboisier, Framboisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119419 | *Rumex acetosella L., 1753* | *Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119550 | *Rumex obtusifolius L., 1753* | *Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119780 | *Sagina apetala Ard., 1763* | *Sagine apétale, Sagine sans pétales* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119860 | *Sagittaria sagittifolia L., 1753* | *Sagittaire à feuilles en flèche, Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119915 | *Salix alba L., 1753* | *Saule blanc, Saule commun, Osier blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119952 | *Salix aurita L., 1753* | *Saule à oreillettes, Petit marsault* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120246 | *Salix triandra L., 1753* | *Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120685 | *Salvia pratensis L., 1753* | *Sauge des prés, Sauge commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120712 | *Sambucus ebulus L., 1753* | *Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120720 | *Sambucus racemosa L., 1753* | *Sureau à grappes, Sureau de montagne, Sureau rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120753 | *Sanguisorba minor Scop., 1771* | *Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120772 | *Sanicula europaea L., 1753* | *Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120867 | *Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121334 | *Scabiosa columbaria L., 1753* | *Scabieuse colombaire, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121759 | *Scirpus palustris L., 1753* | *Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121785 | *Scirpus setaceus L., 1753* | *Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121792 | *Scirpus sylvaticus L., 1753* | *Scirpe des forêts, Scirpe des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121823 | *Scleranthus annuus L., 1753* | *Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121997 | *Scrophularia aquatica L., 1753* | *Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrofulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122073 | *Scutellaria minor Huds., 1762* | *Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122101 | *Sedum acre L., 1753* | *Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122106 | *Sedum album L., 1753* | *Orpin blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122236 | *Sedum reflexum L., 1755* | *Orpin réfléchi, Orpin des rochers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122256 | *Sedum sexangulare L., 1753* | *Orpin à six angles, Orpin de Bologne, Orpin doux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122596 | *Senecio erucifolius L., 1755* | *Jacobée à feuilles de roquette, Séneçon à feuilles de roquette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122636 | *Senecio jacobaea L., 1753* | *Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122726 | *Senecio sylvaticus L., 1753* | *Séneçon des forêts, Séneçon des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122744 | *Senecio viscosus L., 1753* | *Séneçon visqueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123037 | *Seseli montanum L., 1753* | *Séséli des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123369 | *Silaus flavescens Bernh., 1800* | *Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123509 | *Silene inflata Sm., 1800* | *Silène commun, Silène enflé, Tapotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123568 | *Silene nutans L., 1753* | *Silène penché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123949 | *Sium erectum Huds., 1762* | *Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | *Solidago virgaurea L., 1753* | *Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron épineux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124261 | *Sonchus oleraceus L., 1753* | *Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | *Sorbus aria (L.) Crantz, 1763* | *Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124308 | *Sorbus aucuparia L., 1753* | *Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124346 | *Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763* | *Sorbier alisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124417 | *Sparganium ramosum Huds., 1778* | *Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124418 | *Sparganium simplex Huds., 1778* | *Rubanier émergé, Rubanier simple* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124549 | *Spergularia campestris (L.) Asch., 1859* | *Spergulaire rouge, Sabline rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Bétoine officinale, Épiaire officinal* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125014 | *Stellaria media (L.) Vill., 1789* | *Stellaire intermédiaire, Mouron, Mouron blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125044 | *Stellaria uliginosa Murray, 1770* | *Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | *Succisa praemorsa Asch., 1864* | *Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125447 | *Tamus communis L., 1753* | *Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125677 | *Taraxacum officinale Weber, 1780* | *Pissenlit officinal, Pissenlit commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126298 | *Thesium humifusum DC., 1815* | *Thésion couché, Thésium couché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126376 | *Thlaspi perfoliatum L., 1753* | *Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126628 | *Tilia cordata Mill., 1768* | *Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126844 | *Torilis anthriscus (L.) C.C.Gmel., 1805* | *Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127029 | *Tragopogon pratensis L., 1753* | *Salsifis des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth., 1794* | *Trèfle douteux, Petit trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127296 | *Trifolium elegans Savi, 1798* | *Trèfle élégant, Trèfle hybride élégant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127304 | *Trifolium filiforme L., 1753* | *Trèfle à petites fleurs, Trèfle filiforme* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127463 | *Trifolium rubens L., 1753* | *Trèfle rougi, Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré, Trèfle queue-de-renard, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127470 | *Trifolium scabrum L., 1753* | *Trèfle scabre, Trèfle rude* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127660 | *Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812* | *Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128042 | *Tussilago farfara L., 1753* | *Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128062 | *Typha angustifolia L., 1753* | *Massette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128077 | *Typha latifolia L., 1753* | *Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128298 | *Urtica urens L., 1753* | *Ortie brûlante, Ortie grièche, Petite ortie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128484 | *Valerianella olitoria (L.) Pollich, 1776* | *Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale, verveine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128793 | *Veronica anagalloides Guss., 1826* | *Véronique faux mouron, Véronique faux mouron-d'eau, Véronique fausse anagallide, Véronique faux anagallis* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 128808 | *Veronica beccabunga L., 1753* | *Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit-chêne, Fausse germandrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128924 | *Veronica montana L., 1755* | *Véronique des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129147 | *Vicia cracca L., 1753* | *Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129325 | *Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771* | *Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129470 | *Vinca minor L., 1753* | *Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129477 | *Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790* | *Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129492 | *Viola alba Besser, 1809* | *Violette blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129529 | *Viola canina L., 1753* | *Violette des chiens* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129586 | *Viola hirta L., 1753* | *Violette hérissée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129669 | *Viola riviniana Rchb., 1823* | *Violette de Rivinus, Violette de Rivin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129997 | *Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821* | *Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130028 | *Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805* | *Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109009 | *Myosotis collina Rchb., 1822* | *Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | *Doradille noire, Capillaire noire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84521 | *Asplenium ruta-muraria L., 1753* | *Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84534 | *Asplenium trichomanes L., 1753* | *Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94066 | *Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805* | *Cystoptéride fragile, Cystoptéris fragile, Capillaire blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95586 | *Dryopteris phegopteris (L.) C.Chr., 1905* | *Phégoptéride commune, Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris phégoptéris, Fougère à moustache* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96508 | *Equisetum arvense L., 1753* | *Prêle des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115041 | *Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799* | *Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115057 | *Polystichum filix-mas (L.) Roth, 1799* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121894 | *Scolopendrium vulgare Sm., 1793* | *Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159792 | *Polystichum spinulosum* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | *Orvet fragile (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77947 | *Coluber viridiflavus Lacepède, 1789* | *Couleuvre verte et jaune (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77949 | *Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)* | *Couleuvre verte et jaune (La)* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77686 | *Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)* | *Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples | | | | |
| | 77756 | *Lézard des murailles* | *Lézard des murailles (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | 4 | 16 | 2017 - 2021 |
| | 78064 | *Natrix natrix (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier* | Reproduction indéterminée | | | | | |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | *Salamandre tachetée* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 197 | *Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 212 | *Sonneur à ventre jaune* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 259 | *Crapaud commun* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 310 | *Grenouille agile* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 351 | *Grenouille rousse* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse *(lien)* |
| | 444430 | *Triton alpestre* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444431 | *Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444432 | *Triton palmé* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444440 | *Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 444443 | *Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 699564 | *Lissotriton vulgaris vulgaris (Linnaeus, 1758)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Crustacés | 18437 | *Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain *(lien)* |
| Insectes | 10502 | *Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Mammifères | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60360 | *Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60383 | *Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60461 | *Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60527 | *Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2623 | *Buse variable* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2832 | *Bondrée apivore* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2891 | *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Épervier d'Europe* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3070 | *Fulica atra Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3420 | *Columba livia Gmelin, 1789* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3429 | *Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3439 | *Tourterelle des bois* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Coucou gris* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3540 | *Engoulevent d'Europe* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3551 | *Martinet noir* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3601 | *Picus canus Gmelin, 1788* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Pic vert* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Pic noir* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Pic épeiche* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3619 | *Pic mar* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Pic épeichette* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3696 | *Hirondelle rustique* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Pipit des arbres* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Mésange charbonnière* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sittelle torchepot* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Grimpereau des jardins* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Loriot d'Europe* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Pie-grièche écorcheur* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3941 | *Bergeronnette grise* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodyte mignon* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Accenteur mouchet* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Rougegorge familier* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Merle noir* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Grive musicienne* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Grive draine* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4215 | *Hypolaïs polyglotte* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Fauvette grisette* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Fauvette des jardins* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Fauvette à tête noire* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Pouillot siffleur* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Pouillot véloce* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4308 | *Roitelet huppé* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4319 | *Gobemouche gris* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Mésange à longue queue* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4510 | *Grand Corbeau* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Pinson des arbres* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Grosbec casse-noyaux* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Bruant jaune* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459478 | *Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 459638 | *Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 534742 | *Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534750 | *Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534753 | *Poecile palustris (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77756 | *Lézard des murailles* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 77949 | *Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Angiospermes | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 94693 | *Dianthus armeria L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 97699 | *Euphorbia verrucosa auct. non L., 1753* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 106419 | *Littorella uniflora (L.) Asch., 1864* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 117096 | *Ranunculus lingua L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 115041 | *Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Bessard S., Augé V., Derome H. et al. | 2007 | Habitats forestiers du massif de la Serre. Site Natura 2000 n° FR4301318. ONF, DIREN Franche-Comté. 52p. + annexes cartographiques |
| | Bouard H. et Didier B. | 2006 | Site Natura 2000 - Forêt de la Serre. Cartographie des milieux ouverts. SIG et atlas cartographique. DIREN Franche-Comté. 31p. + annexes |
| | Guillaume C. et Roué S.Y. | 2007 | Synthèse des connaissances sur les chiroptères du massif de la Serre (FR 4301318). CPEPESC, DIREN Franche-Comté, 37 p + 2 annexes |
| | Joveniaux A., Chevillard S. | 2010 | Site Natura 2000 Massif de la Serre FR4301218. Etude ornithologique. EPA, Grand Dole, 93 p. |
| | Paris M. | 2007 | Expertise des amphibiens sur le massif de la Serre. Communauté de communes Jura entre Serre et Chaux. 30p. |
| | ROUX H, BIOT N, MILLET B, MILLET P, ROBERT JC | | Le massif de la Serre. Bull. Soc. Hist. Nat. du Doubs, 76, n°2, 9-22 |
| Informateur | Bessard S. | | |
| | Bouard H. (Gagea) | | |
| | Déforêt T. | 2001 | |
| | Ferrez Y. | | |
| | Ferrez Y., Millet P. et Bailly G. | | |
| | GNFC | | |
| | Jacques M. | | |
| | Joveniaux A. | | |
| | Mange M. | | |
| | Millet P. | | |
| | Paris M. | | |
| | Pascal B. | | |
| | Prost J.-F. | | |
| | Prost J.-F. | | |
| | Sources multiples | 0 | |