# BASSIN DU DRUGEON
# (Identifiant national : 430002282)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 46106000)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430002282, BASSIN DU DRUGEON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 130P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282.pdf*

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 902148°-2220640°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/12/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 7
6. HABITATS ..... 7
7. ESPECES ..... 40
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 129
9. SOURCES ..... 130

# 1. DESCRIPTION

## ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430002293 - (Id reg. : 41106007)
- Id nat. : 430010455 - (Id reg. : 46106004)
- Id nat. : 430010456 - (Id reg. : 46106005)
- Id nat. : 430009449 - (Id reg. : 46106001)
- Id nat. : 430020020 - (Id reg. : 41106013)
- Id nat. : 430020021 - (Id reg. : 46106014)
- Id nat. : 430013639 - (Id reg. : 46106006)
- Id nat. : 430007827 - (Id reg. : 46106002)
- Id nat. : 430010454 - (Id reg. : 46106003)
- Id nat. : 430002243 - (Id reg. : 46106012)
- Id nat. : 430002290 - (Id reg. : 46106009)
- Id nat. : 430002265 - (Id reg. : 46106008)
- Id nat. : 430002285 - (Id reg. : 46106010)
- Id nat. : 430002287 - (Id reg. : 46106011)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Département : Doubs

- Commune : Communailles-en-Montagne (INSEE : 39161)
- Commune : Mignovillard (INSEE : 39331)
- Commune : Dompierre-les-Tilleuls (INSEE : 25202)
- Commune : Chaffois (INSEE : 25110)
- Commune : Houtaud (INSEE : 25309)
- Commune : Bannans (INSEE : 25041)
- Commune : Frasne (INSEE : 25259)
- Commune : Pontarlier (INSEE : 25462)
- Commune : Bulle (INSEE : 25100)
- Commune : Bief-du-Fourg (INSEE : 39053)
- Commune : Vaux-et-Chantegrue (INSEE : 25592)
- Commune : Bouverans (INSEE : 25085)
- Commune : Malpas (INSEE : 25362)
- Commune : Rivière-Drugeon (INSEE : 25493)
- Commune : Sainte-Colombe (INSEE : 25515)
- Commune : Granges-Narboz (INSEE : 25293)
- Commune : Bonnevaux (INSEE : 25075)

## 1.2 Superficie

6632,36 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 808
Maximale (mètre): 1014

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002285 - ZONES HUMIDES ENTRE CHAFFOIS, HOUTAUD, GRANGES-NARBOZ ET SAINTE COLOMBE (Type 1) (Id reg. : 46106010)
- Id nat. : 430002287 - ZONES HUMIDES ET PRAIRIES SECHES ENTRE LES GRANGES-NARBOZ ET SAINTE COLOMBE (Type 1) (Id reg. : 46106011)
- Id nat. : 430002290 - ZONES HUMIDES DE VAU LES AIGUES A LA LOITIERE (Type 1) (Id reg. : 46106009)
- Id nat. : 430002293 - TOURBIERE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE ET BIEF BELIN (Type 1) (Id reg. : 41106007)
- Id nat. : 430002243 - TOURBIERES DE LA SEIGNE DES BARBOUILLONS ET DES PALUS (Type 1) (Id reg. : 46106012)

- Id nat. : 430009449 - BOIS DU FORBONNET ET TOURBIERE VIVANTE DE FRASNE (Type 1) (Id reg. : 46106001)
- Id nat. : 430010455 - L'ETANG LUCIEN ET LES VAUDINS (Type 1) (Id reg. : 46106004)
- Id nat. : 430010456 - ENSEMBLE DES MARAIS ENTRE BOUVERANS, DOMPIERRE-LES-TILLEULS ET FRASNE (Type 1) (Id reg. : 46106005)
- Id nat. : 430020020 - HAUTE VALLEE DU DRUGEON ET PRÉ VAILLON (Type 1) (Id reg. : 41106013)
- Id nat. : 430020021 - ETANG DE LA RIVIERE-DRUGEON ET ZONES HUMIDES (Type 1) (Id reg. : 46106014)
- Id nat. : 430013639 - TOURBIERE ET PRAIRIE DE LA FERME DU FORBONNET (Type 1) (Id reg. : 46106006)
- Id nat. : 430007827 - L'ENTONNOIR, ZONES HUMIDES DU DRUGEON ET COTE DE LA FEUILLEE (Type 1) (Id reg. : 46106002)
- Id nat. : 430010454 - GRAND ETANG DE FRASNE (Type 1) (Id reg. : 46106003)
- Id nat. : 430002265 - LA GRANDE SEIGNE ET LES VESPRIES (Type 1) (Id reg. : 46106008)

## 1.5 Commentaire général

DESCRIPTION DU SITE - INTERET

La vallée du Drugeon occupe une large cuvette, orientée sud-ouest/nord-est qui débouche sur la ville de Pontarlier, dans le massif du Jura. Le Drugeon occupe le thalweg sur 32 km, de sa source dans les marais de Malpas et de Vaux-en-Chantegrue, à sa confluence avec le Doubs, à Tout-Vent, au nord de Pontarlier. De nombreux ruisseaux et sources jalonnent son cours. La vallée repose sur des dépôts glaciaires où alternent des couches plus ou moins imperméables, abandonnées en mosaïque au terme des glaciations (-15000 ans) et colonisées par une végétation diversifiée.

Considéré dans son ensemble, ce site constitue une unité écologique de valeur exceptionnelle dont les milieux, juxtaposés en mosaïque, se complètent, de la pelouse sèche au marais alcalin et à la tourbière.

A partir de Vaux-et-Chantegrue, le Drugeon emprunte une cluse relativement étroite où les formations végétales de type mégaphorbiaie (formation de hautes herbes installée sur sol humide et riche) et saulaie sont abondantes. Au sud-ouest, elles viennent toucher un vaste complexe où les tourbières, à tous les stades d'évolution, sont largement représentées en raison de la faible influence des eaux de ruissellement. Au nord, le système de bas-marais est dominant, sous l'influence des inondations du Drugeon et des afférences latérales (sources descendant du Laveron) ; quelques tourbières ont pu se former en rive gauche et dans certains secteurs isolés.

Le bassin du Drugeon constitue un complexe écologique de très grande valeur ; on y recense en effet une flore exceptionnelle (50 espèces protégées) et une faune remarquable pour la France (114 vertébrés et 13 invertébrés protégés). Les conditions écologiques variées favorisent l'expression de nombreux groupements végétaux en interconnexion fonctionnelle dont l'agencement spatial et la richesse biologique sont exceptionnels :

Les pelouses sèches sont des formations herbacées claires, généralement utilisées par l'agriculture. Des pelouses naturelles sur dalles calcaires à sédum âcre et pâturin des Alpes viennent en contact avec les pelouses à gentiane printanière et brome dressé qui se rencontrent essentiellement dans les prés-bois. Dans la vallée du Drugeon, ces pelouses ont notoirement régressé par suite de l'intensification agricole, pour évoluer vers les prairies eutrophes (riches en éléments nutritifs) largement répandues et de composition floristique plus banale. Les pelouses situées sur la Feuillée à Bonnevaux abritent l'azuré du serpolet, rare papillon protégé en France.

ð Les prairies humides sont de plusieurs types :

- prairie à trolle d'Europe et cirse des ruisseaux dans les parties inondées par les crues le long du Drugeon où elle assure la transition avec les surfaces agricoles ;

- prairie à trolle d'Europe et molinie, peu ou pas amendée et développée le plus souvent au contact des marais. Cet ensemble est complété par la mégaphorbiaie (formation végétale de hautes herbes installée sur des sols humides et riches) où la reine des prés peut atteindre une hauteur et une extension importantes.

- Les cariçaies et roselières sont représentées par les marais à grandes laîches qui développent des touradons et par des zones atterries et envahies par les roseaux au bord du cours d'eau. Les roselières à jonc des tonneliers et roseau occupent les rives du Drugeon et descendent même dans la rivière en période d'étiage. Les cariçaies forment des ceintures plus ou moins imbriquées en retrait de la roselière. Elles abritent une plante caractéristique des milieux palustres et protégée sur le territoire national, la renoncule grande douve. Ces milieux inondés sont ceux qui présentent la plus forte productivité de la vallée du Drugeon.

- La végétation aquatique est caractérisée par plusieurs espèces dont les feuilles flottantes recouvrent plus ou moins la surface de l'eau libre : nénuphar blanc, nénuphar jaune et potamot nageant... La grande utriculaire, espèce carnivore, abonde par ailleurs dans les anciennes fosses d'exploitation de tourbe.

- Le bas-marais produit peu ou pas de tourbe. Son existence est liée à la présence de sources. Il prend le plus souvent l'aspect de prés très humides dominés par le groupement à laîche de Davall. Ce groupement très riche renferme une flore exceptionnelle où l'on rencontre au moins 4 espèces végétales protégées au niveau national dont la très rare laîche étoile des marais.

- Le marais de transition est un stade intermédiaire entre le marais et la tourbière bombée. Il renferme des groupements exceptionnels et une flore relictuelle boréo-arctique unique en France : laîche à long rhizome, laîche des bourbiers ou plus rarement le saxifrage oeil-de-bouc.

- Les boisements correspondent aux groupements végétaux dominés par une strate arborée, spontanée ou plantée. La pessière (forêt à épicéa) et la bétulaie (forêt de bouleaux) sur tourbe s'installent en ceinture externe des tourbières. La saulaie se développe au sein des cariçaies lors d'un abaissement de nappe et aux abords du Drugeon dont elle souligne le cours de façon discontinue. La hêtraie-sapinière, forêt mixte montagnarde, occupe de vastes superficies sur le bassin versant et laisse place, notamment sur le coteau dominant le lac de l'Entonnoir, à la Feuillée, à une forêt de pente caractéristique de l'étage montagnard : la hêtraie à dentaire. La densité en rapaces nicheurs est y très élevée.

- Le haut-marais ou tourbière bombée abrite une végétation oligotrophe (installée sur sol très pauvre en éléments nutritifs, très acide  et ne permettant qu'une activité biologique réduite) ; non soumis aux apports des sources d'eaux calcaires, il est uniquement alimenté par les eaux de pluie acides et pauvres en éléments nutritifs. Certaines tourbières sont actives et continuent de se développer en produisant de la tourbe. D'autres sont inactives car en fin d'évolution ; elles ne produisent plus de tourbe. Parmi elles, certaines sont colonisées par le pin à crochets dont les surfaces sur la commune de Frasne sont relativement exceptionnelles au niveau national.

L'ensemble de ces milieux constitue un habitat privilégié pour la faune invertébrée (14 espèces toutes en danger en France) et vertébrée. Les oiseaux, en particulier, profitent de la diversité des habitats, de leur agencement parfois complexe pour y nicher ou réaliser une halte migratoire (125 espèces observées régulièrement et 85 observées plus rarement). De ce fait, ce site est répertorié parmi les 7 Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O.) de Franche-Comté, en application de la Directive C.E.E. Oiseaux.

POLITIQUE DE PRESERVATION ACTUELLE

Le bassin du Drugeon a fait, par le passé, l'objet d'atteintes graves (correction de la rivière, drainage, extraction de sable, plantations...) ayant pour effet une érosion progressive de cette richesse biologique.

En mettant en œuvre un programme LIFE "Sauvegarde de la richesse biologique de la vallée du Drugeon", le Syndicat intercommunal du Plateau de Frasne a engagé  :

- la renaturation du Drugeon et de ses afférences visant à restaurer son intérêt biologique et restituer au bassin sa capacité de rétention en eau ;

- la remise en état de tourbières et marais dégradés de même que la mise en place d'une gestion sur ces zones humides ;

- une meilleure maitrise foncière des zones humides couplée à la protection des milieux naturels d'intérêt majeur ;

- un programme de réduction de la pollution des eaux grâce à l'assainissement des eaux usées domestiques des différents villages de la vallée et la mise aux normes des bâtiments d'élevage ;

- l'application de pratiques agricoles respec-tueuses des milieux naturels (opération locale agri-environnement) ;

- une sensibilisation des habitants et des acteurs socio-professionnels.

Cette opération a eu un effet d'entraînement particulièrement intéressant pour la protection de l'environnement mais également pour une appropriation locale. Ce programme, jugé exemplaire, satisfait complètement aux objectifs de préservation exprimés dans Natura 2000.

# 1.6 Compléments descriptifs

## 1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle volontaire
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

## 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

## 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Plateau

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

## 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Amphibiens<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Bryophytes<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de régulation hydraulique | - Paysager<br>- Géomorphologique<br>- Géologique<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Diptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Autres Fonges | - Lichens | - Bryophytes | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Hyménoptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *24.43 Végétation des rivières mésotrophes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | 6 | 2009 - 2009 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *22.4311 Tapis de Nénuphars* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *34.3328 Xerobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | 7 | 2007 - 2007 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *42.4 Forêts de Pins de montagne* | | | 2 | |
| | *54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)* | | | | |
| | *51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | 2 | 2007 - 2007 |
| | *44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | 17 | 2007 - 2009 |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles* | | | | |
| | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *42.4 Forêts de Pins de montagne* | | | | |
| | *54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)* | | | | |
| | *22.433 Groupements oligotrophes de Potamots* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *38.3 Prairies de fauche de montagne* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *41.13 Hêtraies neutrophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.422 Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.5 Tourbières de transition* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.541 Pelouses à Carex limosa des bourbiers et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.45 Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.4311 Tapis de Nénuphars* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | | 2007 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBNFC | | 2009 - 2009 |
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22.4311 Tapis de Nénuphars | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 22.433 Groupements oligotrophes de Potamots | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 54.512 Pelouses à Carex lasiocarpa et Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 22.442 Tapis de Nitella | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 24.44 Végétation des rivières eutrophes | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 34.1 Pelouses pionnières médio-européennes | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2008 |
| | 34.322B Mesobromion du Jura français | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 37.311 Prairies à Molinie sur calcaires | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 54.23 Tourbières basses à Carex davalliana | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 24.43 Végétation des rivières mésotrophes | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 22.441 Tapis de Chara | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.14 Roselières basses | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.2152 Cariçaies à Carex cespitosa* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.541 Pelouses à Carex limosa des bourbiers et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.4311 Tapis de Nénuphars* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.441 Tapis de Chara* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.5 Tourbières de transition* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.4314 Tapis de Potamot flottant* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.2152 Cariçaies à Carex cespitosa* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.541 Pelouses à Carex limosa des bourbiers et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.56 Pelouses à Carex heleonastes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.2A Bas-marais à Eleocharis quinqueflora* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.4311 Tapis de Nénuphars* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.422 Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.1134 Buttes à buissons de Vaccinium* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *24.43 Végétation des rivières mésotrophes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *24.44 Végétation des rivières eutrophes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.5 Tourbières de transition* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | 4 | 2007 - 2009 |
| | *44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *22.4311 Tapis de Nénuphars* | | Informateur : CBN-FC | 3 | 2009 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *24.12 Zone à Truites* | | | 1 | |
| | *44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères* | | | 7 | |
| | *22.441 Tapis de Chara* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | 53 | 2008 - 2009 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | 1 | 2008 - 2009 |
| | *42.215 Pessières de stations froides* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | *22.13 Eaux eutrophes* | | | | |
| | *22.14 Eaux dystrophes* | | | | |
| | *22.4 Végétations aquatiques* | | | | |
| | *54.5 Tourbières de transition* | | | 2 | 2004 - 2008 |
| | *54.4 Bas-marais acides* | | | 1 | |
| | *51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles* | | Informateur : Communauté de communes Frasne-Drugeon | | 2004 - 2004 |
| | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | | Informateur : Communauté de communes Frasne-Drugeon | | 2004 - 2004 |
| | *34.42 Lisières mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.2152 Cariçaies à Carex cespitosa* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | *41.13 Hêtraies neutrophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses* | | Informateur : Communauté de communes Frasne-Drugeon | | 2004 - 2004 |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | 9 | 2007 - 2009 |
| | *54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *31.88 Fruticées à Genévriers communs* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *22.4311 Tapis de Nénuphars* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *22.45 Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | *54.541 Pelouses à Carex limosa des bourbiers et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | *54.56 Pelouses à Carex heleonastes* | | Informateur : Communauté de communes Frasne-Drugeon | | 2004 - 2004 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : Communauté de communes Frasne-Drugeon | | 2004 - 2004 |
| | *54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) | | | 4 | |
| | 22.4 Végétations aquatiques | | | 3 | |
| | 54.5 Tourbières de transition | | | | 2009 - 2009 |
| | 51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 22.411 Couvertures de Lemnacées | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 22.441 Tapis de Chara | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 22.4311 Tapis de Nénuphars | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 22.442 Tapis de Nitella | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 22.45 Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 34.322B Mesobromion du Jura français | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 37.311 Prairies à Molinie sur calcaires | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2152 Cariçaies à Carex cespitosa | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *22.4314 Tapis de Potamot flottant* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.56 Pelouses à Carex heleonastes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.422 Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.541 Pelouses à Carex limosa des bourbiers et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.55 Pelouses à Carex chordorrhiza* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.5 Tourbières de transition* | | | | |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *51.1134 Buttes à buissons de Vaccinium* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.414 Colonies d'Utriculaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.5 Tourbières de transition* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.311 Prairies à Molinie sur calcaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *41.13 Hêtraies neutrophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.23 Tourbières basses à Carex davalliana* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.5 Tourbières de transition* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *42.4 Forêts de Pins de montagne* | | | | |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *51.1134 Buttes à buissons de Vaccinium* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et Mousses brunes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.4314 Tapis de Potamot flottant* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.422 Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | | Informateur : CBN-FC | 1 | 2008 - 2008 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42.4 Forêts de Pins de montagne | | | 14 | |
| | 44.9112 Bois d'Aulnes marécageux à laîche allongée | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 54.55 Pelouses à Carex chordorrhiza | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 54.23 Tourbières basses à Carex davalliana | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 51.1134 Buttes à buissons de Vaccinium | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 54.512 Pelouses à Carex lasiocarpa et Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 44.91 Bois marécageux d'Aulnes | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 34.322B Mesobromion du Jura français | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 37.311 Prairies à Molinie sur calcaires | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | 51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 41.13 Hêtraies neutrophiles | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | 34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *22.433 Groupements oligotrophes de Potamots* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *22.45 Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *34.42 Lisières mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *31.88 Fruticées à Genévriers communs* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *22.4311 Tapis de Nénuphars* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *31.88 Fruticées à Genévriers communs* | | | | |
| | *34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *41.131 Hêtraies à Mélique* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *42.1 Sapinières* | | | | |
| | *42.4 Forêts de Pins de montagne* | | | | |
| | *81.1 Prairies sèches améliorées* | | | | |
| | *44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.147 Communautés de Prêles d'eau* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.1 Eaux douces* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *31.872 Clairières à couvert arbustif* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.1 Roselières | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.143 Communautés à Rubanier rameux | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.13 Typhaies | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 31.872 Clairières à couvert arbustif | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.92 Saussaies marécageuses | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.111 Phragmitaies inondées | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2151 Cariçaies à Carex elata | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.149 Végétation à Hippuris vulgaris | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 22.422 Groupements de petits Potamots | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 42 Forêts de conifères | | | | |
| | 22.13 Eaux eutrophes | | Informateur : CBN-FC | | 2010 - 2010 |
| | 41.131 Hêtraies à Mélique | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | 2007 - 2009 |
| | 83.31 Plantations de conifères | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53.12 Scirpaies lacustres | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.13 Typhaies | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 22.1 Eaux douces | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.147 Communautés de Prêles d'eau | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 54 Bas-marais, tourbières de transition et sources | | | | |
| | 31.872 Clairières à couvert arbustif | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 81 Prairies améliorées | | | | |
| | 41.131 Hêtraies à Mélique | | | | 2008 - 2009 |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : CBN-FC | 4 | 2007 - 2009 |
| | 83.31 Plantations de conifères | | | 2 | |
| | 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées | | Informateur : CBN-FC | 1 | 2007 - 2009 |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | | 1 | 2007 - 2007 |
| | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | 1 | |
| | 81.1 Prairies sèches améliorées | | | | |
| | 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 22.1 Eaux douces | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.872 Clairières à couvert arbustif | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.2151 Cariçaies à Carex elata | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 53.217 Cariçaies à Carex appropinquata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2008 |
| | 22.4314 Tapis de Potamot flottant | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 24.1 Lits des rivières | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 42 Forêts de conifères | | | 23 | |
| | 35 Pelouses silicicoles sèches | | | | |
| | 37.3 Prairies humides oligotrophes | | | | |
| | 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides | | | | |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | |
| | 84.2 Bordures de haies | | | | |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | | | |
| | 51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles | | | | |
| | 53.1 Roselières | | | | |
| | 84.3 Petits bois, bosquets | | | | |
| | 44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais | | | | |
| | 83.31 Plantations de conifères | | | | |
| | 53.2 Communautés à grandes Laîches | | | | |
| | 44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *24.12 Zone à Truites* | | | | |
| | *37.2 Prairies humides eutrophes* | | | | |
| | *34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles* | | | | |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | | |
| | *54.4 Bas-marais acides* | | | | |
| | *54.5 Tourbières de transition* | | | | |
| | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | | | | |
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | | |
| | *44.1 Formations riveraines de Saules* | | | | |
| | *54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)* | | | | |
| | *41.1 Hêtraies* | | | | |
| | *41.131 Hêtraies à Mélique* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *83.3 Plantations* | | | 2 | |
| | *37.7 Lisières humides à grandes herbes* | | | 1 | |
| | *81.1 Prairies sèches améliorées* | | | 15 | |
| | *42.1 Sapinières* | | | | |
| | *22.13 Eaux eutrophes* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *44.92 Saussaies marécageuses* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | *44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | *44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes* | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2004 |
| | *53.147 Communautés de Prêles d'eau* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53.217 Cariçaies à Carex appropinquata | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.13 Typhaies | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | 22.4314 Tapis de Potamot flottant | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 22.1 Eaux douces | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2009 |
| | 53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria | | Informateur : CBN-FC | | 2004 - 2007 |
| | 53.2151 Cariçaies à Carex elata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 24.1 Lits des rivières | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 31.872 Clairières à couvert arbustif | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 24.44 Végétation des rivières eutrophes | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : CBN-FC | 16 | 2004 - 2009 |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | | 12 | 2007 - 2009 |
| | 44.1 Formations riveraines de Saules | | | | |
| | 53.5 Jonchaies hautes | | | | |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 22.1 Eaux douces | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 22.13 Eaux eutrophes | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22.422 Groupements de petits Potamots | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 24.1 Lits des rivières | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 24.43 Végétation des rivières mésotrophes | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.92 Saussaies marécageuses | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.111 Phragmitaies inondées | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2151 Cariçaies à Carex elata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.217 Cariçaies à Carex appropinquata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.147 Communautés de Prêles d'eau | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.3 Végétation à Cladium mariscus | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.13 Typhaies | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.12 Scirpaies lacustres | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.143 Communautés à Rubanier rameux | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.216 Cariçaies à Carex paniculata | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 41.131 Hêtraies à Mélique | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53.2151 Cariçaies à Carex elata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.147 Communautés de Prêles d'eau | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.111 Phragmitaies inondées | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.12 Scirpaies lacustres | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 22.1 Eaux douces | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 24.1 Lits des rivières | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 22.1 Eaux douces | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.147 Communautés de Prêles d'eau | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.12 Scirpaies lacustres | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 24.1 Lits des rivières | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 24.44 Végétation des rivières eutrophes | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2151 Cariçaies à Carex elata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.24 Prairies à Agropyre et Rumex* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.2141 Cariçaies à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.2121 Cariçaies à laîche aiguë* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.217 Cariçaies à Carex appropinquata* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.16 Végétation à Phalaris arundinacea* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *53.111 Phragmitaies inondées* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.143 Communautés à Rubanier rameux* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.13 Typhaies* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.4 Végétations aquatiques* | | | 5 | |
| | *54.4 Bas-marais acides* | | | | |
| | *22.1 Eaux douces* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *24.1 Lits des rivières* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.216 Cariçaies à Carex paniculata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.143 Communautés à Rubanier rameux* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.111 Phragmitaies inondées* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.2121 Cariçaies à laîche aiguë* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.217 Cariçaies à Carex appropinquata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *38.3 Prairies de fauche de montagne* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.2141 Cariçaies à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | 1 | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.111 Phragmitaies inondées* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.13 Typhaies* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.147 Communautés de Prêles d'eau* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.2141 Cariçaies à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *53.3 Végétation à Cladium mariscus* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *41.131 Hêtraies à Mélique* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *37.24 Prairies à Agropyre et Rumex* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *53.2151 Cariçaies à Carex elata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.217 Cariçaies à Carex appropinquata* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *22.4314 Tapis de Potamot flottant* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *24.1 Lits des rivières* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | 3 | 2007 - 2009 |
| | *22.1 Eaux douces* | | Informateur : CBNFC | | 2008 - 2009 |
| | *41.131 Hêtraies à Mélique* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | | 3 | |
| | *37.7 Lisières humides à grandes herbes* | | | 1 | |
| | *37.8 Mégaphorbiaies alpines et subalpines* | | | 1 | |
| | *44.1 Formations riveraines de Saules* | | | 1 | |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | 10 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.2141 Cariçaies à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.111 Phragmitaies inondées* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *44.91 Bois marécageux d'Aulnes* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *53.143 Communautés à Rubanier rameux* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.147 Communautés de Prêles d'eau* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | *24.44 Végétation des rivières eutrophes* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.2151 Cariçaies à Carex elata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.217 Cariçaies à Carex appropinquata* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | *53.16 Végétation à Phalaris arundinacea* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | *53.2121 Cariçaies à laîche aiguë* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | *53.12 Scirpaies lacustres* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *22.4314 Tapis de Potamot flottant* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *22.1 Eaux douces* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *24.1 Lits des rivières* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *24.4 Végétation immergée des rivières* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.442 Tapis de Nitella* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.13 Eaux eutrophes* | | | 4 | |
| | *81.1 Prairies sèches améliorées* | | | 8 | |
| | *44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères* | | | 7 | |
| | *38.3 Prairies de fauche de montagne* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.111 Phragmitaies inondées* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.12 Scirpaies lacustres* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.13 Typhaies* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.14 Roselières basses* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | *53.2151 Cariçaies à Carex elata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.2141 Cariçaies à Carex rostrata* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.147 Communautés de Prêles d'eau* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.16 Végétation à Phalaris arundinacea* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.411 Couvertures de Lemnacées* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *24.1 Lits des rivières* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *37.24 Prairies à Agropyre et Rumex* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *53.2121 Cariçaies à laîche aiguë* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *22.4314 Tapis de Potamot flottant* | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | *41.131 Hêtraies à Mélique* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | *53.2121 Cariçaies à laîche aiguë* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *22.1 Eaux douces* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes* | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | *53.2151 Cariçaies à Carex elata* | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : CBN-FC | 11 | 2007 - 2009 |
| | *38.3 Prairies de fauche de montagne* | | Informateur : CBN-FC | 55 | 2007 - 2009 |
| | *83.31 Plantations de conifères* | | | | |
| | *44.1 Formations riveraines de Saules* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22.1 Eaux douces | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 22.4314 Tapis de Potamot flottant | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 31.872 Clairières à couvert arbustif | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 41.131 Hêtraies à Mélique | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.111 Phragmitaies inondées | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2151 Cariçaies à Carex elata | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.217 Cariçaies à Carex appropinquata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.147 Communautés de Prêles d'eau | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 42 Forêts de conifères | | | | |
| | 44.91 Bois marécageux d'Aulnes | | Informateur : CBNFC | | 2009 - 2009 |
| | 35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés | | Informateur : CBNFC | | 2009 - 2009 |
| | 84.3 Petits bois, bosquets | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |
| | 83.3111 Plantations de Sapins, d'Epicéas et de Mélèzes européens | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2009 |
| | 86 Villes, villages et sites industriels | | Informateur : CBNFC | | 2009 - 2009 |
| | 41.131 Hêtraies à Mélique | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2009 |
| | 42.1 Sapinières | | | | |
| | 44.1 Formations riveraines de Saules | | | | |
| | 22.1 Eaux douces | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 24.42 Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.13 Typhaies | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2151 Cariçaies à Carex elata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes | | Informateur : CBN-FC | | 2008 - 2008 |
| | 53.12 Scirpaies lacustres | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 22.4315 Tapis de Renouées | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 24.1 Lits des rivières | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 38.3 Prairies de fauche de montagne | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 41.13 Hêtraies neutrophiles | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.14A Végétation à Eleocharis palustris | | Informateur : CBN-FC | | 2009 - 2009 |
| | 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 53.143 Communautés à Rubanier rameux | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 44.92 Saussaies marécageuses | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2007 |
| | 53.147 Communautés de Prêles d'eau | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : CBN-FC | | 2007 - 2009 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *84.3 Petits bois, bosquets* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2009 |
| | *86 Villes, villages et sites industriels* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2009 |
| | *86.42 Terrils crassiers et autres tas de détritus* | | Informateur : CBNFC | | 2009 - 2009 |
| | *31.872 Clairières à couvert arbustif* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2009 |
| | *31.8F Fourrés mixtes* | | Informateur : CBNFC | | 2008 - 2009 |
| | *34.111 Pelouses à orpins* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2008 |
| | *53.111 Phragmitaies inondées* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2009 |
| | *83.3111 Plantations de Sapins, d'Epicéas et de Mélèzes européens* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2009 |
| | *84.1 Alignements d'arbres* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |
| | *84.2 Bordures de haies* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2009 |
| | *87.2 Zones rudérales* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |
| | *22.422 Groupements de petits Potamots* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |
| | *31.8111 Fruticées subatlantiques Prunus spinosa et Rubus fruticosus* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |
| | *22.42 Végétations enracinées immergées* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |
| | *22.421 Groupements de grands Potamots* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2007 |
| | *31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes* | | Informateur : CBNFC | | 2007 - 2009 |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.2 Villages* | | | | |
| | *42 Forêts de conifères* | | | | |
| | *38 Prairies mésophiles* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42<br>Forêts de conifères | | | | |
| | 81<br>Prairies améliorées | | | | |
| | 37<br>Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| | 5<br>Tourbières et marais | | | | |
| | 81<br>Prairies améliorées | | | | |
| | 22<br>Eaux douces stagnantes | | | | |
| | 37<br>Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| | 5<br>Tourbières et marais | | | | |
| | 38<br>Prairies mésophiles | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 38<br>Prairies mésophiles | | | | |
| | 42<br>Forêts de conifères | | | | |
| | 41<br>Forêts caducifoliées | | | | |
| | 22<br>Eaux douces stagnantes | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 5<br>Tourbières et marais | | | | |
| | 42<br>Forêts de conifères | | | | |
| | 81<br>Prairies améliorées | | | | |
| | 22<br>Eaux douces stagnantes | | | | |
| | 37<br>Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 5<br>Tourbières et marais | | | | |
| | 42<br>Forêts de conifères | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37<br>Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 5<br>Tourbières et marais | | | | |
| | 38<br>Prairies mésophiles | | | | |
| | 81<br>Prairies améliorées | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 5<br>Tourbières et marais | | | | |
| | 38<br>Prairies mésophiles | | | | |
| | 42<br>Forêts de conifères | | | | |
| | 81<br>Prairies améliorées | | | | |
| | 37<br>Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| | 37<br>Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 5<br>Tourbières et marais | | | | |
| | 38<br>Prairies mésophiles | | | | |
| | 81.1<br>Prairies sèches améliorées | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 38<br>Prairies mésophiles | | | | |
| | 42<br>Forêts de conifères | | | | |
| | 37<br>Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| | 44.A<br>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères | | | | |
| | 5<br>Tourbières et marais | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38 Prairies mésophiles* | | | | |
| | *37 Prairies humides et mégaphorbiaies* | | | | |
| | *86.2 Villages* | | | | |
| | *5 Tourbières et marais* | | | | |
| | *5 Tourbières et marais* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

54 = 545

31.872 = Senecioni fuchsii - Sambucetum racemosae

34.322B (d) = Gentiano vernae - Brometum erecti

34.322B (d) = Ranunculo montani - Agrostietum capillaris

34.322B (d) = Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti

34.4 ? = Ourlet mesophile à Brachypodium pinnatum et euphorbia cypaisias

37.1 (d) = Aconito napelli - Filependuletum ulmariae polemonietosum

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis fritillarietosum

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis potentilletosum erecti

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis

37.24 = Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati

37.24 = Junco inflexi - Menthetum longifoliae

37.311 (d) = Trollio europai - Molinietum caeruleae swertietosum perennis

37.311 (d) = Trollio europai - Molinietum caeruleae holcetosum lanati

38.1 = Alchemillo monticolae - cynosuretum cristati

38.1 = Lolio perennis - Plantaginetum majoris

38.1 = Gentiano luteae - Cynosuretum cristati

38.3 = Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis brometosum mollis

38.3 = Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis typicum

41.131 = Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae

44.923 = Salicetum pentandro - cinereae

53.14 (d) = Glycerietum fluitantis

54.147 = Equisetetum fluviatilis

53.2121 = Caricetum gracilis

53.2141 = Caricetum rostratae

54.52 (d) = Caricetum diandrae

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 267 | *Bufo calamita Laurenti, 1768* | *Crapaud calamite* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | *Triton crêté* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Autres | 109650 | *Nigritella nigra* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Bryophytes | 5755 | *Bryum neodamense Itzigs.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5472 | *Calliergon trifarium (F.Weber & D.Mohr) Kindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4913 | *Cinclidium stygium Sw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5787 | *Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.* | *Hypne brillante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5680 | *Splachnum ampullaceum Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 53926 | *Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)* | *Nacré de la Canneberge (Le), Nacré des tourbières (Le), Vanesse aquilon (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mady M. | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53938 | *Clossiana selene (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 1999 - 1999 |
| | 53663 | *Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)* | *Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L'), Semi-Procris (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 1999 - 1999 |
| | 53631 | *Coenonympha tullia (O.F. Müller, 1764)* | *Fadet des tourbières (Le), Daphnis (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 54400 | *Colias palaeno (Linnaeus, 1760)* | *Solitaire (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | *Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Franzoni A. | | | | 2010 |
| | 53976 | *Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Cuivré de la Bistorte (Le), Cuivre violacé (Le), Lycène hellé (Le), Argus Violet (Le), Argus myope violet (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2006 - 2008 |
| | 219753 | *Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré écarlate (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 54085 | *Maculinea arion (Linnaeus, 1758)* | *Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 199775 | *Maculinea rebeli (Hirschke, 1904)* | *Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 54001 | *Paleochrysophanus hippothoe (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré écarlate (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65446 | *Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)* | *Grande Aeschne (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65425 | *Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)* | *Aeschne des joncs* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65434 | *Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922* | *Aeschne subarctique (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65151 | *Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)* | *Agrion à fer de lance, Agrion hasté (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | *Agrion de Mercure* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 65145 | *Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)* | *Agrion joli* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65401 | *Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807)* | *Cordulégastre annelé (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65366 | *Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)* | *Leucorrhine à front blanc (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Franzoni A. | | | | 2010 |
| | 65352 | *Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)* | *Leucorrhine douteuse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65356 | *Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)* | *Leucorrhine à gros thorax (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65290 | *Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)* | *Orthétrum brun (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65284 | *Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)* | *Orthétrum bleuissant (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65397 | *Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)* | *Cordulie arctique (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65395 | *Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie à taches jaunes (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65393 | *Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie métallique (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65312 | *Sympetrum danae (Sulzer, 1776)* | *Sympétrum noir (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 2008 |
| | 65327 | *Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)* | *Sympétrum jaune d'or (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3533 | *Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)* | *Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2636 | *Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831* | *Aigle pomarin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3525 | *Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)* | *Hibou des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2943 | *Bonasia bonasia (Linnaeus, 1758)* | *Gélinotte des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4616 | *Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)* | *Roselin cramoisi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3053 | *Crex crex (Linnaeus, 1758)* | *Râle des genêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Michelat D. | | | | 2000 - 2007 |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | *Pic noir* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | *Bécassine des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Communauté de communes Frasne-Drugeon | | | | 1996 - 2010 |
| | 3814 | *Lanius excubitor Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche grise* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Gendry J. | | 2 | | 2006 - 2013 |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | *Courlis cendré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Michelat D. | | | | 1994 - 2009 |
| | 3039 | *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)* | *Marouette ponctuée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Tissot B. | | | | 1994 - 1999 |
| Phanérogames | 85897 | *Betula nana L., 1753* | *Bouleau nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87245 | *Calamagrostis lanceolata Roth, 1788* | *Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159574 | *Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799* | *Calamagrostide négligée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87450 | *Calla palustris L., 1753* | *Calla des marais, Arum d'eau, Choucelle, Anguine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88420 | *Carex cespitosa L., 1753* | *Carex en touffe, Laîche en touffe, Laîche gazonnante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88426 | *Carex chordorrhiza L.f., 1782* | *Laîche à longs rhizomes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88562 | *Carex heleonastes Ehrh. ex L.f., 1782* | *Étoile des marais, Laîche des marais, Laîche des tourbières* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88632 | *Carex limosa L., 1753* | *Laîche des tourbières, Laîche des vases, Laîche des bourbiers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89316 | *Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812* | *Catabrose aquatique, Canche aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91199 | *Cicuta virosa L., 1753* | *Cigüe aquatique, Ciguë vénéneuse, Cigüe vireuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91267 | *Circaea x intermedia Ehrh., 1789* | *Circée intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92421 | *Corallorhiza trifida Châtel., 1760* | *Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94833 | *Dianthus superbus L., 1755* | *Oeillet magnifique, Oeillet à plumet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95439 | *Drosera longifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles longues, Droséra à longues feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95445 | *Drosera x obovata Mert. & W.D.J.Koch, 1826* | *Droséra à feuilles obovales* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95927 | *Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949* | *Scirpe pauciflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96851 | *Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806* | *Linaigrette grêle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | *Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99185 | *Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809* | *Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99922 | *Gentiana pneumonanthe L., 1753* | *Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100114 | *Geranium palustre L., 1756* | *Géranium des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100551 | *Goodyera repens (L.) R.Br., 1813* | *Goodyère rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101315 | *Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813* | *Orchis musc, Herminium à un seul tubercule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103027 | *Hottonia palustris L., 1753* | *Hottonie des marais, Millefeuille aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103324 | *Hypericum richeri Vill., 1779* | *Millepertuis de Richer* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105199 | *Lathyrus heterophyllus L., 1753* | *Gesse à feuilles différentes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105214 | *Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971* | *Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106353 | *Liparis loeselii (L.) Rich., 1817* | *Liparis de Loesel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111008 | *Orchis traunsteineri Saut., 1837* | *Orchis de Traunsteiner* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114480 | *Polemonium caeruleum L., 1753* | *Valériane grecque, Polemoine bleue, Polémoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115258 | *Potamogeton gramineus L., 1753* | *Potamot à feuilles de graminée, Potamot graminée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115286 | *Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823* | *Potamot à feuilles obtuses* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115384 | *Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth, 1827* | *Potamot de Ziz* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117096 | *Ranunculus lingua L., 1753* | *Grande douve, Renoncule Langue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119447 | *Rumex aquaticus L., 1753* | *Grande Parelle, Parelle, Patience aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121065 | *Saxifraga granulata L., 1753* | *Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121076 | *Saxifraga hirculus L., 1753* | *Saxifrage œil-de-bouc, Faux Ciste, Saxifrage à fleurs jaunes, Saxifrage dorée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121500 | *Scheuchzeria palustris L., 1753* | *Scheuchzérie des tourbières, Scheuchzérie des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122722 | *Senecio spathulifolius (C.C.Gmel.) Griess.* | *Séneçon à feuilles spatulées, Séneçon helenitis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124410 | *Sparganium minimum Wallr., 1840* | *Rubanier nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125024 | *Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Stellaire des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126034 | *Teucrium scordium L., 1753* | *Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127547 | *Triglochin palustris L., 1753* | *Troscart des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128311 | *Utricularia intermedia Hayne, 1800* | *Utriculaire intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | *Brochet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 67778 | *Salmo trutta fario Linnaeus, 1758* | *Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 95561 | *Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéris à crêtes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95589 | *Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce, 1908* | *Fougère à pennes espacées, Fougère espacée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96553 | *Equisetum variegatum Schleich., 1797* | *Prêle panachée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107012 | *Lycopodium inundatum L., 1753* | *Lycopode des tourbières, Lycopode inondé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115082 | *Polystichum thelypteris (L.) Roth, 1799* | *Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reptiles | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | *Vipère péliade* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 197 | *Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)* | *Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 318 | *Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758* | *Grenouille commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | *Grenouille rousse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121 | *Triturus alpestris (Laurenti, 1768)* | *Triton alpestre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 155 | *Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 179 | *Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)* | *Triton ponctué* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ascomycètes | 45800 | *Calycella citrina (Batsch ex Fr.) Boudier* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 46194 | *Cheilymenia crucipila (Cooke & Phill.) LeGal* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 46475 | *Cordyceps capitata (Holmskj. ex Fr.) Link* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 46489 | *Cordyceps ophioglossoides (Ehrh. ex Fr.) Link* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 46657 | *Cudonia circinans (Pers. ex Fr.) Fr.* | *Cudonie en cercles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 47272 | *Elaphomyces granulatus Fr. ex Fr.* | *Truffe des cerfs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 48407 | *Leotia lubrica (Scopoli ex Fr.) Pers.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 48683 | *Morchella elata Pers. ex Fr., non sensu Marchand* | *Morille élevée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 49258 | *Peziza subisabellina LeGal* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 49267 | *Peziza succosa Berkeley, non sensu Schröter* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 49505 | *Pseudoplectania nigrella (Pers. ex Fr.) Fuckel* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 49513 | *Pseudoplectania vogesiaca (Pers.) Seaver* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 49552 | *Psilopezia babingtonii (Berkeley & Br.) Berkeley* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 49638 | *Rhizina undulata Fr. ex Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 48747 | *Sclerotinia duriaeana (Tulasne & Tulasne) Rehm* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 49863 | *Scutellinia scutellata (L. ex Fr.) Lambotte* | *Pézize en bouclier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 49870 | *Scutellinia trechispora (Berkeley & Br.) Lambotte* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 50101 | *Trichoglossum hirsutum (Pers. ex Fr.) Boudier* | *Trichoglosse hirsute* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 50131 | *Trichophaea gregaria (Rehm) Boud., non (Dana)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 50134 | *Trichophaea hemisphaerioides (Mouton) Graddon, 1960* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres | 39336 | *Lactarius impolitus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 39487 | *Lactarius theiogalus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Basidiomycètes | 39040 | *Amanita fulva (J.C. Sch. ?) Fr.* | *Amanite fauve* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39079 | *Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck* | *Amanite tue-mouches, fausse oronge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39128 | *Amanita rubescens (Pers. : Fr.) Pers.* | *Amanite rougissante, Oronge vineuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39155 | *Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittadini* | *Grisette, Coulemelle, Amanite vaginee* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39179 | *Amanita virosa Lamarck* | *Amanite vireuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31683 | *Armillariella mellea (Vahl : Fr.) P. Karsten* | *Armillaire couleur de miel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30538 | *Baeospora myosura (Fr. : Fr.) Singer* | *Collybie queue de souris* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 41622 | *Bjerkandera adusta (Willdenow : Fr.) P. Karsten* | *Tramète brûlée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29388 | *Boletus edulis Bull. : Fr.* | *Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29418 | *Boletus luridus J.C. Sch. : Fr.* | *Bolet blafard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 41755 | *Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.* | *Calocère visqueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29904 | *Cantharellus cibarius Fr. : Fr.* | *Girolle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29925 | *Cantharellus lutescens (Pers. : Fr.) Fr.* | *Chanterelle jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29932 | *Cantharellus tubiformis (Fr. ex Fr.) Fr., sensu Cooke, non Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29848 | *Chroogomphus rutilus (J.C. Sch. : Fr.) O.K. Miller* | *Gomphide visqueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40838 | *Clavaria argillacea Pers. : Fr.* | *Clavaire argilacée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40900 | *Clavaria cinerea Bull. : Fr.* | *Clavaire cendrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40912 | *Clavulina rugosa (Bull. : Fr.) J. Schröter* | *Clavaire rugueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30887 | *Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Kummer* | *Tête de moine, Clitocybe à pied en massue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 509707 | *Clitocybe dicolor (Fr.) J.E. Lange* | *Clitocybe bicolore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31720 | *Clitocybe ditopa (Fr. : Fr.) Gillet* | *Clitocybe farineux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31758 | *Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) Kummer* | *Clitocybe en entonnoir* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31916 | *Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kummer* | *Clitocybe odorant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30585 | *Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kummer* | *Collybie beurrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30606 | *Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30654 | *Collybia maculata (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer* | *Collybie maculée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36873 | *Conocybe rickenii (J. Schäffer) Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 44913 | *Coriolus versicolor (L. : Fr.) Quélet* | *Tramète versicolore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31139 | *Cortinarius acutus (Pers. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34624 | *Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34691 | *Cortinarius armillatus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Cortinaire voilé à collier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34151 | *Cortinarius brunneus (Pers. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34711 | *Cortinarius collinitus sensu J.E. Lange* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34796 | *Cortinarius decipiens sensu R. Henry, Kühner & Romagn.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34808 | *Cortinarius delibutus Fr.* | *Cortinaire pommadé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34904 | *Cortinarius evernius (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34931 | *Cortinarius flexipes (Pers. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34976 | *Cortinarius gentilis (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35019 | *Cortinarius hemitrichus (Pers. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35113 | *Cortinarius laniger Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35138 | *Cortinarius limonius (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35220 | *Cortinarius mucosus (Bull. : Fr.) Kickx* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35267 | *Cortinarius obtusus (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35284 | *Cortinarius odorifer Britzelmayr* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35329 | *Cortinarius paleaceus (Weinmann) Fr.* | *Cortinaire pailleté* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35365 | *Cortinarius pektinocephalus* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35367 | *Cortinarius percomis Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35387 | *Cortinarius pholideus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Cortinaire écailleux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35500 | *Cortinarius raphanoides (Pers. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35587 | *Cortinarius scaurus (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35633 | *Cortinarius speciosissimus Kühner & Romagn. ex Kühner & Romagn.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35661 | *Cortinarius striaepilus J. Favre* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35718 | *Cortinarius subtortus (Pers. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35763 | *Cortinarius trivialis J.E. Lange ex J.E. Lange* | *Cortinaire trivial* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35561 | *Cortinarius validus J. Favre* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29937 | *Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers.* | *Trompette des morts* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38156 | *Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod* | *Cystoderme furfuracé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38165 | *Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38170 | *Cystoderma granulosum (Batsch : Fr.) Fayod* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42189 | *Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J. Schröter* | *Tramète rougissante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42194 | *Daedaleopsis tricolor (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer* | *Lenzite tricolore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34459 | *Dermocybe cinnamomeolutea (P.D. Orton) Moser* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34753 | *Dermocybe crocea (Schaeffer ex Fr.) Moser, non sensu Schaeffer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34468 | *Dermocybe croceifolia (Peck) Moser* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35338 | *Dermocybe palustris (Moser) Moser* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 35568 | *Dermocybe sanguinea (Wulfen : Fr.) Wünsche* | *Cortinaire sanguin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35606 | *Dermocybe semisanguinea (Fr. : Fr.) Moser ex Moser* | *Cortinaire à demi sanguin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35639 | *Dermocybe sphagnogena Moser ex Moser* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35784 | *Dermocybe uliginosa (Berk.) P. Karsten* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33652 | *Entoloma helodes (Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33693 | *Entoloma jubatum (Fr. : Fr.) P. Karsten* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33947 | *Entoloma sericatum (Britzelmayr) Sacc.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33976 | *Entoloma sphagneti Naveau* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36023 | *Galerina paludosa (Fr.) Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36057 | *Galerina sphagnorum (Pers. : Fr.) Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36075 | *Galerina tibicystis (Atkinson) Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42549 | *Ganoderma applanatum (Pers.) Patouillard* | *Ganoderme plat* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40377 | *Geastrum sessile (Sow.) Pouzar* | *Géastre sessile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42603 | *Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karsten* | *Lenzite du sapin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42607 | *Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki* | *Polypore anisé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 42614 | *Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P.Karst.* | *Lenzite des clôtures* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 29858 | *Gomphidius glutinosus (J.C. Sch. : Fr.) Fr.* | *Gomphide glutineux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36117 | *Hebeloma longicaudum* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 36191 | *Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gillet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42721 | *Heterobasidion annosum (Fr. : Fr.) Brefeld* | *Polypore du rond des pins* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 45027 | *Hirschioporus abietinus (Dicks. : Fr.) Donk* | *Tramète lilas* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42771 | *Hydnellum peckii Banker* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42792 | *Hydnum repandum L. : Fr.* | *Pied de mouton* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42796 | *Hydnum rufescens Pers. : Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30333 | *Hygrocybe turunda (Fr. : Fr.) P. Karsten* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30345 | *Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30392 | *Hygrophorus erubescens (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30406 | *Hygrophorus hypothejus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Hygrophore à lames jaune soufre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30452 | *Hygrophorus olivaceoalbus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Hygrophore olivacé et blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30487 | *Hygrophorus pustulatus (Pers. : Fr.) Fr.* | *Hycrophore pustuleux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42809 | *Hymenochaete mougeotii (Fr. : Fr.) Cooke* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36234 | *Inocybe appendiculata Kühner ex Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36241 | *Inocybe asterospora Quélet* | *Inocybe à spore étoilée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36263 | *Inocybe calamistrata (Fr. : Fr.) Gillet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36276 | *Inocybe cincinnata (Fr. : Fr.) Quélet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36309 | *Inocybe fastigiata (J.C. Sch. : Fr.) Quélet* | *Inocybe fastigié* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36317 | *Inocybe fibrosa (Sow.) Gillet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 36338 | *Inocybe geophylla (Sow. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36443 | *Inocybe napipes J.E. Lange* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36411 | *Inocybe ovatocystis Boursier & Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36467 | *Inocybe pallida Velenovsky* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32178 | *Laccaria amethystina (Hudson ? Kummer) Cooke* | *Laque améthyste* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32192 | *Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke* | *Clitocybe laqué* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32204 | *Laccaria proxima (Boudier) Patouillard* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39261 | *Lactarius camphoratus (Bull. : Fr.) Fr.* | *Lactaire à odeur de chicorée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39289 | *Lactarius deterrimus Gröger* | *Lactaire de l'épicéa* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39224 | *Lactarius glutinopallens F.H. Møller & J.E. Lange* | *Lactaire glutineux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39317 | *Lactarius glycyosmus (Fr. ex Fr.) Fr., sensu Lange, non Fr.* | *Lactaire à odeur de noix de coco* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39321 | *Lactarius helvus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire à odeur de céleri* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39395 | *Lactarius necator (Bull. : Fr.) Pers.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39385 | *Lactarius picinus Fr.* | *Lactaire enfumé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39404 | *Lactarius pubescens (Schrad. ?) Fr.* | *Lactaire pubescent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39437 | *Lactarius rufus (Scop. : Fr.) Fr.* | *Lactaire roux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39445 | *Lactarius salmonicolor Heim & Leclair* | *Lactaire saumon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39454 | *Lactarius scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr.* | *Lactaire à fossettes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39459 | *Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoff ex Gröger* | *Lactaire des sphaignes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 39478 | *Lactarius tabidus Fr.* | *Lactaire chiffonné* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39489 | *Lactarius torminosus (J.C. Sch. : Fr.) Pers.* | *Lactaire à toison* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39491 | *Lactarius trivialis (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire trivial* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39494 | *Lactarius uvidus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire humide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39504 | *Lactarius vietus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire fané* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29545 | *Leccinum aurantiacum (Bull.) S.F. Gray* | *Bolet orangé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29583 | *Leccinum holopus (Rostkovius) Watling* | *Bolet blanc des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 514416 | *Leccinum niveum (Fr.) Rauschert* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 29628 | *Leccinum scabrum (Bull. : Fr.) S.F. Gray* | *Bolet rude* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38310 | *Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) Kummer* | *Lépiote en bouclier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32272 | *Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harmaja* | *Clitocybe nébuleux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32276 | *Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke* | *Pied bleu, Tout-bleu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39199 | *Limacella guttata (Pers. : Fr.) Konrad & Maublanc* | *Limacelle tachée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40525 | *Lycoperdon echinatum Pers. : Pers.* | *Vesse de loup hérisson* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40561 | *Lycoperdon perlatum Pers. : Pers.* | *Vesse de loup perlée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40565 | *Lycoperdon pyriforme J.C. Sch. : Pers.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40569 | *Lycoperdon umbrinum Pers. : Pers.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30810 | *Lyophyllum georgii (Clus.) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33014 | *Lyophyllum palustre (Peck) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30959 | *Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30980 | *Marasmius androsaceus (L. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31052 | *Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr.* | *Marasme petite roue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31092 | *Micromphale perforans (Hoffm. : Fr.) S.F. Gray* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31102 | *Mycena acicula (J.C. Sch.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31249 | *Mycena epipterygia (Scop. : Fr.) S.F. Gray* | *Mycène des fougères* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31292 | *Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F. Gray* | *Mycène casquée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31409 | *Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer* | *Mycène pure* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31458 | *Mycena rosella (Fr. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31468 | *Mycena sanguinolenta (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer* | *Mycène sanguinolent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31552 | *Mycena vulgaris (Pers. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32784 | *Omphalina oniscus (Fr. : Fr.) Quélet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32808 | *Omphalina sphagnicola (Berk.) Moser* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29879 | *Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr.* | *Paxille enroulé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38812 | *Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod* | *Plutée couleur de cerf* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38862 | *Pluteus luteomarginatus Rolland* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38868 | *Pluteus nanus (Pers : Fr.) Kummer* | *Plutée nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29660 | *Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.-J. Gilbert* | *Bolet porphyre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31847 | *Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelhuber* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36627 | *Rozites caperatus (Pers. : Fr.) P. Karsten* | *Pholiote ridée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39536 | *Russula adulterina (Fr.) Peck* | *Russule bâtarde* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39545 | *Russula aeruginea Lindblad* | *Russule verdâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39548 | *Russula albonigra (Krombholz) Fr.* | *Russule blanche et noire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39595 | *Russula aquosa Leclair* | *Russule aqueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39621 | *Russula badia Quélet* | *Russule perfide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39710 | *Russula betularum Hora* | *Russule émétique des bouleaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39642 | *Russula carminea (J. Schäffer) Kühner & Romagn. ex Romagn. (non sensu Romagn.)* | *Russule aqueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39668 | *Russula consobrina (Fr. : Fr.) Fr.* | *Russule bistre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39685 | *Russula decolorans (Fr. : Fr.) Fr.* | *Russule orangée grisonnante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39686 | *Russula delica Fr.* | *Russule faux-lactaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39716 | *Russula emetica f. longipes Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39707 | *Russula emetica (J.C. Sch. : Fr.) Pers.* | *Russule émétique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39805 | *Russula emetica var. griseascens Bon & Gaugué* | *Russule émétique grisonnante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39744 | *Russula firmula J. Schäffer* | *Russule petite pomme* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39665 | *Russula flava Lindblad* | *Russule jaune noircissante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39756 | *Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr.* | *Russule fragile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39982 | *Russula intactior (J. Schäffer) J. Schäffer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39833 | *Russula integra f. purpurella (Singer) Romagn. ex Bon, 1986* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 39924 | *Russula nauseosa (Pers.) Fr.* | *Russule précoce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39939 | *Russula ochroleuca Pers.* | *Russule ocre et blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39962 | *Russula paludosa Britzelmayr* | *Russule des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39981 | *Russula persicina var. intactior (J. Schäffer) Blum ex Bon* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 40000 | *Russula puellaris Fr.* | *Russule fillette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40009 | *Russula queletii Fr.* | *Russule de quélet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40047 | *Russula sanguinea (Bull. ?) Fr.* | *Russule sanguine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40063 | *Russula sphagnophila sensu auct. europ.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40123 | *Russula vinosa Lindblad* | *Russule vineuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40142 | *Russula viscida Kudrna* | *Russule à pied brunissant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40150 | *Russula xerampelina var. erythropoda (Peltereau) Konrad & J. Favre* | *Russule écrevisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29694 | *Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel* | *Bolet des bouviers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29708 | *Suillus flavidus (Fr. : Fr.) Presl* | *Bolet jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29712 | *Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel* | *Bolet granuleux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29755 | *Suillus variegatus (Swartz : Fr.) Richon & Roze* | *Bolet moucheté* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33144 | *Tephrocybe rancida (Fr. : Fr.) Donk* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33200 | *Tricholoma bufonium (Pers. : Fr.) Gillet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33245 | *Tricholoma flavobrunneum (Fr.) Kummer* | *Tricholome brun et jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33267 | *Tricholoma inamoenum (Fr. : Fr.) Gillet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33371 | *Tricholoma sejunctum (Sow. : Fr.) Quélet* | *Jaunet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33423 | *Tricholoma vaccinum (J.C. Sch. : Fr.) Kummer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33429 | *Tricholoma virgatum (Fr. : Fr.) Kummer* | *Tricholome vergeté* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33439 | *Tricholomopsis decora (Fr. : Fr.) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33446 | *Tricholomopsis rutilans (J.C. Sch. : Fr.) Singer* | *Tricholome rutilant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29779 | *Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert* | *Bolet bai* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29783 | *Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quélet* | *Bolet à chair jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29831 | *Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) Quélet* | *Bolet subtomenteux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Bryophytes | 5469 | *Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Kindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5484 | *Campylium elodes (Lindb.) Kindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6587 | *Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4750 | *Dicranum majus Sm.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4965 | *Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6736 | *Sphagnum contortum Schultz* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6751 | *Sphagnum girgensohnii Russow* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6774 | *Sphagnum papillosum Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6785 | *Sphagnum russowii Warnst.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6789 | *Sphagnum squarrosum Crome* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6790 | *Sphagnum subnitens Russow & Warnst.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6795 | *Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6797 | *Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6802 | *Sphagnum warnstorfii Russow* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Coléoptères | 11755 | *Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11758 | *Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12393 | *Amaglyptus mysticus* | *Lepture arlequine* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12476 | *Anaerea carcharias (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12280 | *Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1760)* | *Lepture rouge sang* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10589 | *Aphodius depressus Kugelann, 1792* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8883 | *Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758)* | *Scarabée erratique* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12307 | *Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12346 | *Aromia moschata (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 200397 | *Bolboceras armiger (Scopoli, 1772)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 527207 | *Carilia virginea (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 780069 | *Cetonia cuprea Fabricius, 1775* | *Cétoine cuivrée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12380 | *Clytus arietis (Linnaeus, 1758)* | *Clyte bélier (Le), Clyte guêpe (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10548 | *Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758)* | *Géotrupe du fumier, Bousier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10938 | *Hoplia farinosa Linnaeus, 1761* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12351 | *Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11777 | *Lamia textor (Linnaeus, 1758)* | *Lamie tisserand* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12241 | *Leptura aethiops Poda, 1761* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 802333 | *Leptura fulva De Geer, 1775* | *Lepture fauve* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 802329 | *Leptura rubra Linnaeus, 1758* | *Lepture rouge* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12209 | *Megarhagium sycophanta* | *Rhagie sycophante* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11779 | *Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)* | *Monochame de Provence* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 11781 | *Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)* | *Monochame cordonnier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12505 | *Oberea oculata (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8903 | *Otophorus fossor* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12211 | *Oxymirus cursor Linnaeus, 1758* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12216 | *Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12207 | *Rhagium mordax (De Geer, 1775)* | *Rhagie mordante* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10927 | *Serica brunnea (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12492 | *Stenostola dubia (Laicharting, 1784)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12314 | *Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 200606 | *Trichius zonatus Germar, 1829* | *Trichie du rosier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12203 | *Vesperus strepens (Fabricius, 1792)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Hyménoptères | 52420 | *Abia sericea (Linnaeus, 1767)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52431 | *Ametastegia albipes (C.G. Thomson, 1871)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53081 | *Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)* | *Abeille cotonnière, Anthidie cotonnière* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53084 | *Anthidium strigatum Panzer, 1805* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52441 | *Arge enodis (Linnaeus, 1767)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52976 | *Argogorytes hispanicus (Mercet, 1906)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52977 | *Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52453 | *Athalia circularis (Klug, 1815)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53095 | *Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)* | *Bourdon des jardins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53097 | *Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)* | *Bourdon des pierres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53103 | *Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761)* | *Bourdon grisé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53105 | *Bombus variabilis Schmiedeknecht, 1878* | *Bourdon variable* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52909 | *Clypeocrabro clypeata* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53108 | *Coelioxys quadridentata (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52962 | *Coelocrabro annulipes* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52939 | *Coelocrabro barbipes* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52941 | *Coelocrabro cetratus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52945 | *Coelocrabro walkeri* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52351 | *Corynis obscura (Fabricius, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52946 | *Crossocerus distenguentus (Morawitz, 1866)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52948 | *Crossocerus exiguus (Vander Linden, 1829)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53114 | *Dioxys cincta (Jurine, 1807)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52473 | *Dolerus asper Zaddach, 1859* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52911 | *Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52916 | *Ectemnius dives (Lepeletier & Brullé, 1835)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52919 | *Ectemnius guttatus (Vander Linden, 1829)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52921 | *Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52925 | *Ectemnius ruficornis (Zetterstedt, 1838)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 232214 | *Empria alector Benson, 1938* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52495 | *Empria baltica Condé, 1937* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52498 | *Empria liturata (Gmelin, 1790)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53013 | *Gorytes laticinctus (Lepeletier de Saint Fargeau, 1832)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53118 | *Halictus albipes Fabricius* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53120 | *Halictus calceatus Scopoli* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53125 | *Halictus fulvicornis Ky.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53150 | *Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52915 | *Hypocrabro punctatus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52928 | *Hypocrabro rubicola* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52520 | *Macrophya albicincta (Schrank, 1776)* | *Mouche-à-scie noire à pattes argentées* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53158 | *Megachile circumcincta (Kirby, 1802)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53164 | *Megachile willughbiella (Kirby, 1802)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53020 | *Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52918 | *Metacrabro cephalotes* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52924 | *Metacrabro lituratus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53175 | *Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53176 | *Osmia cornuta (Latreille, 1805)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53177 | *Osmia diformis* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53180 | *Osmia fulviventris (Panzer, 1798)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 240065 | *Osmia leaiana (Kirby, 1802)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53185 | *Osmia rufa (Linnaeus, 1758)* | *Osmie rousse* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53188 | *Osmia truncorum* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53190 | *Osmia villosa Schnck* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53039 | *Passaloecus corniger Shuckard, 1837* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52994 | *Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793)* | *Pemphrédon lugubre* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52999 | *Psen dahlborni* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52392 | *Pseudospinolia neglectus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52580 | *Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53052 | *Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53055 | *Spilomena differens Blüthgen, 1953* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53059 | *Stigmus pendulus Panzer, 1804* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52593 | *Tenthredo albicornis Fabricius, 1781* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52595 | *Tenthredo arcuata Förster, 1771* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52598 | *Tenthredo campestris Linnaeus, 1758* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52604 | *Tenthredo mesomelas auct.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52606 | *Tenthredo olivacea Klug, 1817* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52609 | *Tenthredo schaefferi perkinsi Morice, 1919* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52628 | *Tenthredo scutellaris Fabricius, 1804* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52613 | *Tenthredo vespa Retzius, 1783* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52625 | *Tenthredopsis inornata Cameron, 1881* | *Mouche-à-scie perlée, Mouche-à-scie fauve à point jaune* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52648 | *Trichiosoma lucorum (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53066 | *Trypoxylon clavicerum Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1828* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53067 | *Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52651 | *Zaraea fasciata (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 249157 | *Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Plusie de l'Asclépiade (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809776 | *Abrostola trigemina (Werneburg, 1864)* | *Plusie à lunettes (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54798 | *Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)* | *Sphinx Tête-de-Mort (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249542 | *Actinotia polyodon (Clerck, 1759)* | *Camomilière (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249650 | *Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)* | *Xanthie ferruginée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249657 | *Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)* | *Xanthie rufine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249659 | *Agrochola litura (Linnaeus, 1761)* | *Xanthie liturée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249653 | *Agrochola macilenta (Hübner, 1809)* | *Xanthie noisette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249655 | *Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Xanthie viennoise (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248882 | *Alcis jubata (Thunberg, 1788)* | *Boarmie crêtée (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 248131 | *Algedonia terrealis (Treitschke, 1829)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 809817 | *Amathes collina (Boisduval, 1840)* | *Ségétie des Plantains (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809818 | *Amathes sexstrigata (Hübner, 1809)* | *Noctuelle ombragée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809812 | *Amathes speciosa (Hübner, 1813)* | *Noctuelle spécieuse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249409 | *Amphipoea lucens (Freyer, 1845)* | *Noctuelle chatoyante (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249407 | *Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)* | *Noctuelle éclatante (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249501 | *Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)* | *Noctuelle de la Myrtille (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54451 | *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* | *Aurore (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Ruffoni A. | | | | 2006 |
| | 780146 | *Anticlea badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Cidarie baie (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248695 | *Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Violette (La), Cidarie dérivée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249393 | *Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Abromiade ténébreuse (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249396 | *Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)* | *Abromiade rubrirène (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810107 | *Apatele leporina (Linnaeus, 1758)* | *Noctuelle-Lièvre (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810110 | *Apatele menyanthidis (Esper, 1789)* | *Noctuelle du Ményanthe (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248933 | *Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)* | *Ennomos du Lilas (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219799 | *Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 346062 | *Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249642 | *Aporophyla nigra (Haworth, 1809)* | *Noctuelle anthracite (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219820 | *Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)* | *Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2010 - 2010 |
| | 249639 | *Atethmia centrago (Haworth, 1809)* | *Xanthie topaze (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249152 | *Autographa pulchrina (Haworth, 1809)* | *V d'or (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53915 | *Brenthis ino (Rottemburg, 1775)* | *Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 249738 | *Calliergis ramosa (Esper, 1786)* | *Noctuelle rameuse (la)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 249734 | *Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)* | *Linariette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53315 | *Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)* | *Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248781 | *Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)* | *Eubolie sinuée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249753 | *Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)* | *Lichénée bleue (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248278 | *Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248275 | *Catoptria mytilella (Hübner, 1805)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248265 | *Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249370 | *Celaena leucostigma (Hübner, 1808)* | *Noctuelle de l'Iris (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809801 | *Celama confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)* | *Nole crêtée (La), Nole-Aigrette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 416141 | *Celerio galii Kuznetsova, 1906* | *Sphinx de la Garance (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249283 | *Chersotis cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Noctuelle cuivreuse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248570 | *Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)* | *Cidarie fasciée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248569 | *Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)* | *Cidarie à bandes vertes (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 781382 | *Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767)* | *Cidarie roussâtre (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809663 | *Chrysaspidia festucae (Linnaeus, 1758)* | *Plusie de la Fétuque (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810104 | *Cirrhia citrago (Linnaeus, 1758)* | *Xanthie citronnée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810102 | *Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766)* | *Xanthie cirée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 771336 | *Cirrhia togata (Esper, 1788)* | *Xanthie ochracée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248884 | *Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Boarmie ceinte (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53954 | *Clossiana titania (Esper, 1793)* | *Nacré porphyrin (Le), Alezan (L'), Jason (Le), Grande Violette (La), Amathuse (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54657 | *Clostera curtula (Linnaeus, 1758)* | *Hausse-Queue blanche (La), Courtaud (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54664 | *Clostera pigra (Hufnagel, 1766)* | *Hausse-Queue brune (La), Recluse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809649 | *Coenonympha amyntas (auct. non Scopoli, 1763)* | *Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L'), Semi-Procris (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2008 - 2010 |
| | 219825 | *Colias croceus (Fourcroy, 1785)* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 248545 | *Colostygia olivata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Cidarie olive (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810299 | *Comibaena pustulata (Hufnagel, 1767)* | *Verdelet (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249626 | *Conistra vaccinii (Linnaeus, 1760)* | *Orrhodie de l'Airelle (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54791 | *Cosmotriche lunigera (Esper, 1784)* | *Lunigère (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248305 | *Crambus silvella (Hübner, 1813)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248970 | *Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)* | *Phalène de la Mancienne (La), Crocalle commune (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249795 | *Cryphia domestica (Hufnagel, 1766)* | *Bryophile perlée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716464 | *Cucullia lychnitis Rambur, 1833* | *Cucullie de la Molène-Lychnis (La), Bréchette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 459079 | *Dasychira fascelina (Linnaeus, 1758)* | *Bombyx porte-brosses (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54854 | *Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)* | *Grand Sphinx de la Vigne (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54856 | *Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)* | *petit Sphinx de la Vigne (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249268 | *Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Point noir (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249266 | *Diarsia dahlii (Hübner, 1813)* | *Diarsie de la Lancéole (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249269 | *Diarsia rubi (Vieweg, 1790)* | *Noctuelle belle (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 415949 | *Dioryctria mutatella Fuchs, 1903* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 816619 | *Discoloxia blomeri (Curtis, 1832)* | *Cidarie de l'Orme (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248243 | *Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248387 | *Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)* | *Faucille (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809654 | *Drepana lacertinaria (Linnaeus, 1758)* | *Lacertine (La), Lézard (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 779167 | *Drepana uncinula (Borkhausen, 1790)* | *Hameçon méridional (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 459044 | *Ectropis consonaria (Hübner, 1799)* | *Boarmie du Tilleul (La), Boarmie convenable (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249096 | *Eilema complana (Linnaeus, 1758)* | *Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 521548 | *Eilema deplana (Esper, 1787)* | *Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 249527 | *Enargia paleacea (Esper, 1788)* | *Cosmie paillée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248702 | *Entephria contestata (Vorbrodt, 1913)* | *Entéphrie reconnue (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 778848 | *Ephesia fulminea (Scopoli, 1763)* | *Lichénée jaune (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248936 | *Epione repandaria (Hufnagel, 1767)* | *Epione marginée (L'), lEpione des Saules (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248937 | *Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)* | *Epione vespérale (L') , Epione parallèle (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248769 | *Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)* | *Mélanippe triste (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249438 | *Episema glaucina (Esper, 1789)* | *Noctuelle du Muscari (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53483 | *Erebia aethiops (Esper, 1777)* | *Moiré sylvicole (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Grand Nègre à bandes fauves (Le), Grand Nègre (Le), Éthiopien (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2008 - 2010 |
| | 53451 | *Erebia euryale (Esper, 1805)* | *Moiré frange-pie (Le), Moiré frangé (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53487 | *Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53569 | *Erebia meolans (de Prunner, 1798)* | *Moiré des Fétuques (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53564 | *Erebia oeme (Hübner, 1804)* | *Moiré des Luzules (Le), Moiré (Le), Moiré châtain (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53307 | *Erynnis tages (Linnaeus, 1758)* | *Point de Hongrie (Le), Grisette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249141 | *Euchalcia variabilis (Piller, 1783)* | *Plusie illustre (La), Plusie de l'Aconit (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54716 | *Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)* | *Petit Paon de Nuit (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249263 | *Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)* | *Noctuelle pointée (La), Noctuelle piquée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249261 | *Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Diarsie du Cornouiller (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248577 | *Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)* | *Cidarie marbrée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 781348 | *Euphyia scripturata (Hübner, 1799)* | *Brocatelle rédigée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248665 | *Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)* | *Eupithécie de l'Absinthe (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248635 | *Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869* | *Eupithécie de l'Actée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248674 | *Eupithecia denotata (Hübner, 1813)* | *Eupithécie des Campanules (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248679 | *Eupithecia icterata (Villers, 1789)* | *Eupithécie frappée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248682 | *Eupithecia impurata (Hübner, 1813)* | *Eupithécie impure (L.)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248661 | *Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)* | *Eupithécie embrouillée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248605 | *Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)* | *Eupithécie du Mélampyre (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248659 | *Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848* | *Eupithécie de la Vérâtre (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248669 | *Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)* | *Eupithécie austère (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249260 | *Eurois occulta (Linnaeus, 1758)* | *Occulte (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716842 | *Euvanessa antiopa (Linnaeus, 1758)* | *Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (Le), Manteau-de-deuil (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249169 | *Euxoa decora (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Agrotide parée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247918 | *Euzophera pinguis (Haworth, 1811)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53902 | *Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54417 | *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* | *Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2010 - 2010 |
| | 810169 | *Gonodontis bidentata (Clerck, 1759)* | *Ennomos dentelé (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 810135 | *Gymnoscelis pumilata (Hübner, 1813)* | *Fausse-Eupithécie (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248400 | *Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)* | *Râtissée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 459032 | *Hada nana (Hufnagel, 1766)* | *Noctuelle dentine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249481 | *Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)* | *Noctuelle parée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249478 | *Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Noctuelle de l'Oeillet (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 459045 | *Hadena rivularis (Fabricius, 1775)* | *Noctuelle du Cucubale (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53969 | *Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)* | *Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Ruffoni A. | | | | 2006 - 2006 |
| | 54562 | *Harpyia furcula (Clerck, 1759)* | *Harpye fourchue (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249352 | *Hydraecia petasitis Doubleday, 1847* | *Noctuelle du Grand-Taconnet (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248519 | *Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)* | *Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810129 | *Hydriomena coerulata (Fabricius, 1777)* | *Larentie arrosée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248688 | *Hydriomena furcata (Thunberg & Borgström, 1784)* | *Larentie lavée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248690 | *Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)* | *Larentie rubescente (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54805 | *Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247988 | *Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810167 | *Itame fulvaria (Villers, 1789)* | *Fidonie à cinq raies (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 521545 | *Itame wauaria (Linnaeus, 1758)* | *Damas cendré (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54818 | *Laothoe populi (Linnaeus, 1758)* | *Sphinx du Peuplier (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53765 | *Limenitis populi (Linnaeus, 1758)* | *Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249611 | *Lithomoia solidaginis (Hübner, 1803)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249604 | *Lithophane socia (Hufnagel, 1766)* | *Xyline pétrifiée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248764 | *Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)* | *Haltère (La), Phalène hexaptérate (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 827641 | *Lobophora sexalaria Boisduval, 1840* | *Phalène à six ailes (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 774058 | *Lophopteryx cuculla (Esper, 1786)* | *Capuchon (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219751 | *Lycaena tityrus (Poda, 1761)* | *Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248854 | *Lycia hirtaria (Clerck, 1759)* | *Phalène hérissée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249258 | *Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Noctuelle porphyre (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249771 | *Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)* | *Ophiuse de l'Astragale (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249050 | *Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)* | *Nonne (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809838 | *Mamestra bicolorata (Hufnagel, 1766)* | *Noctuelle sereine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809827 | *Mamestra thalassina (Hufnagel, 1766)* | *Noctuelle thalassine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2008 - 2010 |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 53821 | *Melitaea diamina (Lang, 1789)* | *Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 248693 | *Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)* | *Phalène de la Ronce (La), Blanchâtre (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 822282 | *Mesotype virgata (Hufnagel, 1767)* | *Cidarie rayée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249517 | *Mormo maura (Linnaeus, 1758)* | *Maure* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 249548 | *Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)* | *Leucanie blafarde (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 249250 | *Noctua fimbriata (Schreber, 1759)* | *Frangée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249830 | *Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)* | *Nole-capuchon (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249114 | *Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)* | *Mondaine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249850 | *Nycteola degenerana (Hübner, 1799)* | *Nyctéole de l'Osier (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219740 | *Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 53337 | *Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54642 | *Odontosia carmelita (Esper, 1799)* | *Carmélite (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 770433 | *Orthonama lignata (Hübner, 1799)* | *Phalène du Gaillet palustre (La), Orthonome ligneuse (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 781112 | *Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)* | *Escortée (L'), Phalène dimorphe (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249007 | *Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)* | *Phalène du Sureau (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249453 | *Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)* | *Coureuse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 345352 | *Panthea coenobita (Esper, 1785)* | *Cénobite (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2010 - 2010 |
| | 771339 | *Paradiarsia glareosa (Esper, 1788)* | *Noctuelle à I double (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Ruffoni A. | | | | 2006 - 2006 |
| | 249072 | *Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)* | *Ecaille du Plantain (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248752 | *Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Phalène de l'Epine-Vinette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248731 | *Perizoma affinitata (Stephens, 1831)* | *Périzome contrastée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 779030 | *Perizoma obsoletaria (Herrich-Schäffer, 1838)* | *Périzome frottée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810139 | *Perizoma parallelolineata (Retzius, 1783)* | *Larentie parallèle (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249514 | *Phlogophora scita (Hübner, 1790)* | *Noctuelle amandine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54342 | *Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Ruffoni A. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219834 | *Pieris bryoniae (Hübner, 1806)* | *Piéride de l'Arabette (La), Piéride de la Bryone (La), Piéride brune (La), Veiné-de-noir (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 248976 | *Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)* | *Numérie poudrée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219775 | *Plebeius argus (Linnaeus, 1758)* | *Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 783753 | *Polia chi (Linnaeus, 1758)* | *Chi (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249134 | *Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)* | *Plusie monnoie (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249375 | *Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Ceinture jaune (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248128 | *Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54621 | *Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Plumet (Le), Porte-Plume (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53229 | *Pyrgus alveus (Hübner, 1803)* | *Hespérie du Faux-Buis, Plain-Chant (Le), Dé-à-jouer (Le), Hespérie frillitaire (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53236 | *Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)* | *Hespérie des Potentilles (L'), Armoricain (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248750 | *Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)* | *Hachée (La), Mélanippe hastée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 782834 | *Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758)* | *Phalène ondulée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249063 | *Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)* | *Ecaille pourprée (L'), Ecaille mouchetée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248352 | *Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 416068 | *Scoparia ulmella Knaggs, 1867* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248511 | *Scopula floslactata (Haworth, 1809)* | *Acidalie laiteuse (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248499 | *Scopula ornata (Scopoli, 1763)* | *Acidalie ornée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 784048 | *Selenia bilunaria (Esper, 1801)* | *Ennomos illunaire (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810168 | *Selenia lunaria (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Ennomos lunaire (L') , Croissant (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248926 | *Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)* | *Ennomos illustre (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54812 | *Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)* | *Sphinx demi-paon* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248691 | *Spargania luctuata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Mélanippe affligée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54801 | *Sphinx ligustri Linnaeus, 1758* | *Sphinx du Troène (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249133 | *Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)* | *Plusie de l'Orcette (La), Point d'interrogation. (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248399 | *Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Or (L'), Double-Bande brune (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 770392 | *Thera stragulata (Hübner, 1809)* | *Corythée étranglée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248559 | *Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Corythée variée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54752 | *Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Bombyx de l'Aubépine (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248763 | *Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)* | *Lobée (La), Phalène du Charme (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249672 | *Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Herminie olivâtre (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248190 | *Udea nebulalis (Hübner, 1796)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248193 | *Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 248334 | *Witlesia pallida (Curtis, 1827)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248790 | *Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)* | *Désignée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248789 | *Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248784 | *Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)* | *Incertaine (L'), Phalène ondée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248788 | *Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Oxydée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247058 | *Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)* | *Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716757 | *Zygaena hippocrepidis (Hübner, 1799)* | *Zygène de l'Hippocrépide (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247047 | *Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-Cheval (La), Zygène de la Faucille (La), Zygène de l'Hippocrepis (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lichens | 32126 | *Omphalina ericetorum (Pers. : Fr.) M. Lange* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 61260 | *Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)* | *Campagnol terrestre* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | *Hérisson d'Europe* | Passage, migration | | | | | |
| | 61636 | *Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)* | *Muscardin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60731 | *Mustela putorius Linnaeus, 1758* | *Putois d'Europe, Furet* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60119 | *Neomys anomalus Cabrera, 1907* | *Crossope de Miller, Musaraigne de Miller* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60127 | *Neomys fodiens (Pennant, 1771)* | *Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | *Pipistrelle commune* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61585 | *Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Écureuil roux* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux* | Passage, migration | | | | | |
| Odonates | 65440 | *Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne bleue (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | *Calopteryx splendens (Harris, 1782)* | *Caloptéryx éclatant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Jacquot P. | | | | 2011 |
| | 65141 | *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)* | *Agrion jouvencelle* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65376 | *Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)* | *Cordulie bronzée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | *Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)* | *Agrion porte-coupe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Jacquot P. | | | | 2010 - 2011 |
| | 65161 | *Erythromma najas (Hansemann, 1823)* | *Naïade aux yeux rouges (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65208 | *Lestes sponsa (Hansemann, 1823)* | *Leste fiancé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2010 - 2010 |
| | 65204 | *Lestes virens vestalis Rambur, 1842* | *Leste verdoyant septentrional* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65220 | *Lestes viridis (Vander Linden, 1825)* | *Leste vert* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | *Libellula depressa Linnaeus, 1758* | *Libellule déprimée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65271 | *Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758* | *Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65101 | *Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)* | *Petite nymphe au corps de feu (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65348 | *Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)* | *Sympétrum vulgaire (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 4192 | *Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)* | *Rousserolle verderolle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit farlouse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | *Hibou moyen-duc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4595 | *Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)* | *Sizerin flammé* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | *Tarin des aulnes* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3784 | *Certhia familiaris Linnaeus, 1758* | *Grimpereau des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | *Bec-croisé des sapins* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | *Gobemouche gris* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4361 | *Parus cristatus Linnaeus, 1758* | *Mésange huppée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4269 | *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)* | *Pouillot de Bonelli* | Passage, migration | | | | | |
| | 4049 | *Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)* | *Traquet tarier, Tarier des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | *Bécasse des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | *Grive litorne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Orthoptères | 66161 | *Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet des pâtures, Oedipode parallèle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2008 - 2010 |
| | 66077 | *Chrysochraon dispar (Germar, 1834)* | *Criquet des clairières* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2008 - 2010 |
| | 65496 | *Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)* | *Criquet des Genévriers* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2008 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65910 | *Gryllus campestris Linnaeus, 1758* | *Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri,Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 65718 | *Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)* | *Decticelle des bruyères* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2010 - 2010 |
| | 65722 | *Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)* | *Decticelle bariolée, Dectique brévipenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2008 - 2010 |
| | 66250 | *Miramella alpina (Kollar, 1833)* | *Miramelle alpestre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2010 - 2010 |
| | 535765 | *Omocestus viridulus viridulus (Linnaeus, 1758)* | *Criquet verdelet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. | | | | 2010 - 2010 |
| | 65487 | *Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)* | *Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 65869 | *Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)* | *Sauterelle cymbalière, Sauterelle chanteuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| Phanérogames | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79921 | *Achillea ptarmica L., 1753* | *Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80055 | *Aconitum pyramidale sensu P.Fourn., 1936* | *Casque de Jupiter, Aconit napel, Capuchon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80086 | *Acorus calamus L., 1753* | *Acore calame, Acore aromatique, Acore odorant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80805 | *Agrostis vulgaris With., 1796* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81073 | *Alchemilla filicaulis Buser, 1893* | *Alchemille velue, Alchémille à tiges fines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81570 | *Alnus incana (L.) Moench, 1794* | *Aulne blanchâtre, Aulne de montagne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81637 | *Alopecurus geniculatus L., 1753* | *Vulpin genouillé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82023 | *Amaranthus spinosus L., 1753* | *Amarante épineuse, Épinard malarabe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82999 | *Anthyllis vulneraria L., 1753* | *Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84203 | *Arundo phragmites L., 1753* | *Roseau, Roseau commun, Roseau à balais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84306 | *Asperula cynanchica L., 1753* | *Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident trifolié, Eupatoire aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | *Bromus erectus Huds., 1762* | *Brome érigé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87484 | *Callitriche stagnalis Scop., 1772* | *Callitriche des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87720 | *Campanula rotundifolia L., 1753* | *Campanule à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88178 | *Carduus personata (L.) Jacq., 1776* | *Chardon bardane* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88318 | *Carex acutiformis Ehrh., 1789* | *Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88342 | *Carex ampullacea Gooden., 1794* | *Laîche à bec, Laîche en ampoules* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88407 | *Carex canescens L., 1753* | *Laîche tronquée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88459 | *Carex davalliana Sm., 1800* | *Laîche de Davall, Carex de Davall* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88468 | *Carex diandra Schrank, 1781* | *Laîche arrondie, Laîche à tige arrondie, Laîche à deux étamines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88478 | *Carex disticha Huds., 1762* | *Laîche distique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88491 | *Carex elata All., 1785* | *Laîche raide, Laîche élevée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | *Carex flava L., 1753* | *Laîche jaunâtre, Laîche jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159979 | *Carex fulva Schkuhr.* | *Laîche blonde, Laîche fauve* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88538 | *Carex glauca Scop., 1772* | *Laîche glauque, Langue-de-pic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 619014 | *Carex goodenoughii Asch. & Graebn., 1901* | *Laîche vulgaire, Laîche noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 88545 | *Carex gracilis Curtis, 1786* | *Laîche aiguë, Laîche grêle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88614 | *Carex lasiocarpa Ehrh., 1784* | *Laîche à fruit barbu, Laîche à fruit velu, Laîche filiforme* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88626 | *Carex leporina L., 1753* | *Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88691 | *Carex montana L., 1753* | *Laîche des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88737 | *Carex ornithopoda Willd., 1805* | *Laîche pied-d'oiseau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche millet, Faux Fenouil* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88755 | *Carex paradoxa Willd., 1794* | *Laîche paradoxale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88762 | *Carex pauciflora Lightf., 1777* | *Laîche pauciflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88802 | *Carex pulicaris L., 1753* | *Laîche puce, Carex pucier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | *Carex stellulata Gooden., 1794* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88913 | *Carex teretiuscula Gooden., 1794* | *Laîche arrondie, Laîche à tige arrondie, Laîche à deux étamines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88942 | *Carex vesicaria L., 1753* | *Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89147 | *Carlina acaulis L., 1753* | *Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89619 | *Centaurea jacea L., 1753* | *Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89660 | *Centaurea pannonica* | *Centaurée de Pannonie* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 91053 | *Chrysanthemum leucanthemum L., 1753* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91274 | *Cirsium acaule Scop., 1769* | *Cirse sans tige* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91378 | *Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769* | *Cirse des maraicher, Chardon des potagers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91398 | *Cirsium rivulare (Jacq.) All., 1789* | *Cirse des ruisseaux, Cirse de Salzbourg* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92217 | *Comarum palustre L., 1753* | *Potentille des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93088 | *Crepis mollis (Jacq.) Asch., 1864* | *Crépide molle, Crépis mou* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie, Sieglingie retombante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95980 | *Elodea canadensis Michx., 1803* | *Élodée du Canada* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96136 | *Epilobium angustifolium L., 1753* | *Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96226 | *Epilobium palustre L., 1753* | *Épilobe des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96229 | *Epilobium parviflorum Schreb., 1771* | *Épilobe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96431 | *Epipactis atropurpurea Raf., 1810* | *Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96448 | *Epipactis latifolia All., 1785* | *Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96465 | *Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769* | *Épipactis des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96843 | *Eriophorum alpinum L., 1753* | *Scirpe de Hudson* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96844 | *Eriophorum angustifolium Honck., 1782* | *Linaigrette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96852 | *Eriophorum latifolium Hoppe, 1800* | *Linaigrette à feuilles larges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96861 | *Eriophorum vaginatum L., 1753* | *Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97801 | *Euphrasia rostkoviana Hayne, 1825* | *Euphraise des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Fétuque Roseau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98334 | *Festuca lemanii Bastard, 1809* | *Fétuque de Léman* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99383 | *Galium baldense* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 99390 | *Galium boreale L., 1753* | *Gaillet boréal* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99511 | *Galium pumilum Murray, 1770* | *Gaillet rude* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99582 | *Galium verum L., 1753* | *Gaillet jaune, Caille-lait jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99828 | *Genista tinctoria L., 1753* | *Genêt des teinturiers, Petit Genêt* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99889 | *Gentiana germanica Willd., 1798* | *Gentianelle d'Allemagne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99903 | *Gentiana lutea L., 1753* | *Gentiane jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99953 | *Gentiana verna L., 1753* | *Gentiane printanière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100215 | *Geum rivale L., 1753* | *Benoîte des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100607 | *Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813* | *Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100964 | *Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal, 1824* | *Herbe d'or* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102235 | *Hieracium murorum L., 1753* | *Épervière des murs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | *Piloselle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102671 | *Hieracium umbellatum L., 1753* | *Épervière en ombelle, Accipitrine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102842 | *Hippocrepis comosa L., 1753* | *Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102870 | *Hippuris vulgaris L., 1753* | *Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103301 | *Hypericum montanum L., 1755* | *Millepertuis des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103598 | *Inula britannica L., 1753* | *Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande-Bretagne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104200 | *Juncus glaucus Ehrh. ex Sibth., 1794* | *Jonc glauque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104228 | *Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | *Juniperus communis L., 1753* | *Genévrier commun, Peteron* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104532 | *Knautia godetii Reut., 1857* | *Knautie de Godet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104615 | *Koeleria cristata (L.) Bertol., 1819* | *Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105086 | *Laserpitium prutenicum L., 1753* | *Laser de Prusse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | *Lathyrus pratensis L., 1753* | *Gesse des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | *Leontodon hispidus L., 1753* | *Liondent hispide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106288 | *Linum catharticum L., 1753* | *Lin purgatif* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106367 | *Listera cordata (L.) R.Br., 1813* | *Listère à feuilles cordées* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Oeil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107158 | *Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794* | *Petit muguet à deux feuilles, Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107168 | *Malachium aquaticum (L.) Fr., 1817* | *Stellaire aquatique, Céraiste d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108103 | *Mentha longifolia (L.) Huds., 1762* | *Menthe à longues feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108345 | *Menyanthes trifoliata L., 1753* | *Trèfle d'eau, Ményanthe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109150 | *Myriophyllum spicatum L., 1753* | *Myriophylle à épis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110227 | *Ononis repens L., 1753* | *Bugrane maritime* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110885 | *Orchis incarnata L., 1755* | *Orchis incarnat, Orchis couleur de chair* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110898 | *Orchis latifolia Haller ex Scop., 1772* | *Dactylorhize à feuilles larges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | *Orchis maculata L., 1753* | *Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110914 | *Orchis mascula (L.) L., 1755* | *Orchis mâle, Herbe à la couleuvre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111954 | *Oxycoccus quadripetalus Schinz & Thell., 1907* | *Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112426 | *Parnassia palustris L., 1753* | *Parnassie des marais, Hépatique blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112590 | *Pedicularis palustris L., 1753* | *Pédiculaire des marais, Tartarie rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112786 | *Petasites officinalis Moench, 1794* | *Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112873 | *Peucedanum palustre (L.) Moench, 1794* | *Peucédan des marais, Persil des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113596 | *Pimpinella saxifraga L., 1753* | *Petit boucage, Persil de Bouc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113639 | *Pinguicula vulgaris L., 1753* | *Grassette commune, Grassette vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 161959 | *Pinus montana sensu Coste* | *Pin à crochets* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113906 | *Plantago media L., 1753* | *Plantain moyen* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114524 | *Polygala amara* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 114641 | *Polygonum amphibium L., 1753* | *Persicaire flottante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114664 | *Polygonum bistorta L.* | *Langue de Bœuf* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114822 | *Polygonum persicaria L., 1753* | *Renouée Persicaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115249 | *Potamogeton densus L., 1753* | *Potamot dense, Groenlandia serré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115270 | *Potamogeton lucens L., 1753* | *Potamot luisant, Potamot brillant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115280 | *Potamogeton natans L., 1753* | *Potamot nageant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | *Potentilla tormentilla Neck., 1770* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115868 | *Primula farinosa L., 1753* | *Primevère farineuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116109 | *Prunus padus L., 1753* | *Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116547 | *Pyrola rotundifolia L., 1753* | *Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116902 | *Ranunculus aconitifolius L., 1753* | *Renoncule à feuilles d'aconit* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116979 | *Ranunculus circinatus Sibth., 1794* | *Renoncule divariquée, Renoncule en crosse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117040 | *Ranunculus geraniifolius Rouy & Foucaud, 1893* | *Renoncule des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117255 | *Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785* | *Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117530 | *Rhamnus cathartica L., 1753* | *Nerprun purgatif* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | *Rhamnus frangula L., 1753* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117731 | *Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805* | *Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117940 | *Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900* | *Rorippe d'Islande* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119812 | *Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833* | *Sagine noueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119952 | *Salix aurita L., 1753* | *Saule à oreillettes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120163 | *Salix pentandra L., 1753* | *Saule à cinq étamines, Saule odorant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120189 | *Salix purpurea L., 1753* | *Osier rouge, Osier pourpre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120192 | *Salix repens L., 1753* | *Saule à feuilles étroites, Saule rampant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120284 | *Salix x ambigua Ehrh., 1791* | *Saule ambigu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120753 | *Sanguisorba minor Scop., 1771* | *Pimprenelle à fruits réticulés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120758 | *Sanguisorba officinalis L., 1753* | *Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121367 | *Scabiosa lucida Vill., 1779* | *Scabieuse luisante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121675 | *Scirpus acicularis L., 1753* | *Scirpe épingle, Héléocharis Épingle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121699 | *Scirpus cespitosus L., 1753* | *Scirpe en touffe, Souchet gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121735 | *Scirpus lacustris L., 1753* | *Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121759 | *Scirpus palustris L., 1753* | *Scirpe des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire casquée, Scutellaire à casque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122329 | *Selinum carvifolia (L.) L., 1762* | *Sélin à feuilles de carvi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122678 | *Senecio paludosus L., 1753* | *Séneçon des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122971 | *Serratula tinctoria L., 1753* | *Serratule des teinturiers, Sarrette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123369 | *Silaus flavescens Bernh., 1800* | *Silaüs des prés, Cumin des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124308 | *Sorbus aucuparia L., 1753* | *Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124417 | *Sparganium ramosum Huds., 1778* | *Rubanier dressé, Ruban-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124798 | *Stachys palustris L., 1753* | *Épiaire des marais, Ortie bourbière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | *Succisa praemorsa Asch., 1864* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125319 | *Swertia perennis L., 1753* | *Swertie pérenne, Swertie vivace* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126124 | *Thalictrum flavum L., 1753* | *Pigamon jaune, Pigamon noircissant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126309 | *Thesium pratense Ehrh. ex Schrad., 1790* | *Thésium des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126564 | *Thymus praecox Opiz, 1824* | *Thym précoce, Serpolet couchet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126798 | *Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., 1812* | *Tofieldie à calicule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127395 | *Trifolium montanum L., 1753* | *Trèfle des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127872 | *Trollius europaeus L., 1753* | *Trolle d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128077 | *Typha latifolia L., 1753* | *Massette à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128315 | *Utricularia minor L., 1753* | *Petite utriculaire, Utriculaire mineure* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128322 | *Utricularia vulgaris L., 1753* | *Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | *Myrtille, Maurette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128354 | *Vaccinium uliginosum L., 1753* | *Airelle des marais, Orcette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128355 | *Vaccinium vitis-idaea L., 1753* | *Airelle rouge, vigne du mont Ida* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale, Valériane des collines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128520 | *Veratrum album L., 1753* | *Vérâtre blanc, Varaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128793 | *Veronica anagalloides Guss., 1826* | *Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128808 | *Veronica beccabunga L., 1753* | *Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129147 | *Vicia cracca L., 1753* | *Vesce cracca, Jarosse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 86183 | *Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802* | *Botryche lunaire, Botrychium lunaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96526 | *Equisetum limosum L., 1753* | *Prêle des eaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96534 | *Equisetum palustre L., 1753* | *Prêle des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96545 | *Equisetum sylvaticum L., 1753* | *Prêle des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107000 | *Lycopodium annotinum L., 1753* | *Lycopode à feuilles de genévrier, Lycopode à rameaux d'un an* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159792 | *Polystichum spinulosum* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | *Orvet fragile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77692 | *Lacerta vivipara Jacquin, 1787* | *Lézard vivipare* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 197 | *Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Insectes | 53631 | *Coenonympha tullia (O.F. Müller, 1764)* | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53926 | *Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)* | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53976 | *Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 54400 | *Colias palaeno (Linnaeus, 1760)* | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65356 | *Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65366 | *Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60119 | *Neomys anomalus Cabrera, 1907* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60127 | *Neomys fodiens (Pennant, 1771)* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60731 | *Mustela putorius Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61585 | *Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)* | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 61636 | *Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3039 | *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3053 | *Crex crex (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3525 | *Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3533 | *Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3784 | *Certhia familiaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3814 | *Lanius excubitor Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4049 | *Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4192 | *Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4269 | *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4616 | *Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Angiospermes | 85897 | *Betula nana L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 87450 | *Calla palustris L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 88426 | *Carex chordorrhiza L.f., 1782* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 88562 | *Carex heleonastes Ehrh. ex L.f., 1782* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 88632 | *Carex limosa L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 89147 | *Carlina acaulis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 94833 | *Dianthus superbus L., 1755* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 95439 | *Drosera longifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 96851 | *Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 99185 | *Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 99903 | *Gentiana lutea L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 106353 | *Liparis loeselii (L.) Rich., 1817* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 114480 | *Polemonium caeruleum L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 117096 | *Ranunculus lingua L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 121076 | *Saxifraga hirculus L., 1753* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 121500 | *Scheuchzeria palustris L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 128354 | *Vaccinium uliginosum L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 128355 | *Vaccinium vitis-idaea L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Bryidae | 6736 | *Sphagnum contortum Schultz* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6751 | *Sphagnum girgensohnii Russow* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6774 | *Sphagnum papillosum Lindb.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6785 | *Sphagnum russowii Warnst.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6789 | *Sphagnum squarrosum Crome* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6790 | *Sphagnum subnitens Russow & Warnst.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6795 | *Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6797 | *Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6802 | *Sphagnum warnstorfii Russow* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 95561 | *Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 107000 | *Lycopodium annotinum L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES


| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | ADRIAENS A & FERREZ Y | 1999 | Site natura 2000 Bassin du Drugeon - Expertise phytoécologique de parcelles agricoles pouvant présenter un intérêt botanique. Syndicat intercommunal du plateau de Frasne. |
| | André M., Ferrez Y et Morcrette P. | 2002 | Suivi botanique et cartographie floristique de la zone Natura 2000 "Bassin du Drugeon". Soc. bot. de Fr-Comté, Synd. mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN F-C et Conseil général du Doubs. 81p. + annexes |
| | Barbe J | | Caractéristiques biologiques des lacs de Bellefontaines et des Mortes : végétation et micofaune. Bull. fed. soc. hist. nat. de Franche-Comté, n° 75, Besançon, pp. 15 - 38. |
| | BOILLOT F et al. | 1978 | Etude des oiseaux et des mammifères de la région de Bonnevaux-Frasne. CUER, 2, 207-286 |
| | CENFC | 1995 | Programme LIFE sauvegarde de la richesse biologique du bassin du Drugeon. Inventaire écologique initial opération de gestion, 113 p. + annexes |
| | CENFC | 1998 | Suivi ornithologique dans la vallée du Drugeon (25). Syndicat Intercommunal du Plateau de Frasne |
| | Cheveau P. | 2010 | Le Milan royal Milvus milvus [Linné, 1758] dans le Bassin du Drugeon |
| | C.R.E.N. Franche-Comté | 1998 | Etude des tourbières de Franche-Comté (programme Life), vol. 2 : Doubs et Jura |
| | Duflo-Minet C. | 2009 | Bilan de la richesse faunistique du bassin du Drugeon sur la base des groupes d'espèces de papillons, libellules et oiseaux. Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon, Union Européenne, DIREN Franche-Comté et Agence de l'eau RMC. 98p. + annexes |
| | ENC | 1999 | Cartographie des habitats forestiers de la Zone Natura 2000 "Bassin du Drugeon". Syndicat Intercommunal de Frasne. |
| | Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron M., Millet P., Piguet A. et Vadam J.-C. | 2001 | Atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté, Besançon, Société d'horticulture du Doubs et des amis du jardin botanique, Turriers, Naturalia Publications. 310 p. |
| | FERREZ Y B.E. | 1999 | Atlas des zones humides du Doubs. DIREN Franche-Comté |
| | Gillet F., Royer J.-M. et Vadam J.-C. | 1980 | Rapport concernant une étude monographique des tourbières du département du Doubs et du nord du département du Jura. in Etude pluridisciplinaire des zones humides formant le complexe étangs, marais et tourbières de Frasne (Doubs). Univ. Franche-Comté. p.125-273. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | GUINOCHET M | 1955 | Carte des groupements végétaux de la France. Pontarlier 5-6 au 1/20000, CNRS, Paris |
| | Guyonneau J. et Mady M. | 2008 | Typologie, cartographie et évaluation de l'état de conservation des habitats naturels et semi-naturels du site Natura 2000 « Bassin du Drugeon », première tranche : prairies. DIREN de Franche-Comté. Conservatoire Botanique de Franche-Comté. 58 p + annexes |
| | Hage-Ali J. | 2012 | Bilan du suivi de la reproduction du Milan royal (Milvus milvus) dans le site Natura 2000 de la Vallée du Drugeon |
| | Lambert J.-L. et Tissot B. | 2001 | Suivi entomologique (odonates et rhopalocères diurnes) des zones humides du Doubs. Réserve naturelle du Lac de Remoray, PNR du Haut-Jura et Région Franche-Comté. 31 p. |
| | Lambert J.-L., Michelat D., Montadert M., Pepin D., Roveretto P. et Tissot B. | 2000 | Suivi ornithologique dans le Bassin du Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté et Conseil général du Doubs. 15p |
| | Lambert J.-L., Michelat D., Montadert M., Pepin D., Sauret M. et Tissot B. | 2001 | Suivi ornithologique dans le Bassin du Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté et Conseil général du Doubs. 7p + cartes. |
| | Lambert J.-L., Michelat D., Montadert M., Pepin D., Sauret M. et Tissot B. | 2002 | Suivi ornithologique dans le Bassin du Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté et Conseil général du Doubs. 8p + cartes |
| | Lambert J.-L., Montadert M. et Tissot B. | 2000 | Suivi entomologique (odonate et rhopalocères) du Bassin du Drugeon. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne et DIREN Franche-Comté. 21p+annexes |
| | Lambert J.-L., Montadert M. et Tissot B. | 2002 | Suivi entomologique dans le Bassin du Drugeon (odonates et rhopalocères). Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté et Conseil général du Doubs. 15p +cartes |
| | Lambert J.-L., Montardert M. et Tissot B. | 2001 | Suivi entomologique (odonate et rhopalocères) du Bassin du Drugeon. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne et DIREN Franche-Comté. 12p+annexes |
| | Maniez F. | 2011 | Suivi de la reproduction du Milan royal (Milvus milvus) dans la Vallée du Drugeon |
| | Morin C., Paul J.-P., Maas S. | 2011 | Plan d'actions Milan royal en Franche-Comté. Document de synthèse de l'année 2010, LPO Franche-Comté, DREAL Franche-Comté : 27p. |
| | OPIE Franche-Comté - F Mora | 1999 | Les insectes protégés de Franche-Comté. Atlas commenté |
| | RN de REMORAY & GNFC | 1999 | 1999 - Suivi ornithologique du Bassin du Drugeon, 15 p. |
| | Tissot B. & Lambert J.-C. | 1999 | Suivi odonatologique du Bassin du Drugeon - RN de Remoray |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | TISSOT B & MONTADERT M | 1999 | Suvi des Rhopalocères diurnes - RN de Remoray |
| Informateur | CBN-FC | | |
| | Communauté de communes Frasne-Drugeon | | |
| | Franzoni A. | | |
| | Franzoni A. et Jacquot P. | | |
| | Gendry J. | 2013 | |
| | Jacquot P. | | |
| | Mady M. | | |
| | Michelat D. | | |
| | Mora F. et Terret P. | | |
| | Morin C. | | |
| | ONEMA | | |
| | Ruffoni A. | | |
| | Tissot B. | | |