



LES SEIGNES DU MÉMONT (Identifiant national : 430002331)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 46000017)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, . - 430002331, LES SEIGNES DU MÉMONT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002331.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 930780°-2250328°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/10/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 26 |
| 9. SOURCES | 26 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs
- Commune : Mémont (INSEE : 25373)
- Commune : Luhier (INSEE : 25351)
- Commune : Russey (INSEE : 25512)
- Commune : Bizot (INSEE : 25062)

1.2 Superficie

112,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 940

Maximale (mètre): 1004

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Entre les vallées du Doubs et du Dessoubre, dans la haute chaîne du Jura, le plateau de Maïche est issu de l'érosion d'une structure plissée qui s'est trouvée émoussée. Autour du village du Mémont s'étend un complexe de tourbières d'altitude, dans un contexte paysager de forêts de conifères et de prairies amendées. Ces zones humides sont installées dans des dépressions imperméabilisées par des marnes et calcaires marneux du Jurassique supérieur qui ont favorisé la formations d'horizons superficiels tourbeux..

En altitude, dans le massif du Jura, les facteurs climatiques sont propices à l'installation de tourbières : pluviométrie forte, apportant des eaux acides et peu minéralisées, températures basses et absence de période sèche de longue durée. A partir de cuvettes remplies d'eau, les tourbières se forment et évoluent lentement depuis environ 12 000 ans : colonisation de l'eau libre (tremblants), puis atterrissement (bas-marais alcalin). Le développement d'un réseau karstique induit la création d'îlots soustraits à l'influence des eaux carbonatées. Les sphaignes s'installent sous forme de coussins et contribuent à l'acidification du milieu. Une transition s'opère vers un bas-marais acide, puis vers une tourbière bombée (haut-marais acide). L'écosystème devient complètement isolé fonctionnellement du substrat calcaire. Enfin, l'assèchement et l'installation des ligneux marquent le stade " climacique ".

Les Seignes du Mémont sont occupées par une tourbière boisée, des saulaies, aulnaies et plantations d'épicéas ; les zones ouvertes sont constituées de bas-marais acides, prairies humides tourbeuses, mégaphorbiaies, moliniaie. Quelques ruisselets temporaires et petits plans d'eau sont disposés en bordure des tourbières.

Cette zone recèle une flore typique : bouleau pubescent et violette des marais dans les bois tourbeux, laïche à utricules velus, parnassie des marais et linaigrette à feuilles étroites dans le bas-marais. Sans être rares, ces espèces restent peu fréquentes en raison de la raréfaction des milieux humides qui les hébergent. Parmi les espèces de grand intérêt, citons les linaigrettes à larges feuilles et à feuilles engainantes, la grassette commune, les circées des Alpes et intermédiaire, l'andromède à feuilles de polium, la laïche étoile, ces cinq dernières espèces étant protégées.

Sur le plan entomologique, ce site héberge un cortège de papillons de jour original et varié, typique des formations végétales hygrophiles dans lequel deux espèces protégées sont à signaler : le cuivré de la bistorte et le damier de la succise. Plusieurs espèces d'oiseaux remarquables ont été recensées en période de nidification parmi lesquelles le milan royal, le tarier des prés, la pie-grièche écorcheur. La pie-grièche grise est régulièrement observée en hivernage.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces protégées confère un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêtés ministériels des 20/01/82, 22/06/92 et 6/05/07 et 29/09/09).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Les tourbières sont d'importants réservoirs hydriques qui jouent un rôle régulateur dans la circulation complexe des eaux superficielles et souterraines de la région. La conservation de l'engorgement des sols est donc la première priorité. Pour cela doivent être évitées toute opération de drainage, d'assainissement ou de creusement d'étangs. La conservation de la qualité des formations végétales passe également par l'interdiction d'apports d'engrais dans les formations humides et dans les prairies situées en périphérie immédiate car ils provoquent un enrichissement en éléments nutritifs générant une banalisation de la flore et de la faune très spécialisées de ces milieux. Cette restriction vise aussi les plantations de résineux qui accélèrent l'assèchement et détruisent les habitats originaux. Il en est de même pour les dépôts de matériaux. Enfin, des opérations de réouverture de boisements doivent être opérées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Cuvette

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Lichens | | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Lépidoptères |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i> | | | | |
| | 54.5 <i>Tourbières de transition</i> | | | | |
| | 54.4 <i>Bas-marais acides</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 42 <i>Forêts de conifères</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

372 = Calthion (déterminant)

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 219816 | <i>Boloria titania</i> (Esper, 1793) | Nacré porphyrin (Le), Alezan (L'), Jason (Le), Grande Violette (La), Amathuse (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53954 | <i>Clossiana titania</i> (Esper, 1793) | Nacré porphyrin (Le), Alezan (L'), Jason (Le), Grande Violette (La), Amathuse (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2006 |
| | 53663 | <i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788) | Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L'), Semi-Procris (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53487 | <i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 54075 | <i>Glaucopteryx alexis</i> (Poda, 1761) | Azuré des Cytises (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53765 | <i>Limnitis populi</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53976 | <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Cuivré de la Bistorte (Le), Cuivre violacé (Le), Lycène hellé (Le), Argus Violet (Le), Argus myope violet (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 219753 | <i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1760) | Cuivré écarlate (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53221 | <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758) | Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53269 | <i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804) | Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| Odonates | 65446 | <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Aeshne (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65151 | <i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825) | Agrion à fer de lance, Agrion hasté (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | Agrion joli | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65352 | <i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leucorrhine douteuse</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65397 | <i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840) | <i>Cordulie arctique</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65393 | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie métallique</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| Phanérogames | 82420 | <i>Andromeda polifolia</i> L., 1753 | <i>Andromède</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lacroix P. | | | | 1997 - 1997 |
| | 88562 | <i>Carex heleonastes</i> Ehrh. ex L.f., 1782 | <i>Étoile des marais, Laïche des marais, Laïche des tourbières</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 91256 | <i>Circaea alpina</i> L., 1753 | <i>Circée des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 91267 | <i>Circaea x intermedia</i> Ehrh., 1789 | <i>Circée intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| Ptéridophytes | 107000 | <i>Lycopodium annotinum</i> L., 1753 | <i>Lycopode à feuilles de genévrier, Lycopode à rameaux d'un an</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2005 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 4958 | <i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5476 | <i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6638 | <i>Calypogeia neesiana</i> (C.Massal. & Carestia) Müll.Frib. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5491 | <i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5494 | <i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6579 | <i>Cephalozia connivens</i> (Dicks.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5839 | <i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.) Grout | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5093 | <i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1804 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4731 | <i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E.Britton | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4739 | <i>Dicranum bergeri</i> Blandow | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4754 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6013 | <i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6623 | <i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6495 | <i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6417 | <i>Mylia anomala</i> (Hook.) Gray | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6101 | <i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4901 | <i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3864 | <i>Polytrichum commune</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3879 | <i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6111 | <i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6115 | <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6120 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6731 | <i>Sphagnum acutifolium</i> Ehrh. ex Schrad. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6749 | <i>Sphagnum amblyphyllum</i> (Russow) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6760 | <i>Sphagnum magellanicum</i> Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6780 | <i>Sphagnum quinquefarium</i> (Braithw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6781 | <i>Sphagnum recurvum</i> P.Beauv., 1805 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 6785 | <i>Sphagnum russowii</i> Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Brugel E. | | | | 2010 - 2010 |
| | 3842 | <i>Tetraphis pellucida</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5933 | <i>Tomentypnum nitens</i> (Hedw.) Loeske | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | Aurore (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 219799 | <i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758) | Tristan (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 54339 | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53724 | <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758) | Carte géographique (La), Jaspé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 219821 | <i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 219815 | <i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758) | Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53915 | <i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775) | Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 54307 | <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758) | Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2007 - 2007 |
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53821 | <i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789) | Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le), Bande noire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53747 | <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| Lichens | 55971 | <i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57797 | <i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm., 1796 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 57717 | <i>Cladonia squamosa</i> (Scop.) Hoffm., 1796 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Odonates | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | Anax empereur (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | Agrion jouvencelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 1997 - 2006 |
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | Cordulie bronzée (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naïade aux yeux rouges (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CREN-FC | | | | 1997 - 1997 |
| | 65101 | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Verguet C. | | | | 2006 - 2006 |
| Oiseaux | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO FC | | | | |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2007 - 2007 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | |
| Phanérogames | 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81192 | <i>Alchemilla vulgaris</i> L., 1753 | <i>Alchémille commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88342 | <i>Carex ampullacea</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88459 | <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800 | <i>Laïche de Davall, Carex de Davall</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | <i>Laïche jaunâtre, Laïche jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 159979 | <i>Carex fulva</i> Schkuhr. | Laïche blonde, Laïche fauve | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88538 | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772 | Laïche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 619014 | <i>Carex goodenoughii</i> Asch. & Graebn., 1901 | Laïche vulgaire, Laïche noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | Laïche écailleuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88626 | <i>Carex leporina</i> L., 1753 | Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88747 | <i>Carex pallascens</i> L., 1753 | Laïche pâle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88802 | <i>Carex pulicaris</i> L., 1753 | Laïche puce, Carex pucier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794 | Laïche étoilée, Laïche-hérissou | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91053 | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L., 1753 | Marguerite commune, Leucanthème commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton du Diable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91398 | <i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All., 1789 | <i>Cirse des ruisseaux, Cirse de Salzbourg</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92217 | <i>Comarum palustre</i> L., 1753 | <i>Potentille des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93101 | <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Crépide des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | <i>Épilobe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96852 | <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800 | <i>Linaigrette à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96861 | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753 | <i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99983 | <i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh., 1796 | <i>Gentiane ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Roveretto P., Esseiva N. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100160 | <i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753 | <i>Géranium des bois, Pied-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100215 | <i>Geum rivale</i> L., 1753 | <i>Benoîte des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159698 | <i>Hieracium auricula</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | <i>Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | <i>Liondent hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | Luzule champêtre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 137705 | <i>Melampyrum pratense</i> subsp. <i>paludosum</i> (Gaudin) P.Fourn., 1937 | Mélampyre des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | Trèfle d'eau, Ményanthe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | Nard raide, Poil-de-bouc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110898 | <i>Orchis latifolia</i> Haller ex Scop., 1772 | Dactylorhize à feuilles larges | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | <i>Orchis maculata</i> L., 1753 | Orchis maculé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111954 | <i>Oxycoccus quadripetalus</i> Schinz & Thell., 1907 | Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | Parnassie des marais, Hépatique blanche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112590 | <i>Pedicularis palustris</i> L., 1753 | Pédiculaire des marais, Tartarie rouge | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113389 | <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753 | Raiponce orbiculaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113435 | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841 | Épicéa commun, Sérente | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113639 | <i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753 | Grassette commune, Grassette vulgaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | Polygala commun, Polygala vulgaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114664 | <i>Polygonum bistorta</i> L. | Langue de Bœuf | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Peuplier Tremble | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | Potentille tormentille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116547 | <i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 | Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116902 | <i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753 | <i>Renoncule à feuilles d'aconit</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 139781 | <i>Ranunculus polyanthemus</i> subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv., 1901 | <i>Renoncule à segments étroits</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | <i>Petit cocriste, Petit Rhinathe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127395 | <i>Trifolium montanum</i> L., 1753 | <i>Trèfle des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127482 | <i>Trifolium spadicum</i> L., 1755 | <i>Trèfle jaune doré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127872 | <i>Trollius europaeus</i> L., 1753 | <i>Trolle d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | <i>Myrtille, Maurette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128354 | <i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Airelle des marais, Orcette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128355 | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753 | <i>Airelle rouge, vigne du mont Ida</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128520 | <i>Veratrum album</i> L., 1753 | <i>Vérâtre blanc, Varaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128793 | <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826 | <i>Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96526 | <i>Equisetum limosum</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96545 | <i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753 | <i>Prêle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------------------|---|--|--|
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 53976 | <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 82420 | <i>Andromeda polifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 88562 | <i>Carex heleonastes</i> Ehrh. ex L.f., 1782 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128354 | <i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128355 | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Bryidae | 6760 | <i>Sphagnum magellanicum</i> Brid. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6780 | <i>Sphagnum quinquefarium</i> (Braithw.) Warnst. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 6785 | <i>Sphagnum russowii</i> Warnst. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Ptéridophytes | 107000 | <i>Lycopodium annotinum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--------------------------|------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | C.R.E.N. Franche-Comté | 1998 | Etude des tourbières de Franche-Comté (programme Life), vol. 2 : Doubs et Jura |
| | FERREZ Y B.E. | 1999 | Atlas des zones humides du Doubs. DIREN Franche-Comté |
| | Mora F. et Verguet C. | 2006 | Désignation des enjeux entomologiques et mise en évidence de zones d'intérêt sur les 1° et 2° plateaux du Doubs (rhopalocères et odonates). OPIE et DIREN F-Comté, U.E., T1 : 57 p, T2 : 33 fiches |
| Informateur | Brugel E. | | |
| | CBNFC | 0 | |
| | CREN-FC | | |
| | Lacroix P. | | |
| | LPO FC | 2007 | |
| | LPO FC | | |
| | Mora F. et Verguet C. | | |
| Roveretto P., Esseiva N. | | | |