# VALLEE DE LA LOUE DE ORNANS A QUINGEY (Identifiant national : 430007777)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 36087000)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430007777, VALLEE DE LA LOUE DE ORNANS A QUINGEY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 88P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007777.pdf*

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 885905°-2242368°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/12/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 7
6. HABITATS ..... 7
7. ESPECES ..... 19
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 88
9. SOURCES ..... 88

# 1. DESCRIPTION

## ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430007830 - (Id reg. : 00870005)
- Id nat. : 430002266 - (Id reg. : 36087001)
- Id nat. : 430002275 - (Id reg. : 36087002)
- Id nat. : 430007778 - (Id reg. : 36087003)
- Id nat. : 430020261 - (Id reg. : 45087014)
- Id nat. : 430020262 - (Id reg. : 45087013)
- Id nat. : 430007829 - (Id reg. : 36087004)
- Id nat. : 430007831 - (Id reg. : 36087006)
- Id nat. : 430015562 - (Id reg. : 36087009)
- Id nat. : 430007848 - (Id reg. : 36087008)
- Id nat. : 430020426 - (Id reg. : 33087015)
- Id nat. : 430020428 - (Id reg. : 36087016)
- Id nat. : 430020429 - (Id reg. : 36087017)
- Id nat. : 430020435 - (Id reg. : 45087018)
- Id nat. : 430020438 - (Id reg. : 36087012)
- Id nat. : 430020017 - (Id reg. : 36087011)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Amondans (INSEE : 25017)
- Commune : Charnay (INSEE : 25126)
- Commune : Vorges-les-Pins (INSEE : 25631)
- Commune : Quingey (INSEE : 25475)
- Commune : Chouzelot (INSEE : 25154)
- Commune : Busy (INSEE : 25103)
- Commune : Lizine (INSEE : 25338)
- Commune : Chassagne-Saint-Denis (INSEE : 25129)
- Commune : Courcelles (INSEE : 25171)
- Commune : Scey-Maisières (INSEE : 25537)
- Commune : Cessey (INSEE : 25109)
- Commune : Rouhe (INSEE : 25507)
- Commune : Fertans (INSEE : 25236)
- Commune : Amancey (INSEE : 25015)
- Commune : Châtillon-sur-Lison (INSEE : 25134)
- Commune : Malans (INSEE : 25359)
- Commune : Malbrans (INSEE : 25360)
- Commune : Éternoz (INSEE : 25223)
- Commune : Cléron (INSEE : 25155)
- Commune : Flagey (INSEE : 25241)
- Commune : Cademène (INSEE : 25106)
- Commune : Chenecey-Buillon (INSEE : 25149)
- Commune : Rurey (INSEE : 25511)
- Commune : Épeugney (INSEE : 25220)

## 1.2 Superficie

6119,3 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 262
Maximale (mètre): 593

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002266 - VALLON DE VALBOIS ET CORNICHE DE CHASSAGNE-SAINT-DENIS (Type 1) (Id reg. : 36087001)
- Id nat. : 430002275 - RECULEE DE NORVAUX (Type 1) (Id reg. : 36087002)
- Id nat. : 430002280 - VALLEE DE LA LOUE DE LA SOURCE A ORNANS (Type 2) (Id reg. : 36104000)
- Id nat. : 430020261 - PELOUSES ET BOCAGES DE CHENECEY-BUILLON (Type 1) (Id reg. : 45087014)
- Id nat. : 430020262 - MARNIÈRE D'EPEUGNEY (Type 1) (Id reg. : 45087013)
- Id nat. : 430007778 - FALAISES DE SCEY-EN-VARAIS ET ROCHER DE COLONNE (Type 1) (Id reg. : 36087003)
- Id nat. : 430007829 - FALAISES DE LA CITADELLE (Type 1) (Id reg. : 36087004)
- Id nat. : 430007831 - FALAISES DU SAUT DE LA PUCELLE (Type 1) (Id reg. : 36087006)
- Id nat. : 430015562 - PELOUSES DE MALANS ET RUISSEAU DU BIEF TARD (Type 1) (Id reg. : 36087009)
- Id nat. : 430014008 - VALLEE DE LA LOUE DE QUINGEY A PARCEY (Type 2) (Id reg. : 37443000)
- Id nat. : 430007830 - FALAISES DE LA GRANGE GOLGRU (Type 1) (Id reg. : 00870005)
- Id nat. : 430007848 - ROCHE GAUTHIER (Type 1) (Id reg. : 36087008)
- Id nat. : 430020426 - SOUS LE CROS (Type 1) (Id reg. : 33087015)
- Id nat. : 430020428 - BOIS ET FALAISE DE LA GOUILLE NOIRE ET DU BOIS DU SERPENT (Type 1) (Id reg. : 36087016)
- Id nat. : 430020429 - SOUS LA GRANDE ROCHE (Type 1) (Id reg. : 36087017)
- Id nat. : 430020435 - PELOUSE DE BELLEVUE (Type 1) (Id reg. : 45087018)
- Id nat. : 430020438 - GROTTE DE NAHIN (Type 1) (Id reg. : 36087012)
- Id nat. : 430020017 - ANCIEN PONT FERRÉ ET COMBLES DE L'EGLISE DE CLÉRON (Type 1) (Id reg. : 36087011)

## 1.5 Commentaire général

DESCRIPTION DU SITE - INTERET

La Loue, résurgence alimentée par les pertes du Doubs, du Drugeon et de nombreux éléments du réseau karstique, prend sa source à la limite du premier et du deuxième plateau du Jura, aux environs de Ouhans.

Située au sein des plateaux calcaires ondulés du Jurassique supérieur et moyen, la vallée va déployer une suite de paysages attachants et typés. Sur ses 25 premiers kilomètres, elle entaille les plateaux calcaires et circule dans une gorge étroite, sinueuse, sauvage et boisée. Jusqu'à Vuillafans, elle parcourt des bassins encaissés, sans terrasses alluviales, aux versants couverts de prairies ou d'épicéas, surmontés par de longues corniches calcaires qui surplombent la rivière. A partir de Vuillafans, le fond de la vallée s'étale et forme une plaine de 500 m de large. Entre Ornans et Chenecey, la Loue développe des méandres entre les versants marneux externes, bordés de forêts et toujours dominés par les longues corniches calcaires.

Les nombreuses reculées qui s'ouvrent aux environs d'Ornans et se prolongent en direction de Quingey offrent des milieux remarquables (falaises, éboulis, corniches, plateaux, pentes et fonds de vallon), colonisés par des groupements végétaux caractéristiques.

Ces ensembles essentiellement forestiers ont conservé leur aspect sauvage et les groupements végétaux rencontrés sont bien typés. On y recense des forêts de pente ombragées (hêtraies à dentaire et érablaies à scolopendre) et sur les pentes bien exposées des hêtraies thermophiles** à céphalanthère de même que des tiliaies (forêts de tilleul sur pente forte ou éboulis). Ils sont bien représentés au niveau des vallons de Norvaux et de Valbois. Des barres rocheuses les dominent et les moindres aspérités de la roche sont colonisées par des végétaux différents selon l'exposition. Les corniches thermophiles* sont colonisées par des landes à chêne pubescent, la hêtraie thermophile et plus souvent, par des pelouses.

Sur le plan avifaunistique, plusieurs espèces particulièrement intéressantes ont été recensées sur la zone : l'engoulevent d'Europe, l'alouette lulu, le busard Saint-Martin, le grand-duc d'Europe, le faucon pèlerin, le milan royal, l'hirondelle des rochers, l'hirondelle des rivages, le guêpier d'Europe et le harle bièvre.

Parmi ces dernières, il convient de distinguer les pelouses xériques* à anthyllide des montagnes et les pelouses submontagnardes thermoxérophiles* à brome dressé, situées plus en retrait. La variation de la composition floristique observée est liée au caractère superficiel des sols, à l'exposition et aux conditions hydriques. Toutes sont liées à l'absence de fertilisation. Ces pelouses sont entourées d'ourlets forestiers à géranium sanguin et peucédan des cerfs, typés et assez rares dans le département. Plus rarement, comme au pied du Rocher de Colonne (Scey-en-Varais), on observe une pelouse se développant sur les marnes oxfordiennes. Elle se caractérise par la présence d'une espèce typique et peu commune, le lotier maritime. Cette pelouse évolue, dans les stations où l'écoulement de l'eau devient plus important, vers un groupement riche en molinie (Molinion).

Sur le site, la Loue recouvre 4 niveaux typologiques de VERNEAUX, correspondant aux zones à truite supérieure et moyenne, naturellement riches en espèces polluosensibles. Les structures physiques de haute qualité sont représentées par l'alternance régulière des seuils et des mouilles, accordée à la longueur d'onde des méandres et à la largeur du lit mineur, d'une part et la présence de barres de tuf, densément colonisées par les mousses aquatiques et les macroinvertébrés benthiques, d'autre part. Le site abrite de très belles populations de truite autochtone. Sur la partie basse, la présence de l'Apron (observations annuelles régulières) témoigne de la qualité écologique du site, notamment sur les secteurs où la rivière a conservé ses caractéristiques originelles (tronçon Chenecey-Chouzelot). La qualité de l'eau appartient à la classe 1B ; elle présente des problèmes (connus depuis plus de 10 ans) de surcharge en composés du phosphore et dans une moindre mesure, de l'azote dès la source et renforcés par la mauvaise qualité de certains petits affluents (ruisseaux de Vervaux, d'Amathay-Vésigneux par exemple). A l'amont de la résurgence, les surcharges mesurées sur le Doubs et le Drugeon et aggravées par les proliférations d'algues, constituent, pour partie, une des causes des problèmes rencontrés sur le site où les valeurs d'indice biologique (I.B.G.N. 14 - 15 / 20) devraient être parmi les plus élevées du bassin, compte tenu des potentialités biologiques du cours d'eau.

Les secteurs de pelouses, l'alternance de milieux ouverts et boisés, de même que la présence sur un espace restreint d'une grande variété d'habitats naturels favorise localement une grande richesse faunistique avec plusieurs espèces de reptiles et insectes protégés. Pour ce qui concerne les oiseaux, le relief du secteur favorise la nidification du faucon pélerin mais on notera également la gélinotte, la pie grièche écorcheur, l'alouette lulu, la bondrée apivore... Enfin, quelques grottes sont mises à profit par les chauves-souris, comme lieux de transit ou d'hibernation. Les deux sites importants de la zone sont la grotte de Nahin (Cléron) et la grotte à l'ours (Chenecey-Buillon - znieff de type I) accueillant de petits populations de Minioptères de Schreibers en transit (respectivement au printemps et en automne), connectées avec la Haute-Vallée et Basse-Vallée de la Loue. D'autre part, le Petit rhinolophe et le Vespertilion de Daubenton se reproduisent dans le secteur avec notamment deux gîtes sur Cléron (église et ancien pont de chemin de fer, tous deux znieff de type I). Enfin, de nombreuses espèces de chiroptères fréquentent les massifs boisés de la vallée (Barbastelle, Noctule de Leisler, Oreillard sp.).

OBJECTIFS ET MOYENS DE PRESERVATION ET DE GESTION

Les objectifs de gestion et les moyens de préservation découlent de la sensibilité particulière des milieux naturels et des atteintes observées. Sur l'ensemble du site, plusieurs priorités se dégagent ; les moyens permettant de les atteindre devront faire l'objet d'une définition au niveau local sur les thèmes suivants :

Amélioration de la qualité de l'eau :

Þ réduction de la charge en éléments fertilisants à l'amont de la source et dans la vallée (renforcement des normes de rejet et création de dispositifs d'assainissement performants en termes d'abattement de la charge en phosphore) ;

Þ amélioration de la capacité de stockage des effluents d'exploitations agricoles sur le bassin versant ;

Préserver le cours d'eau et sa dynamique :

Þ réduction des vitesses de transit des eaux de ruissellement dans le bassin versant et dans le lit majeur ;

Þ stabilisation des profils en long et en travers du cours d'eau

Þ accorder les rythmes de prise d'eau des microcentrales au régime des cours d'eau en substituant à la notion de débit réservé celle de " débit biologique acceptable " et en demeurant vigilant en termes de respect des débits réservés, d'entretien et de gestion des microcentrales. Sur le site des gorges de Nouailles,les potentialités du cours d'eau sont réduites par les prélèvements d'eau à la source ;

Þ ne créer aucune nouvelle microcentrale ;

Þ respecter la libre circulation du poisson de l'aval à l'amont du site. L'echelle rustique du barrage de Chenecey, franchie par le goujon en période de basses eaux, est un exemple de dispositif de communication à installer ou à restaurer sur les ouvrages infranchissables (barrage Rivex à Ornans par exemple) ;

Þ éviter le curage et la scarification du lit à des fins "touristiques". Les interventions devront être conduites manuellement et les végétaux coupés devront être évacués vers l'extérieur du cours d'eau ;

Þ interdiction stricte de la pratique du V.T.T. et de la randonnée dans le lit de la rivière ;

Þ réglementation stricte de la pratique du canoé-kayak en période de basses eaux. Reprendre, à ce titre, la valeur de 4,5 m3/s comme seuil de base pour le pratique de cette activité ;

Þ éviter les modifications de structure du lit de la Loue pour des motifs de lutte contre les crues, l'équilibre existant représentant un des plus puissants facteurs de qualité écologique du cours d'eau sur l'ensemble du site ;

Þ éviter la création de plans d'eau dans le lit majeur.

Protection des habitats terrestres :

Þ protéger impérativement les formations tufeuses,

Þ assurer une gestion conservatoire des formations végétales d'éboulis et des pentes rocheuses les plus intéressantes,

Þ conduire sur les pelouses des pratiques d'entretien visant à favoriser leur maintien : fauche ou pâturage extensifs adaptés, absence de fertilisation, contrôle de l'embroussaillement et si besoin, défrichement raisonné,

Þ compte tenu de la nature des formations végétales et de leur intérêt biologique (maturité et structure), la gestion des massifs forestiers nécessitent la mise en place d'une cartographie opérationnelle qui permettra de définir, les secteurs non exploitables, ceux devant faire l'objet d'une gestion particulière et ceux où une gestion ordinaire adaptée aux potentialités du milieux est suffisante. Parmi les deux premières catégories, il convient de distinguer les forêts de pente et d'éboulis (érablaies, tiliaies, hêtraies à dentaire), les saulaies et aulnaies, les groupements forestiers thermophiles* et les forêts vieillies,

Þ maintenir les milieux intraforestiers ouverts,

Þ limiter l'enrésinement des pentes et favoriser toutes mesures susceptibles de maintenir l'ouverture et la qualité des paysages,

Þ privilégier le maintien de prairies en fond de vallée et favoriser la conduite de pratiques agricoles extensives sur les secteurs inondables.

Enfin, il convient d'organiser la fréquentation afin de limiter les impacts liés au dérangement (certains milieux souterrains, falaises...) ou au surpiétinement (bordure de corniches, pelouses sèches...).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Crustacés<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Autre Faune (préciser)<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Bryophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Paysager<br>- Géomorphologique<br>- Géologique |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pratiques liées à la gestion des eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques liées aux loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Mollusques<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Diptères<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Autre Faunes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Crustacés | - Bryophytes | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *62.1 Végétation des falaises continentales calcaires* | | | | |
| | *31.88 Fruticées à Genévriers communs* | | | | |
| | *34.1 Pelouses pionnières médio-européennes* | | | | |
| | *34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches* | | | | |
| | *34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus* | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | *34.3228 Mesobromion du Rhin moyen* | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | *34.41 Lisières xéro-thermophiles* | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34.42 Lisières mésophiles | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 61.31 Eboulis thermophiles péri-alpins | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 31.88 Fruticées à Genévriers communs | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 24.12 Zone à Truites | | | | |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 61.31 Eboulis thermophiles péri-alpins | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.3328 Xerobromion du Jura français | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.42 Lisières mésophiles | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.322B Mesobromion du Jura français | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.41 Lisières xéro-thermophiles | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.3328 Xerobromion du Jura français | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 37.714 Communautés riveraines à Pétasites | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 62.151 Falaises calcaires ensoleillées des Alpes | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 37.214 Prairies à Séneçon aquatique | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.111 Pelouses à orpins | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 31.88 Fruticées à Genévriers communs | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34.322B Mesobromion du Jura français | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 54.23 Tourbières basses à Carex davalliana | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.3328 Xerobromion du Jura français | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.42 Lisières mésophiles | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides | | | | |
| | 24.12 Zone à Truites | | | | |
| | 34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches | | | | |
| | 41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins | | | | |
| | 41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes | | | | |
| | 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles | | | | |
| | 34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 31.88 Fruticées à Genévriers communs | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *31.88 Fruticées à Genévriers communs* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | | |
| | *38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : Ferrez Y. et al | 60 | 2004 - 2004 |
| | *31.88 Fruticées à Genévriers communs* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes* | | | | |
| | *34.322B Mesobromion du Jura français* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *34.3328 Xerobromion du Jura français* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus* | | Bibliographie : Duflo C. 2014 | 84 | 2004 - 2014 |
| | *34.3328 Xerobromion du Jura français* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *41.16 Hêtraies sur calcaire* | | | | |
| | *62.1 Végétation des falaises continentales calcaires* | | | | |
| | *34.3328 Xerobromion du Jura français* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *87.1 Terrains en friche* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *62 Falaises continentales et rochers exposés* | | | | |
| | *65 Grottes* | | | | |
| | *38.2 Prairies de fauche de basse altitude* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *38.111 Pâturages à Ray-grass* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *37.24 Prairies à Agropyre et Rumex* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *83.31 Plantations de conifères* | | | | |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *83.1 Vergers de hautes tiges* | | | | |
| | *83.15 Vergers* | | | | |
| | *24.12 Zone à Truites* | | | | |
| | *31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *37.24 Prairies à Agropyre et Rumex* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *38.2 Prairies de fauche de basse altitude* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *87.1 Terrains en friche* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *38.111 Pâturages à Ray-grass* | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | *31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile* | | Informateur : Ferrez Y. et al | 40 | 2004 - 2004 |
| | *31.82 Fruticées à Buis* | | | | |
| | *24.11 Ruisselets* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *41.13 Hêtraies neutrophiles* | | | | |
| | *62.1 Végétation des falaises continentales calcaires* | | | | |
| | *41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins* | | | | |
| | *41.16 Hêtraies sur calcaire* | | | | |
| | *83.21 Vignobles* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *62.1 Végétation des falaises continentales calcaires* | | | | |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *38.111 Pâturages à Ray-grass* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *31.82 Fruticées à Buis* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile* | | Bibliographie : Duflo C. 2014 | 16 | 2004 - 2014 |
| | *65 Grottes* | | | | |
| | *38.2 Prairies de fauche de basse altitude* | | | | |
| | *31.8 Fourrés* | | | | |
| | *34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches* | | | | |
| | *62 Falaises continentales et rochers exposés* | | | | |
| | *41 Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins* | | | | |
| | *41.16 Hêtraies sur calcaire* | | | | |
| | *62.1 Végétation des falaises continentales calcaires* | | | | |
| | *41.13 Hêtraies neutrophiles* | | | | |
| | *31.82 Fruticées à Buis* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *38.111 Pâturages à Ray-grass* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.82 Fruticées à Buis | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 86.2 Villages | | | | |
| | 38.2 Prairies de fauche de basse altitude | | | | |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 83.31 Plantations de conifères | | | | |
| | 24.12 Zone à Truites | | | | |
| | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | | |
| | 41.16 Hêtraies sur calcaire | | | | |
| | 41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques | | | | |
| | 54.12 Sources d'eaux dures | | | | |
| | 54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) | | | | |
| | 41.13 Hêtraies neutrophiles | | | | |
| | 31.82 Fruticées à Buis | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 62.15 Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 87.1 Terrains en friche | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 38.112 Pâturages à Cynosurus-Centaurea | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 38.111 Pâturages à Ray-grass | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile | | Informateur : Ferrez Y. | | 2004 - 2004 |
| | 83.32 Plantations d'arbres feuillus | | | | |
| | 38.2 Prairies de fauche de basse altitude | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | | |
| | *41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins* | | | | |
| | *41.16 Hêtraies sur calcaire* | | | | |
| | *41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes* | | | | |
| | *41.2 Chênaies-charmaies* | | | | |
| | *62.1 Végétation des falaises continentales calcaires* | | | | |
| | *54.12 Sources d'eaux dures* | | | | |
| | *44.1 Formations riveraines de Saules* | | | | |
| | *41.13 Hêtraies neutrophiles* | | | | |
| | *37.24 Prairies à Agropyre et Rumex* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *38.111 Pâturages à Ray-grass* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *62.1 Végétation des falaises continentales calcaires* | | | | |
| | *54.12 Sources d'eaux dures* | | | | |
| | *54 Bas-marais, tourbières de transition et sources* | | | | |
| | *37.72 Franges des bords boisés ombragés* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *38.111 Pâturages à Ray-grass* | | Informateur : Ecotope Faune Flore | | 2004 - 2008 |
| | *38.112 Pâturages à Cynosurus-Centaurea* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 |
| | *44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 |
| | *37.241 Pâtures à grand jonc* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37.2 Prairies humides eutrophes | | | | |
| | 83.32 Plantations d'arbres feuillus | | | | |
| | 31.82 Fruticées à Buis | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 22 Eaux douces stagnantes | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 87.1 Terrains en friche | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 38.111 Pâturages à Ray-grass | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 38.2 Prairies de fauche de basse altitude | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 31.82 Fruticées à Buis | | | | |
| | 31.88 Fruticées à Genévriers communs | | | | |
| | 37 Prairies humides et mégaphorbiaies | | | | |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | |
| | 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles | | | | |
| | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | | |
| | 41.16 Hêtraies sur calcaire | | | | |
| | 61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles | | | | |
| | 41.2 Chênaies-charmaies | | | | |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | 41 Forêts caducifoliées | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.111 Pâturages à Ray-grass* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |
| | *31.82 Fruticées à Buis* | | Informateur : Ferrez Y. et al | | 2004 - 2004 |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | | |
| | *41 Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *41 Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *3 Landes, fruticées, pelouses et prairies* | | | | |
| | *41 Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *3 Landes, fruticées, pelouses et prairies* | | | | |
| | *82 Cultures* | | | | |
| | *41 Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *81 Prairies améliorées* | | | | |
| | *4 Forêts* | | | | |
| | *3 Landes, fruticées, pelouses et prairies* | | | | |
| | *82 Cultures* | | | | |
| | *81 Prairies améliorées* | | | | |
| | *8 Terres agricoles et paysages artificiels* | | | | |
| | *41 Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *86.41 Carrières* | | | | |
| | *41 Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *81 Prairies améliorées* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3<br>Landes, fruticées, pelouses et prairies | | | | |
| | 31.8<br>Fourrés | | | | |
| | 38<br>Prairies mésophiles | | | | |
| | 8<br>Terres agricoles et paysages artificiels | | | | |
| | 82<br>Cultures | | | | |
| | 86.2<br>Villages | | | | |
| | 82<br>Cultures | | | | |
| | 4<br>Forêts | | | | |
| | 3<br>Landes, fruticées, pelouses et prairies | | | | |
| | 81<br>Prairies améliorées | | | | |
| | 3<br>Landes, fruticées, pelouses et prairies | | | | |
| | 62<br>Falaises continentales et rochers exposés | | | | |
| | 54<br>Bas-marais, tourbières de transition et sources | | | | |
| | 3<br>Landes, fruticées, pelouses et prairies | | | | |
| | 24.12<br>Zone à Truites | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

24.43 = Cinclidotetum aquatici

24.43 = Cinclidotetum danubici typicum

31.81 = Ligustro vulgaris - Prunetum spinosae

31.82 = Coronillo emeri - Prunetum mahaleb

31.881 = gpt à Juniperus communis

34.111 (d) = Sedo acris - Poetum alpinae

34.322B (d) = Onobrichido viciifoliae - Brometum erecti

34.322B (d) = Sieglingio decumbentis - Brachypodietum pinnati

34.322B (d) = Antherico ramosi - Brometum erecti

34.322B (d) = Plantagini serpentinae - Tetragonolobetum maritimi

34.322B (d) = Carici humilis - Brometum erecti

34.3328 (d) = Carici humilis - anthyllidetum montanae

34.42 (d) = gpt à Agrimonia eupatoria

37.1 (d) = Filipendulo ulmariae - Cirsietum oleracei

37.214 (d) = Senecio aquatici - Brometum racemosi

37.241 = Junco inflexi - Menthetum longifoliae

37.714 (d) = Filipendulo ulmariae - Petasition

38.111 = Lolio perennis - Cynosuretum cristatii

38.112 = Sanguisorbo minoris - Cynosurenion cristatii

38.22 (d) = Galio veri - Trifolietum repentis

38.22 = Heracleo sphondylii - Brometum mollis

38.22 (d) = Colchico autumnalis - Festucetum pratensis

44.921 = gpt à Salix cinerea

54.12 = Cratoneurion commutati

54.23 (d) = Caricion davallianae

62.151 (d) = Potentillion caulescentis

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 5330 | *Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5116 | *Neckera besseri (Lobarz.) Jur.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5349 | *Tortella nitida (Lindb.) Broth.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2003 |
| Crustacés | 18437 | *Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)* | *Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 159443 | *Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)* | *Écaille chinée (L')* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | *Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 2003 - 2003 |
| | 53332 | *Hesperia comma (Linnaeus, 1758)* | *Virgule (La), Comma (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2003 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53379 | *Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Petit Sylvandre (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 - 2003 |
| | 53615 | *Lopinga achine (Scopoli, 1763)* | *Bacchante (La), Déjanire (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |
| | 54085 | *Maculinea arion (Linnaeus, 1758)* | *Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 219757 | *Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prunellier (La), Thécla de l'Aubépine (La), Porte-Queue brun à tâches bleues (Le), Porte-Queue gris-brun (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 1997 - 2003 |
| | 54296 | *Strymonidia spini (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prunellier (La), Thécla de l'Aubépine (La), Porte-Queue brun à tâches bleues (Le), Porte-Queue gris-brun (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53320 | *Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)* | *Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2003 - 2003 |
| Mammifères | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | *Barbastelle d'Europe, Barbastelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60612 | *Lynx lynx (Linnaeus, 1758)* | *Lynx boréal* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60546 | *Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817)* | *Minioptère de Schreibers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60330 | *Rhinolophus euryale Blasius, 1853* | *Rhinolophe euryale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | *Grand rhinolophe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | *Petit rhinolophe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Odonates | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | *Agrion de Mercure* | Reproduction indéterminée | | | | | 1855 - 1855 |
| Oiseaux | 3493 | *Bubo bubo (Linnaeus, 1758)* | *Grand-duc d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3540 | *Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758* | *Engoulevent d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | *Busard Saint-Martin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2938 | *Falco peregrinus Tunstall, 1771* | *Faucon pèlerin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Pèlerin Jura | | | | 2006 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2818 | *Mergus merganser Linnaeus, 1758* | *Harle bièvre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Morin C. | | | | 2006 |
| | 3582 | *Merops apiaster Linnaeus, 1758* | *Guêpier d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3692 | *Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)* | *Hirondelle de rochers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GNFC | | | | 2006 - 2006 |
| | 3688 | *Riparia riparia (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de rivage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Morin C. et Paul J.-P. | | | | 2006 |
| Phanérogames | 82985 | *Anthyllis montana L., 1753* | *Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1987 - 2003 |
| | 83503 | *Arctium nemorosum Lej., 1833* | *Bardane des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2003 |
| | 87210 | *Calamagrostis argentea DC., 1805* | *Calamagrostide argentée, Stipe Calamagrostide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91267 | *Circaea x intermedia Ehrh., 1789* | *Circée intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Collin P. | | | | 1995 - 1995 |
| | 94411 | *Daphne alpina L., 1753* | *Daphné des Alpes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Gillet F. | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94756 | *Dianthus gratianopolitanus Vill., 1789* | *Œillet mignardise, Oeillet bleuâtre, Oeillet de Grenoble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Cremille J. | | | | 1994 - 1994 |
| | 101747 | *Hieracium bupleuroides C.C.Gmel., 1808* | *Épervière faux Buplèvre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102519 | *Hieracium scorzonerifolium Vill., 1779* | *Épervière à feuilles de scorzonère* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103019 | *Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838* | *Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2008 |
| | 103456 | *Iberis intermedia Guers., 1803* | *Ibéris intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1996 - 2003 |
| | 106026 | *Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799* | *Limodore avorté, Limodore sans feuille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110335 | *Ophrys apifera Huds., 1762* | *Ophrys abeille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2003 |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1996 - 2009 |
| | 138908 | *Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882* | *Plantain serpentin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1997 - 2003 |
| | 113961 | *Plantago serpentina All., 1773* | *Plantain serpentin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1996 - 2003 |
| | 114012 | *Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828* | *Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115554 | *Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805* | *Potentille à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2003 |
| | 117551 | *Rhamnus saxatilis Jacq., 1762* | *Nerprun des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1987 - 2003 |
| | 123258 | *Sideritis hyssopifolia L., 1753* | *Crapaudine à feuilles d'hysope, Thé des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124701 | *Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827* | *Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1993 - 2003 |
| | 141475 | *Stipa eriocaulis subsp. eriocaulis Borbás, 1878* | *Stipe de France* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1990 - 2003 |
| | 125173 | *Stipa pennata L., 1753* | *Stipe penné, Plumet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126294 | *Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch, 1826* | *Thésium divariqué* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1987 - 2003 |
| | 127595 | *Trinia glauca (L.) Dumort., 1827* | *Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1990 - 2003 |
| | 128445 | *Valeriana tripteris L., 1753* | *Valériane à trois folioles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2001 |
| | 129623 | *Viola mirabilis L., 1753* | *Violette étonnante, Violette singulière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 69378 | *Zingel asper (Linnaeus, 1758)* | *Apron du Rhône* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reptiles | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | *Coronelle lisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 212 | *Bombina variegata (Linnaeus, 1758)* | *Sonneur à ventre jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Passage, migration | | | | | |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | *Grenouille rousse* | Passage, migration | | | | | |
| | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | *Salamandre tachetée* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 121 | *Triturus alpestris (Laurenti, 1768)* | *Triton alpestre* | Passage, migration | | | | | |
| | 155 | *Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres | 89673 | *Centaurea pratensis* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 98204 | *Festuca duriuscula* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres insectes | 65810 | *Phyllodromica subaptera (Rambur, 1838)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Bryophytes | 5422 | *Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6251 | *Aneura pinguis (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5253 | *Barbula convoluta Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5254 | *Barbula crocea (Brid.) F.Weber & D.Mohr* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5728 | *Bryum capillare Hedw., 1801* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5760 | *Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5879 | *Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5482 | *Campylium calcareum Crundw. & Nyholm* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5483 | *Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5494 | *Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6696 | *Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5496 | *Cratoneuron commutatum (Hedw.) G.Roth* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5998 | *Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4439 | *Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4754 | *Dicranum scoparium Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4815 | *Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4851 | *Encalypta streptocarpa Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5941 | *Entodon orthocarpus (Brid.) Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3909 | *Fissidens cristatus Wilson ex Mitt.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6677 | *Frullania dilatata (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6683 | *Frullania tamarisci (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5403 | *Grimmia apocarpa Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5554 | *Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5324 | *Gymnostomum aeruginosum Sm.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5882 | *Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6013 | *Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6033 | *Hypnum cupressiforme Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5888 | *Isothecium myurum Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6623 | *Lepidozia reptans (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5104 | *Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6008 | *Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6348 | *Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6242 | *Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5122 | *Neckera complanata (Hedw.) Huebener* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5123 | *Neckera crispa Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5014 | *Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5025 | *Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4988 | *Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4996 | *Plagiopus oederi (Brid.) Limpr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5431 | *Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A.Crum, 1964* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 5336 | *Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5922 | *Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6657 | *Radula complanata (L.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6120 | *Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6124 | *Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6517 | *Scapania aspera M.Bernet & Bernet* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5425 | *Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5427 | *Thuidium tamariscifolium Lindb. [nom. illeg.]* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5347 | *Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5350 | *Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6650 | *Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5054 | *Ulota crispula Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5368 | *Weissia crispata (Nees & Hornsch.) Müll.Hal., [hom. illeg.]* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Coléoptères | 10900 | *Amphimallon ater* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8883 | *Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758)* | *Scarabée erratique* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 241425 | *Chrysomela cuprea Fabricius, 1775* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10813 | *Copris lunaris (Linnaeus, 1758)* | *Copris lunaire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 10552 | *Geotrupes spiniger Marsham, 1802* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10861 | *Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8903 | *Otophorus fossor* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 12255 | *Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)* | *Lepture noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Hyménoptères | 52419 | *Abia candens Konow, 1887* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53081 | *Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)* | *Abeille cotonnière, Anthidie cotonnière* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53083 | *Anthidium punctatum Latreille, 1809* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52443 | *Arge melanochroa Gmelin, 1790* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52457 | *Athalia rosae (Linnaeus, 1758)* | *Tenthrède de la rave* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53092 | *Bombus agrorum (Fabricius, 1787)* | *Bourdon des champs* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53094 | *Bombus distenguendus Morawitz* | *Bourdon distingué* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53105 | *Bombus variabilis Schmiedeknecht, 1878* | *Bourdon variable* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52738 | *Chrysis analis Spinola, 1808* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52741 | *Chrysis brevitarsis Thomson, 1870* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52742 | *Chrysis hybrida Lepeletier* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52909 | *Clypeocrabro clypeata* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53107 | *Coelioxys conioidea Kl.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53108 | *Coelioxys quadridentata (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52943 | *Coelocrabro megacephalus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52350 | *Corynis crassicornis (Rossi, 1790)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52952 | *Crossocerus tarsatus (Shuckard, 1837)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52989 | *Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52921 | *Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53014 | *Gorytes planifrons (Wesmael, 1852)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53118 | *Halictus albipes Fabricius* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53120 | *Halictus calceatus Scopoli* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53125 | *Halictus fulvicornis Ky.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53128 | *Halictus laevigatus K.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53129 | *Halictus laticeps Schenck, 1868* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53130 | *Halictus maculatus Smith, 1848* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53131 | *Halictus malachurus K.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53134 | *Halictus minutulus Schnck* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53136 | *Halictus morio Fabricius* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53140 | *Halictus pauxillus Schnck.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53145 | *Halictus rubicundus (Christ, 1791)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53147 | *Halictus setulletus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53148 | *Halictus simplex Blüthgen, 1923* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53149 | *Halictus smeathmanellus Ky.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53150 | *Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53153 | *Halictus xanthopus K.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52915 | *Hypocrabro punctatus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52524 | *Macrophya montana (Scopoli, 1763)* | *Mouche-à-scie à trois bandes jaunes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53157 | *Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758)* | *Mégachile du rosier, Abeille découpeuse* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53158 | *Megachile circumcincta (Kirby, 1802)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53163 | *Megachile pyrenaea Pérez, 1890* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52414 | *Megalodontes klugi Leach, 1817* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52416 | *Megalodontes plagiocephalus (Fabricius, 1804)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52924 | *Metacrabro lituratus* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52544 | *Nematus lucidus (Panzer, 1801)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53026 | *Nitela spinolae Latreille, 1809* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53172 | *Osmia aurulenta (Panzer, 1799)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53173 | *Osmia bicolor (Schrank, 1781)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53177 | *Osmia diformis* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53181 | *Osmia gallarum Spinola, 1808* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53186 | *Osmia rufohirta Latreille, 1811* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53190 | *Osmia villosa Schnck* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53191 | *Osmia xanthomelaena Schk.* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53044 | *Passaloecus turionum Dahlbom, 1844* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52860 | *Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53047 | *Psenulus concolor (Dahlbom, 1843)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53048 | *Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53052 | *Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53056 | *Spilomena troglodytes (Vander Linden, 1829)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52594 | *Tenthredo amoena Gravenhorst, 1807* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52595 | *Tenthredo arcuata Förster, 1771* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 818491 | *Tenthredo eborina Klug, 1817* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52629 | *Tenthredopsis sordida (Klug, 1817)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52630 | *Tenthredopsis stigma (Fabricius, 1798)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 52753 | *Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53066 | *Trypoxylon clavicerum Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1828* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52651 | *Zaraea fasciata (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 247962 | *Acrobasis obliqua (Zeller, 1847)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247966 | *Acrobasis sodalella Zeller, 1848* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 789478 | *Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249542 | *Actinotia polyodon (Clerck, 1759)* | *Camomilière (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248109 | *Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809819 | *Amathes xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Trimaculée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716703 | *Anaitis plagiata (Linnaeus, 1758)* | *Triple Raie (La), Rayure commune (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248124 | *Anania funebris (Ström, 1768)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248123 | *Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 249389 | *Apamea crenata (Hufnagel, 1766)* | *Campagnarde (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249399 | *Apamea remissa (Hübner, 1809)* | *Brouillée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249403 | *Apamea sordens (Hufnagel, 1766)* | *Noctuelle basilaire (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 809657 | *Apatele alni (Linnaeus, 1767)* | *Aunette (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248933 | *Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)* | *Ennomos du Lilas (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 2003 - 2003 |
| | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 - 2003 |
| | 249036 | *Arctornis l-nigrum (O.F. Müller, 1764)* | *L-noir (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 521494 | *Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | |
| | 249288 | *Axylia putris (Linnaeus, 1761)* | *Noctuelle putride (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53915 | *Brenthis ino (Rottemburg, 1775)* | *Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54307 | *Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)* | *Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53315 | *Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)* | *Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248781 | *Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)* | *Eubolie sinuée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248782 | *Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Eubolie roussâtre (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249769 | *Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Alchimiste (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248274 | *Catoptria conchella (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248283 | *Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248275 | *Catoptria mytilella (Hübner, 1805)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809801 | *Celama confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)* | *Nole crêtée (La), Nole-Aigrette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249278 | *Chersotis margaritacea (Villers, 1789)* | *Noctuelle à l entier (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 784036 | *Chloroclystis coronata (Hübner, 1813)* | *Eupithécie couronnée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53959 | *Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)* | *Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | |
| | 219826 | *Colias alfacariensis Ribbe, 1905* | *Fluoré (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |
| | 54386 | *Colias australis Verity, 1911* | *Fluoré (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54414 | *Colias crocea Geoffroy, 1785* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54384 | *Colias hyale (Linnaeus, 1758)* | *Soufré (Le), Piéride soufrée (La), Soufre (Le), Faux Soufré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |
| | 249161 | *Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)* | *Noctuelle du Coudrier (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810299 | *Comibaena pustulata (Hufnagel, 1767)* | *Verdelet (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248313 | *Crambus perlella (Scopoli, 1763)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249787 | *Cryphia algae (Fabricius, 1775)* | *Bryophile vert-mousse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54029 | *Cupido minimus (Fuessly, 1775)* | *Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |
| | 782821 | *Cyclophora annulata (Schulze, 1775)* | *Ephyre omicron (L'), Phalène mariée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248412 | *Cyclophora linearia (Hübner, 1799)* | *Ephyre trilignée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248409 | *Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)* | *Ephyre trouée (L'), Ephyre ocellée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248410 | *Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)* | *Ephyre ponctuée (L'), Soutenue (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248243 | *Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716448 | *Drepana binaria (Hufnagel, 1767)* | *Hameçon (Le), Binaire (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 459072 | *Drepana cultraria (Fabricius, 1775)* | *Serpette (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248386 | *Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)* | *Incurvé (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248387 | *Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)* | *Faucille (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 459044 | *Ectropis consonaria (Hübner, 1799)* | *Boarmie du Tilleul (La), Boarmie convenable (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249095 | *Eilema lurideola (Zincken, 1817)* | *Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248931 | *Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Ennomos rongée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247885 | *Ephestia welseriella (Zeller, 1848)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248771 | *Epirrhoe alternata (O.F. Müller, 1764)* | *Alternée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249438 | *Episema glaucina (Esper, 1789)* | *Noctuelle du Muscari (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53487 | *Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248015 | *Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249261 | *Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Diarsie du Cornouiller (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248674 | *Eupithecia denotata (Hübner, 1813)* | *Eupithécie des Campanules (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248652 | *Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852* | *Eupithécie à tirets (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248655 | *Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)* | *Eupithécie distinguée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248637 | *Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)* | *Eupithécie du Boucage (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249525 | *Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)* | *Luisante (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53902 | *Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53895 | *Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)* | *Chiffre (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54734 | *Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Feuille-Morte du Peuplier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54732 | *Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)* | *Feuille-Morte du Chêne (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 521542 | *Gnophos ambiguatus (Duponchel, 1830)* | *Gnophos ambiguë (La), Gnophos incertaine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716708 | *Gnophos mucidaria (Hübner, 1799)* | *Gnophos moisie (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249478 | *Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Noctuelle de l'Oeillet (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249479 | *Hadena confusa (Hufnagel, 1766)* | *Noctuelle saupoudrée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249477 | *Hadena magnolii (Boisduval, 1828)* | *Dianthécie de Magnol (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53969 | *Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)* | *Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248820 | *Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)* | *Phalène sillonnée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809761 | *Hipparchia aelia (Hoffmansegg, 1804)* | *Petit Sylvandre (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53376 | *Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)* | *Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène (Le), Grand Sylvandre (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53391 | *Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)* | *Agreste (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54607 | *Hybocampa milhauseri (Fabricius, 1775)* | *Dragon (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54805 | *Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 813863 | *Hypochalcia bruandella (Guenée, 1845)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247986 | *Hypochalcia decorella (Hübner, 1810)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53736 | *Inachis io (Linnaeus, 1758)* | *Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |
| | 54475 | *Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)* | *Flambé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2003 - 2008 |
| | 163498 | *Iphiclides podalirius (Scopoli, 1763)* | *Flambé (Le)* | Passage, migration | | | | | |
| | 809648 | *Kanetisa circe (Fabricius, 1775)* | *Silène (Le), Circé (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53609 | *Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)* | *Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54636 | *Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Bombyx bicolore (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 809647 | *Limenitis rivularis (auct. non Scopoli, 1763)* | *Sylvain azuré (Le), Camille (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248764 | *Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)* | *Haltère (La), Phalène hexaptérate (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249347 | *Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Lupérine testacée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54168 | *Lycaeides argyrognomon (Bergsträsser, 1779)* | *Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249773 | *Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Ophiuse des pois à crapauds (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 782901 | *Lysandra argester (Bergsträsser, 1779)* | *Azuré du Mélilot (L'), Argus turquoise (L'), Azuré (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54271 | *Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | |
| | 54829 | *Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)* | *Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809825 | *Mamestra contigua (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Noctuelle contiguë (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 809826 | *Mamestra w-latinum (Hufnagel, 1766)* | *Noctuelle du Genêt (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | |
| | 248112 | *Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219812 | *Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)* | *Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2003 - 2008 |
| | 53817 | *Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)* | *Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2003 - 2008 |
| | 53794 | *Melitaea didyma (Esper, 1778)* | *Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219810 | *Melitaea parthenoides Keferstein, 1851* | *Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53811 | *Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53827 | *Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)* | *Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | |
| | 54815 | *Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)* | *Sphinx du Tilleul (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 822062 | *Moma orion (Esper, 1791)* | *Avrilière (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249252 | *Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775* | *Casque (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53337 | *Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | |
| | 54586 | *Ochrostigma melagona (Borkhausen, 1790)* | *Ardoisée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248170 | *Opsibotys fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 345352 | *Panthea coenobita (Esper, 1785)* | *Cénobite (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2003 - 2008 |
| | 781926 | *Paradiarsia punicea (Hübner, 1803)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2003 - 2008 |
| | 249058 | *Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)* | *Matrone (La), Écaille brune (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54573 | *Peridea anceps (Goeze, 1781)* | *Timide (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248732 | *Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)* | *Périzome coupée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809796 | *Philea irrorella (Linnaeus, 1758)* | *Endrosie diaphane (L'), Callimorphe arrosée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248976 | *Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)* | *Numérie poudrée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219775 | *Plebeius argus (Linnaeus, 1758)* | *Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 2003 - 2008 |
| | 810360 | *Polyploca diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Cymatophore délayée (La), Diluée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 643423 | *Procris geryon (Hübner, 1813)* | *Procris de l'Hélianthème (Le), Turquoise des Hélianthèmes (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 248824 | *Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)* | *Hémithée du Genêt (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53255 | *Pyrgus fritillarius (Poda, 1761)* | *Hespérie du Carthame (L'), Bigarré (Le), Grande Hespéride (La), Plain-Chant (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53691 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |
| | 54322 | *Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)* | *Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248750 | *Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)* | *Hachée (La), Mélanippe hastée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716841 | *Satyrus dryas (Scopoli, 1763)* | *Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248506 | *Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)* | *Frange picotée (La), Acidalie picotée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248499 | *Scopula ornata (Scopoli, 1763)* | *Acidalie ornée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248512 | *Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847)* | *Acidalie virginale (L'), l'Acidalie ponctuée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248496 | *Scopula umbelaria (Hübner, 1813)* | *Acidalie des ombelles (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248498 | *Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Acidalie striée (L'), Acidalie sillonnée.(L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809807 | *Scotia ipsilon (Hufnagel, 1766)* | *Noctuelle baignée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248018 | *Selagia spadicella (Hübner, 1796)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 416995 | *Sideridis albicolon Hübner, 1813* | *Tréma blanc (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248138 | *Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54801 | *Sphinx ligustri Linnaeus, 1758* | *Sphinx du Troène (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 778311 | *Spilosoma menthastri (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Ecaille tigrée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 810147 | *Sterrha macilentaria (Herrich-Schäffer, 1846)* | *Acidalie maigre (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 774482 | *Strymonidia acaciae (Fabricius, 1787)* | *Thécla de l'Amarel (La), Thécla de l'Acacia (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249503 | *Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)* | *Noctuelle cythérée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54319 | *Thecla betulae (Linnaeus, 1758)* | *Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |
| | 779802 | *Thersamonia dispar (Haworth, 1802)* | *Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53326 | *Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808)* | *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219742 | *Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)* | *Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | 1997 - 2008 |
| | 716701 | *Titanio pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809651 | *Trichopteryx sertata (Hübner, 1817)* | *Lobophore de l'Erable (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248745 | *Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)* | *Incertaine (L'), Dent-de-Scie (La), Douteuse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249672 | *Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Herminie olivâtre (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 249051 | *Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)* | *Goutte-de-sang , Carmin (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248181 | *Udea cyanalis (La Harpe, 1855)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 248261 | *Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 809783 | *Zanclognatha tarsicrinalis (Knoch, 1782)* | *Herminie de la Ronce (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247044 | *Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)* | *Zygène de la Petite coronille (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 716757 | *Zygaena hippocrepidis (Hübner, 1799)* | *Zygène de l'Hippocrépide (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 247059 | *Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)* | *Zygène des bois (La), Zygène du Trèfle-de-montagne (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 247047 | *Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-Cheval (La), Zygène de la Faucille (La), Zygène de l'Hippocrepis (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247041 | *Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Zygène diaphane (La), Zygène des Boucages (La)* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 247057 | *Zygaena transalpina (Esper, 1780)* | *Zygène transalpine (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247060 | *Zygaena trifolii (Esper, 1783)* | *Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 247054 | *Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Zygène des Thérésiens (La), Zygène de la Jarosse (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lichens | 55352 | *Normandina pulchella (Borrer) Nyl.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 56646 | *Solorina saccata (L.) Ach.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Mammifères | 61510 | *Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)* | *Mulot sylvestre* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61290 | *Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)* | *Campagnol roussâtre* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61648 | *Glis glis (Linnaeus, 1766)* | *Loir gris, Loir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60506 | *Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)* | *Vespère de Savi* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61675 | *Lepus capensis auct.* | *Lièvre d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | *Blaireau européen* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61379 | *Microtus arvalis (Pallas, 1778)* | *Campagnol des champs* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60430 | *Myotis daubentoni* | *Murin de Daubenton* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60461 | *Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)* | *Noctule de Leisler* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | *Pipistrelle commune* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 - 2003 |
| | 65290 | *Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)* | *Orthétrum brun (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Mora F. | | | | 2003 - 2003 |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 - 2003 |
| | 65348 | *Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)* | *Sympétrum vulgaire (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 3558 | *Apus melba (Linnaeus, 1758)* | *Martinet à ventre blanc, Martinet alpin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | *Chardonneret élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | *Pigeon colombin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | *Grand corbeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Pèlerin Jura | | | | 2006 - 2011 |
| | 4494 | *Corvus monedula Linnaeus, 1758* | *Choucas des tours* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3703 | *Delichon urbica (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de fenêtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 4663 | *Emberiza cia Linnaeus, 1766* | *Bruant fou* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | *Bruant zizi* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette grise* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Morin C. | | | | 2006 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | *Rougequeue noir* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4269 | *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)* | *Pouillot de Bonelli* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | *Pouillot siffleur* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 4247 | *Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette babillarde* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Reproduction indéterminée | Informateur : Morin C. | | | | 2006 - 2006 |
| Orthoptères | 65955 | *Arachnocephalus vestitus Costa, 1855* | *Grillon des Cistes* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66067 | *Arcyptera fusca (Pallas, 1773)* | *Arcyptère bariolée, Poupée sibérienne, Criquet bariolé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65627 | *Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798)* | *Barbitiste des bois, Barbitiste, Barbitiste queue-en-scie* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66268 | *Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)* | *Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66130 | *Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758)* | *Criquet des adrets, Criquet des soulanes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66141 | *Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)* | *Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66138 | *Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)* | *Criquet duettiste, Sauteriot* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Mora F. | | | | 2008 - 2008 |
| | 66136 | *Chorthippus mollis (Charpentier, 1825)* | *Criquet des jachères* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 66161 | *Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet des pâtures, Oedipode parallèle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 66134 | *Chorthippus vagans (Eversmann, 1848)* | *Criquet des Pins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65497 | *Chrysochraon brachyptera (Ocskay, 1826)* | *Criquet des Genévriers* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66077 | *Chrysochraon dispar (Germar, 1834)* | *Criquet des clairières* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 65878 | *Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)* | *Conocéphale des Roseaux* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65687 | *Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)* | *Dectique verrucivore, Sauterelle à sabre, Sauterelle rondue, Dectique commun, Dectique* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65649 | *Ephippiger ephippiger (auct. non Fiebig, 1784)* | *Ephippigère des vignes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66173 | *Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)* | *Criquet des mouillères, Criquet des Bromes* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 66113 | *Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)* | *Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65910 | *Gryllus campestris Linnaeus, 1758* | *Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri,Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2003 |
| | 65721 | *Metrioptera bicolor (Philippi, 1830)* | *Decticelle bicolore* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 65932 | *Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)* | *Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66194 | *Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)* | *OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66085 | *Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)* | *Criquet rouge-queue* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66088 | *Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet noir-ébène* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 66089 | *Omocestus ventralis (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet noir-ébène* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65613 | *Phaneroptera falcata (Poda, 1761)* | *Phanéroptère commun, Phanéroptère porte-faux, Phanéroptère en faulx, Phanéroptère en faux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 65740 | *Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)* | *Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65697 | *Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)* | *Decticelle grisâtre, Dectique gris* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 66178 | *Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)* | *OEdipode stridulante* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66100 | *Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)* | *Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| | 66103 | *Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838)* | *Sténobothre nain* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66034 | *Tetrix nutans Hagenbach, 1822* | *Tétrix des carrières, Tétrix des sablières* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66032 | *Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)* | *Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65774 | *Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)* | *Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. et Terret P. | | | | 2008 |
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79770 | *Acer opalus Mill., 1768* | *Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79779 | *Acer platanoides L., 1753* | *Érable plane, Plane* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79816 | *Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton, 1789* | *Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80070 | *Aconitum vulparia Rchb., 1819* | *Coqueluchon jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80591 | *Agrostis capillaris L., 1753* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 131208 | *Allium senescens subsp. montanum (Fr.) Holub, 1970* | *Ail des collines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81520 | *Allium sphaerocephalon L., 1753* | *Ail à tête ronde* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82104 | *Amelanchier rotundifolia Dum.Cours., 1811* | *Amélanchier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82288 | *Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817* | *Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82909 | *Anthericum ramosum L., 1753* | *Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82999 | *Anthyllis vulneraria L., 1753* | *Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83279 | *Arabis alpina L., 1753* | *Arabette des Alpes, Corbeille-d'argent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83332 | *Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772* | *Arabette poilue, Arabette hérissée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83420 | *Arabis turrita L., 1753* | *Arabette Tourette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83653 | *Arenaria serpyllifolia L., 1753* | *Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tâcheté, Chandelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84306 | *Asperula cynanchica L., 1753* | *Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84962 | *Athamanta cretensis L., 1753* | *Athamanthe de Crète* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85536 | *Barbarea intermedia Boreau, 1840* | *Barbarée intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2008 |
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85774 | *Berberis vulgaris L., 1753* | *Épine-vinette, Berbéris commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86087 | *Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762* | *Chlorette, Chlore perfoliée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2003 |
| | 86289 | *Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode penné* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | *Bromus erectus Huds., 1762* | *Brome érigé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86680 | *Bromus mollis L., 1762* | *Brome mou* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87044 | *Bupleurum falcatum L., 1753* | *Buplèvre en faux, Percefeuille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87329 | *Calamintha acinos (L.) Clairv., 1811* | *Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87652 | *Campanula glomerata L., 1753* | *Campanule agglomérée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87720 | *Campanula rotundifolia L., 1753* | *Campanule à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88108 | *Carduus defloratus L., 1759* | *Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88324 | *Carex alba Scop., 1772* | *Laîche blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88389 | *Carex brachystachys Schrank, 1789* | *Laîche à épis court, Laîche maigre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88415 | *Carex caryophyllea Latourr., 1785* | *Laîche printanière, Laîche du printemps* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88459 | *Carex davalliana Sm., 1800* | *Laîche de Davall, Carex de Davall* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88470 | *Carex digitata L., 1753* | *Laîche digitée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | *Carex flava L., 1753* | *Laîche jaunâtre, Laîche jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88538 | *Carex glauca Scop., 1772* | *Laîche glauque, Langue-de-pic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88578 | *Carex hostiana DC., 1813* | *Laîche blonde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2003 |
| | 88582 | *Carex humilis Leyss., 1758* | *Laîche humble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88691 | *Carex montana L., 1753* | *Laîche des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2003 - 2008 |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche millet, Faux Fenouil* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88802 | *Carex pulicaris L., 1753* | *Laîche puce, Carex pucier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88916 | *Carex tomentosa L., 1767* | *Laîche tomenteuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89180 | *Carlina vulgaris L., 1753* | *Carline commune, Chardon doré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | *Carpinus betulus L., 1753* | *Charme, Charmille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89660 | *Centaurea pannonica* | *Centaurée de Pannonie* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 89697 | *Centaurea scabiosa L., 1753* | *Centaurée scabieuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 133005 | *Centaurea scabiosa subsp. tenuifolia (Gaudin) Arcang., 1882* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89860 | *Centaurium umbellatum sensu P.Fourn., 1938* | *Erythrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89927 | *Cephalanthera pallens (Sw.) Rich., 1818* | *Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89968 | *Cerastium arvense L., 1753* | *Céraiste des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89981 | *Cerastium caespitosum Gilib. ex Asch., 1864* | *Céraiste commun , Mouron d'alouette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90076 | *Cerastium pumilum Curtis, 1777* | *Céraiste nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90091 | *Cerastium semidecandrum L., 1753* | *Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90905 | *Chlora perfoliata (L.) L., 1767* | *Chlorette, Chlore perfoliée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91053 | *Chrysanthemum leucanthemum L., 1753* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91274 | *Cirsium acaule Scop., 1769* | *Cirse sans tige* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92127 | *Colchicum autumnale L., 1753* | *Colchique d'automne, Safran des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | *Muguet, Clochette des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92517 | *Coronilla emerus L., 1753* | *Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92543 | *Coronilla vaginalis Lam., 1786* | *Coronille engainée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 1987 - 2003 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93015 | *Crepis biennis L., 1753* | *Crépide bisannuelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94111 | *Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845* | *Cytise pédonculé, Cytise retombant, Cytise rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2003 |
| | 94169 | *Cytisus supinus L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie, Sieglingie retombante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94435 | *Daphne mezereum L., 1753* | *Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94618 | *Dentaria pinnata Lam., 1786* | *Dentaire pennée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94717 | *Dianthus caryophyllus L., 1753* | *Oeillet giroflée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94836 | *Dianthus sylvestris Wulfen, 1786* | *Pipolet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95289 | *Draba aizoides L., 1767* | *Drave Faux Aïzoon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96208 | *Epilobium montanum L., 1753* | *Épilobe des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96431 | *Epipactis atropurpurea Raf., 1810* | *Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96448 | *Epipactis latifolia All., 1785* | *Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96465 | *Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769* | *Épipactis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Guyonneau J. et Beaufils T. | | | | 2003 |
| | 96852 | *Eriophorum latifolium Hoppe, 1800* | *Linaigrette à feuilles larges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97008 | *Erophila verna (L.) Chevall., 1827* | *Drave de printemps* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97903 | *Euonymus vulgaris Mill., 1768* | *Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97490 | *Euphorbia cyparissias L., 1753* | *Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97502 | *Euphorbia dulcis L., 1753* | *Euphorbe douce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97801 | *Euphrasia rostkoviana Hayne, 1825* | *Euphraise des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97811 | *Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809* | *Euphraise raide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98097 | *Festuca bastardii Kerguélen & Plonka, 1988* | *Fétuque de Léman* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98258 | *Festuca glauca Vill., 1787* | *Fétuque glauque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98334 | *Festuca lemanii Bastard, 1809* | *Fétuque de Léman* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98433 | *Festuca patzkei Markgr.-Dann., 1978* | *Fétuque de Patzke* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99028 | *Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847* | *Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99367 | *Galium album Lam., 1779* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99582 | *Galium verum L., 1753* | *Gaillet jaune, Caille-lait jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99754 | *Genista germanica L., 1753* | *Genêt d'Allemagne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2003 - 2003 |
| | 99798 | *Genista pilosa L., 1753* | *Genêt poilu, Genêt velu, Genette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99828 | *Genista tinctoria L., 1753* | *Genêt des teinturiers, Petit Genêt* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99846 | *Genistella sagittalis (L.) Gams, 1923* | *Genêt ailé, Genistrolle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99889 | *Gentiana germanica Willd., 1798* | *Gentianelle d'Allemagne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99903 | *Gentiana lutea L., 1753* | *Gentiane jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium des colombes, Pied de pigeon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100149 | *Geranium sanguineum L., 1753* | *Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100356 | *Globularia vulgaris L., 1753* | *Globulaire commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100607 | *Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813* | *Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100904 | *Helianthemum canum (L.) Hornem., 1815* | *Hélianthème blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 135215 | *Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Celak.) Holub, 1964* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100964 | *Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal, 1824* | *Herbe d'or* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101188 | *Helleborus foetidus L., 1753* | *Hellébore fétide, Pied-de-griffon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102055 | *Hieracium humile Jacq., 1777* | *Épervière peu élevée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102235 | *Hieracium murorum L., 1753* | *Épervière des murs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | *Piloselle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102842 | *Hippocrepis comosa L., 1753* | *Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103298 | *Hypericum maculatum Crantz, 1763* | *Millepertuis maculé, Millepertuis taché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103648 | *Inula salicina L., 1753* | *Inule à feuilles de saule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104200 | *Juncus glaucus Ehrh. ex Sibth., 1794* | *Jonc glauque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | *Juniperus communis L., 1753* | *Genévrier commun, Peteron* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104516 | *Knautia arvensis (L.) Coult., 1828* | *Knautie des champs, Oreille-d'âne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104557 | *Knautia sylvatica sensu H.J.Coste, 1903 non Reichard* | *Knautie à feuilles de Cardère* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104615 | *Koeleria cristata (L.) Bertol., 1819* | *Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104665 | *Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812* | *Koelérie pyramidale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104764 | *Lactuca perennis L., 1753* | *Laitue vivace, Lâche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier Galéobdolon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105076 | *Laserpitium latifolium L., 1753* | *Laser à feuilles larges, Laser blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105226 | *Lathyrus montanus Bernh., 1800* | *Gesse des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105280 | *Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800* | *Gesse printanière, Orobe printanier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | *Leontodon hispidus L., 1753* | *Liondent hispide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105768 | *Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch) Gremli, 1898* | *Leucanthème brûlé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troëne, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106288 | *Linum catharticum L., 1753* | *Lin purgatif* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106370 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Grande Listère* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106595 | *Lonicera xylosteum L., 1753* | *Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107795 | *Melampyrum pratense L., 1753* | *Mélampyre des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107851 | *Melica ciliata L., 1753* | *Mélique ciliée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107871 | *Melica nutans L., 1753* | *Mélique penchée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | *Melica uniflora Retz., 1779* | *Mélique uniflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108003 | *Melittis melissophyllum L., 1753* | *Mélitte à feuilles de Mélisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108361 | *Mercurialis perennis L., 1753* | *Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108537 | *Milium effusum L., 1753* | *Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108686 | *Moehringia muscosa L., 1753* | *Moehringie mousse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110236 | *Ononis spinosa L., 1753* | *Bugrane épineuse, Arrête-boeuf* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110392 | *Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802* | *Ophrys bourdon, Ophrys frelon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110410 | *Ophrys insectifera L., 1753* | *Ophrys mouche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | *Orchis maculata L., 1753* | *Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110914 | *Orchis mascula (L.) L., 1755* | *Orchis mâle, Herbe à la couleuvre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110920 | *Orchis militaris L., 1753* | *Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110927 | *Orchis morio L., 1753* | *Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111012 | *Orchis ustulata L., 1753* | *Orchis brûlé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111289 | *Origanum vulgare L., 1753* | *Origan commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111556 | *Orobanche gracilis Sm., 1798* | *Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111686 | *Orobanche teucrii Holandre, 1829* | *Orobanche de la germandrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112421 | *Paris quadrifolia L., 1753* | *Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112426 | *Parnassia palustris L., 1753* | *Parnassie des marais, Hépatique blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2003 - 2003 |
| | 112844 | *Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr., 1813* | *Peucédan Herbe aux cerfs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | *Phyteuma spicatum L., 1753* | *Raiponce en épi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113639 | *Pinguicula vulgaris L., 1753* | *Grassette commune, Grassette vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113906 | *Plantago media L., 1753* | *Plantain moyen* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114011 | *Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817* | *Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114160 | *Poa compressa L., 1753* | *Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114524 | *Polygala amara* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 114539 | *Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837* | *Polygale du calcaire, Polygala du calcaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114545 | *Polygala comosa Schkuhr, 1796* | *Polygala chevelu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114595 | *Polygala vulgaris L., 1753* | *Polygala commun, Polygala vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114612 | *Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906* | *Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114616 | *Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115482 | *Potentilla fragariastrum Ehrh., 1792* | *Potentille faux fraisier, Potentille stérile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115672 | *Potentilla tabernaemontani Asch., 1891* | *Potentille de Tabernaemontanus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | *Potentilla tormentilla Neck., 1770* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115695 | *Potentilla verna sensu L., 1753* | *Potentille à grandes fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115900 | *Primula officinalis Hill, 1765* | *Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116096 | *Prunus mahaleb L., 1753* | *Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116411 | *Pulmonaria angustifolia L., 1753* | *Pulmonaire à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116460 | *Pulsatilla vulgaris Mill., 1768* | *Pulsatille vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116543 | *Pyrola minor L., 1753* | *Petite pyrole* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116712 | *Quercus lanuginosa (Lam.) Thuill., 1799* | *Chêne pubescent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | *Quercus pedunculata Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116768 | *Quercus sessiliflora Salisb., 1796* | *Chêne à trochets* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116948 | *Ranunculus breyninus Crantz, 1763* | *Renoncule des bois, Renoncule de Breyne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117528 | *Rhamnus alpina L., 1753* | *Nerprun des Alpes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117530 | *Rhamnus cathartica L., 1753* | *Nerprun purgatif* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117533 | *Rhamnus frangula L., 1753* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117616 | *Rhinanthus minor L., 1756* | *Petit cocriste, Petit Rhinanthe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117748 | *Ribes alpinum L., 1753* | *Groseillier des Alpes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118016 | *Rosa arvensis Huds., 1762* | *Rosier des champs, Rosier rampant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118073 | *Rosa canina L., 1753* | *Rosier des chiens, Rosier des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118402 | *Rosa pimpinellifolia L., 1759* | *Rosier à feuilles de Boucage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119149 | *Rubus idaeus L., 1753* | *Framboisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120685 | *Salvia pratensis L., 1753* | *Sauge des prés, Sauge commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120753 | *Sanguisorba minor Scop., 1771* | *Pimprenelle à fruits réticulés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120967 | *Saxifraga aizoon Jacq., 1778* | *Saxifrage aizoon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121201 | *Saxifraga tridactylites L., 1753* | *Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121334 | *Scabiosa columbaria L., 1753* | *Scabieuse colombaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121999 | *Scrophularia auriculata L., 1753* | *Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2002 - 2002 |
| | 140834 | *Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa Dumort., 1827* | *Herbe aux écrouelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Guyonneau J. | | | | 2003 - 2003 |
| | 122101 | *Sedum acre L., 1753* | *Poivre de muraille, Orpin acre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122106 | *Sedum album L., 1753* | *Orpin blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122207 | *Sedum mite Gilib., 1782* | *Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122267 | *Sedum telephium L., 1753* | *Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122596 | *Senecio erucifolius L., 1755* | *Séneçon à feuilles de Roquette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122671 | *Senecio nemorensis sensu P.Fourn., 1939 non L., 1753* | *Séneçon hercynien* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 123032 | *Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Libanotis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123037 | *Seseli montanum L., 1753* | *Séséli des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123068 | *Sesleria albicans Kit. ex Schult., 1814* | *Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 141090 | *Sideritis hyssopifolia subsp. hyssopifolia L., 1753* | *Thé des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Ferrez Y. et Guyonneau J. | | | | 2001 - 2003 |
| | 123509 | *Silene inflata Sm., 1800* | *Tapotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123568 | *Silene nutans L., 1753* | *Silène nutans, Silène penché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | *Solidago virgaurea L., 1753* | *Solidage verge d'or, Herbe des Juifs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | *Sorbus aria (L.) Crantz, 1763* | *Alouchier, Alisier blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Épiaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124805 | *Stachys recta L., 1767* | *Épiaire droite* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | *Succisa praemorsa Asch., 1864* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125447 | *Tamus communis L., 1753* | *Sceau de Notre Dame* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125643 | *Taraxacum laevigatum (Willd.) DC., 1813* | *Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125677 | *Taraxacum officinale Weber, 1780* | *Pissenlit* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125816 | *Taxus baccata L., 1753* | *If à baies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125946 | *Tetragonolobus siliquosus Roth, 1788* | *Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125981 | *Teucrium chamaedrys L., 1753* | *Germandrée petit-chêne, Chênette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126008 | *Teucrium montanum L., 1753* | *Germandrée des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126367 | *Thlaspi montanum L., 1754* | *Tabouret bleuâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126564 | *Thymus praecox Opiz, 1824* | *Thym précoce, Serpolet couchet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 126566 | *Thymus pulegioides L., 1753* | *Thym commun, Thym faux Pouliot* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126573 | *Thymus serpyllum L., 1753* | *Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126628 | *Tilia cordata Mill., 1768* | *Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126650 | *Tilia platyphyllos Scop., 1771* | *Tilleul à grandes feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127395 | *Trifolium montanum L., 1753* | *Trèfle des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127463 | *Trifolium rubens L., 1753* | *Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale, Valériane des collines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129022 | *Veronica teucrium L., 1762* | *Teucride d'Allemagne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne mancienne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129470 | *Vinca minor L., 1753* | *Petite pervenche, Violette de serpent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129477 | *Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790* | *Dompte-venin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129482 | *Vincetoxicum officinale Moench, 1794* | *Dompte-venin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129586 | *Viola hirta L., 1753* | *Violette hérissée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129669 | *Viola riviniana Rchb., 1823* | *Violette de Rivinus, Violette de rivin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129696 | *Viola silvestris auct.* | *Violette des bois, Violette de Reichenbach* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptéridophytes | 84521 | *Asplenium ruta-muraria L., 1753* | *Doradille rue des murailles, Rue des murailles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84534 | *Asplenium trichomanes L., 1753* | *Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95592 | *Dryopteris robertiana (Hoffm.) C.Chr., 1905* | *Polypode du calcaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96508 | *Equisetum arvense L., 1753* | *Prêle des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110313 | *Ophioglossum vulgatum L., 1753* | *Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Vadam J.-C. | | | | 1992 - 1992 |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | *Orvet fragile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77600 | *Lacerta agilis Linnaeus, 1758* | *Lézard des souches* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | *Vipère aspic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 212 | *Bombina variegata (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Crustacés | 18437 | *Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain *(lien)* |
| Insectes | 53615 | *Lopinga achine (Scopoli, 1763)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60330 | *Rhinolophus euryale Blasius, 1853* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 60461 | *Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60506 | *Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60612 | *Lynx lynx (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| Oiseaux | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2818 | *Mergus merganser Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2938 | *Falco peregrinus Tunstall, 1771* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3493 | *Bubo bubo (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3540 | *Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3582 | *Merops apiaster Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3688 | *Riparia riparia (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3692 | *Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4247 | *Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4269 | *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4494 | *Corvus monedula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4663 | *Emberiza cia Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 69378 | *Zingel asper (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77600 | *Lacerta agilis Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 94435 | *Daphne mezereum L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 94717 | *Dianthus caryophyllus L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 94756 | *Dianthus gratianopolitanus Vill., 1789* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 99903 | *Gentiana lutea L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Gymnospermes | 125816 | *Taxus baccata L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Caillet M. | 1999 | Etude des macromycètes de la partie non exploitée de la forêt du Ravin de Valbois. Etude financée par le ministère de l'environnement et de l'amménagement du territoire. 8 p., 13 tableaux. |
| | Caillet M, Chipon B et Vadam JC | 2000 | Sortie pluridisciplinaire au ravin de Valbois (25) dimanche 25 juin 2000. Complément bryologiques et apports nouveaux en lichénologie. Bull. soc. hist. nat. du Pays de Montbéliard, pp 161 - 167 |
| | Carteron M. | 1980 | Protection et gestion des espaces naturels de Franche-Comté. Publication de la DRAE. 2Volumes + cartes. Besançon. |
| | Cretin JY et Robert JC | | données préliminaires à l'étude écofaunistique d'un plateau calcaire dans le Jura français. Les Hyménoptères aculeates (exceptés formicoides et apoides). An. scein. uni Besançon. Bio an. 3ème série, fasc 4, p 41-50. |
| | CSP/Diren | 2003 | Etat des populations de l'apron du Rhône (Zingel asper) en région Franche-Comté, volet 1 : synthèse et valorisation des connaissances actuelles sur la présence de l'espèce, 18 p |
| | CSP/Diren | 2005 | Etat des populations de l'apron du Rhône (Zingel asper) en région Franche-Comté, volet 2 : aire de répartition actuelle de l'espèce, 38 p |
| | DIDIER B. | 1976 | Les sites botaniques remarquables du Doubs. Labo de Phyto Besançon, Bull Univers |
| | Ferrez Y. | 2000 | Inventaire floristique de la réserve naturelle du ravin de Valbois. Doubs Nature Environnement. |
| | FERREZ Y. | 1996 | Typologie, répartition et gestion des formations d'éboulis en Franche-Comté. |
| | Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron M., Millet P., Piguet A. et Vadam J.-C. | 2001 | Atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté, Besançon, Société d'horticulture du Doubs et des amis du jardin botanique, Turriers, Naturalia Publications. 310 p. |
| | Gillet F | | Végétation muscinale et phytocénoses de la réserve de Valbois (Doubs). Les cahiers de l'environnement n° 6, non paginé. |
| | Gillet F et Michalet P | | Etude phytosociologique du vallon de Valbois. Bull univers 13, Besançon 7-19. |
| | Mora F. | 2002 | Désignation des enjeux entomologiques et mise en évidence des zones d'intérêt de la Combe d'Ain. OPIE et DIREN FC, 22 fiches |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Morin C et Paul J-P | 2006 | Inventaires ornithologiques des Zones de Protection Spéciales (ZPS) des vallées de la Loue et du Lison. Etat initial faisant suite à la désignation des sites au titre de la Directive "oiseaux". GNFC, Syndicat mixte de la Loue, DIREN Franche-Comté et Union européenne : 27 p. + annexes |
| | Pottier Alapetite G. | | Recherches phytosociologique et historiques sur la végétation du Jura central et sur les origines de la flore jurassienne. Thèse, Univ. Grenoble. 333p. |
| | Prouteau C et Robert JC | | Contribution à l'étude écofaunistique d'un plateau calcaire dans le Jura français. Les Acridiens. An. de l'Uni. Besançon zoo., physiologie et Bio anim, 3ème série, fas 10, p 71-86 |
| | Réal P et Robert JC | 1980 | La faune des lépidoptères d'une corniche de la moyenne Loue (Doubs). Les éléments écologiques remarquables. Publication de la section de biologie et d'écologie animale de la section de Bonnevaux. |
| | Royer J. M. | 1987 | Les pelouses des Festuco-Brometea : d'un exemple régional à une vision eurosibérienne. Etude phytosociologique et phytogéographique. Thèse Univ. Besançon : 424 p. |
| | SHNPM | 1978 | les reculées du Jura central. Compte rendu de l'excursion de la SHNPM de juin 1978. Montbéliard, 5 p. |
| | Vadam JC | | compte-rendu de la sortie de la SHNPM au rocher de Colonne et dans la vallée de la Bonneille. |
| | Vadam J.-C. et Caillet M. | 1999 | Bryosociologie du ravin de Valbois. Bull. soc. hist. nat. du Pays de Montbéliard, pp 139 - 177 |
| Informateur | Collin P. | | |
| | Cremille J. | | |
| | Ecotope Faune Flore | | |
| | Ferrez Y. | | |
| | Ferrez Y. et al | | |
| | Ferrez Y. et Guyonneau J. | | |
| | Gillet F. | | |
| | GNFC | 2004 | |
| | GNFC | | |
| | Groupe Pèlerin Jura | | |
| | Guyonneau J. | | |
| | Guyonneau J. et Beaufils T. | | |
| | Mora F. | | |
| | Mora F. et Terret P. | | |
| | Morin C. | | |
| | Morin C. et Paul J.-P. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Vadam J.-C. | | |