



ROCHER DE TIAVY (Identifiant national : 430009472)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 40000025)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, . - 430009472, ROCHER DE TIAVY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009472.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 880356°-2169302°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 15 |
| 9. SOURCES | 15 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Longchaumois (INSEE : 39297)
- Commune : Prémanon (INSEE : 39441)

1.2 Superficie

29,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 997

Maximale (mètre): 1199

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [430007723](#) - PLATEAU DU MONT FIER, COMBES BERTHOD ET DU MONT FIER, ROCHERS DE PELLAS ET THIAVY (Type 2) (Id reg. : 40300000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

A l'ouest de Prémanon, le Rocher du Tiavy s'avance parallèlement au synclinal perché du Mont Fier. Ses versants forestiers escarpés sont surmontés d'un superbe linaire de falaises calcaires et d'éboulis, constituant un très bel ensemble paysager caractéristique de la partie jurassienne de la Franche-Comté, prolongé au nord-ouest par la longue barre rocheuse des Arcets.

Les habitats rencontrés sur le Rocher du Tiavy présentent un fort intérêt patrimonial en raison de leur nature primaire et de leur fonction de refuge pour de nombreuses espèces très spécialisées. L'ampleur des contrastes hydriques et thermiques et l'instabilité du substrat des milieux rocheux sélectionnent en effet les espèces les mieux adaptées à la rudesse des conditions écologiques de ces milieux, dont de nombreuses plantes méditerranéo-montagnardes.

Sur la corniche du Rocher du Tiavy, une bande de quelques mètres de large est colonisée par un gazon très coloré au moment de la floraison de fin de printemps. Il s'agit de la pelouse xérophile à genêt poilu et laser siler, seul groupement en mesure de se maintenir dans de telles conditions de sécheresse. Localement, la fissuration de la roche s'accompagne d'une accumulation de débris organiques sur lesquels parvient à se développer une fruticée thermophile montagnarde à cytise des Alpes. En contrebas, les anfractuosités de la paroi verticale sont investies par des espèces caractéristiques des stations rocheuses ensoleillées, telles que la laïche à épis court, l'épervière embrassante, l'athamanthe de Crête et le grêle kernéra des rochers. Le grand corbeau et l'hirondelle de rochers bénéficient des nombreuses cavités naturelles et corniches pour nicher.

Au pied des barres rocheuses, la vigueur de la pente et la trop grande instabilité des éboulis, issus du délitement de la paroi par gélifraction, ne permettent pas la colonisation forestière. Cette situation est plutôt favorable à un groupement original de pierriers thermophiles montagnards qui abrite notamment le stipe calamagrostide et qui est imbriqué avec une pelouse très alticole dominée par le brome dressé, auxquels se joignent des espèces subalpines comme la laïche toujours verte et l'achémille de Hoppe.

Le reste du Rocher de Tiavy est occupé par une forêt déclinée en plusieurs types selon le substrat et l'exposition. Sur les pentes les plus froides, la hêtraie à tilleul s'accommode des éboulis grossiers tandis que la hêtraie-sapinière à dentaire préfère les matériaux plus fins en contrebas. Toutes deux accueillent un cortège d'espèces hygrosциaphiles comme la dentaire pennée, le polystic à aiguillons et l'actée en épis. A l'opposé, les stations bien exposées parsemées d'éboulis fins ou les replats situés en arrière des corniches sont le domaine d'une hêtraie sèche à laïche blanche, potentiellement riche en espèces patrimoniales. Enfin, le fond de petits talwegs est propice à une hêtraie à érable au sous-bois constitué d'une mégaphorbiaie à adénostyle à feuilles d'alliaire et fougère femelle. Proche de la hêtraie-érablaie subalpine, ce groupement abrite notamment la circée intermédiaire protégée en Franche-Comté.

STATUT DE PROTECTION

La tranquillité du faucon pèlerin est assurée pendant la période de nidification par un arrêté préfectoral de protection de biotope depuis le 2 juin 1982. De plus, la présence de plusieurs espèces végétales et animales protégées assure aussi indirectement la protection de cette zone puisque est interdit tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu (arrêtés ministériels : 22.06.92 pour les plantes et 17.04.81 pour les oiseaux).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Les deux principales mesures à mettre en œuvre concernent le respect de l'interdiction de dérangement de l'avifaune en période de nidification et la limitation du piétinement sur la corniche. Par ailleurs, les faibles potentialités forestières des forêts de pente en matière d'exploitation économique plaident en faveur d'une gestion jardinatoire ou pied à pied, voire même d'un abandon de l'exploitation.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale
- Eboulis

- Crête

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i> | | | | |
| | 61.3 <i>Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i> | | | | |
| | 41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Tilio-Fagetum

Dentario-Fagetum

Carici albae - Fagetum

hêtraie-érablaie

mégaphorbiaie à adénostyles à feuilles d'alliaire et la fougère femelle = groupement rappelant la hêtraie-érablaie subalpine,

Achnatherion

Mesobromion

Potentillion caulescentis

Genisto - Laserpitietum

Cotoneastro - Amelanchierietum

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Pèlerin Jura | | 5 | | 2007 - 2010 |
| Phanérogames | 91267 | <i>Circaea x intermedia</i> Ehrh., 1789 | <i>Circée intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125133 | <i>Stipa calamagrostis</i> (L.) Wahlenb., 1813 | <i>Calamagrostide argentée, Stipe Calamagrostide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61119 | <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chamois</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grimpereau des bois</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Grand corbeau | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe Pèlerin Jura | | 1 | | 2007 - 2009 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familial | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Geai des chênes | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Bec-croisé des sapins | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4367 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 | Mésange noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange huppée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4355 | <i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827 | Mésange boréale | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Accenteur mouchet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Bouvreuil pivoine | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | Roitelet à triple bandeau | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Roitelet huppé | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore, Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80137 | <i>Actaea spicata</i> L., 1753 | <i>Actée en épi, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80183 | <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871 | <i>Adenostyle à feuilles d'alliaire, Adénostyle à têtes blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81143 | <i>Alchemilla plicatula</i> Gand., 1883 | <i>Alchémille de Hoppe, Alchémille plissée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82103 | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793 | <i>Amélanchier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84962 | <i>Athamanta cretensis</i> L., 1753 | <i>Athamanthe de Crète</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre en faux, Percefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87705 | <i>Campanula pusilla</i> Haenke, 1789 | <i>Campanule à feuilles de cochléaire,</i> <i>Campanule à feuilles de Raifort</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87915 | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796 | <i>Cardamine flexueuse,</i> <i>Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87925 | <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903 | <i>Dentaire pennée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88324 | <i>Carex alba</i> Scop., 1772 | <i>Laïche blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88389 | <i>Carex brachystachys</i> Schrank, 1789 | <i>Laïche à épis court,</i> <i>Laïche maigre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88865 | <i>Carex sempervirens</i> Vill., 1787 | <i>Laïche toujours verte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89147 | <i>Carlina acaulis</i> L., 1753 | <i>Carline sans tige,</i> <i>Carline acaule,</i> <i>Caméléon blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carline commune,</i> <i>Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92710 | <i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl., 1822 | <i>Cotonéaster tomenteux,</i> <i>Cotonéaster des monts Nébrodes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96834 | <i>Erinus alpinus</i> L., 1753 | <i>Érine des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | Fétuque géante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99372 | <i>Galium anisophyllum</i> Vill., 1779 | Gaillet à feuilles inégales | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101617 | <i>Hieracium amplexicaule</i> L., 1753 | Épervière amplexicaule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102055 | <i>Hieracium humile</i> Jacq., 1777 | Épervière peu élevée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102956 | <i>Hordeum europaeum</i> (L.) All., 1785 | Orge des bois, Hordélyme d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103298 | <i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763 | Millepertuis maculé, Millepertuis taché | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104488 | <i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet, 1827 | Kernéra des rochers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104715 | <i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 | Aubour des Alpes, Cytise des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105092 | <i>Laserpitium siler</i> L., 1753 | Laser siler, Sermontain | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105498 | <i>Leontodon hastilis</i> L., 1763 | Liondent glabre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106574 | <i>Lonicera nigra</i> L., 1753 | Chèvrefeuille noire, Camérisier noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114160 | <i>Poa compressa</i> L., 1753 | Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117528 | <i>Rhamnus alpina</i> L., 1753 | Nerprun des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117748 | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753 | Groseillier des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119933 | <i>Salix appendiculata</i> Vill., 1789 | Saule appendiculé, Saule à grandes feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | Saule marsault, Saule des chèvres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121177 | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L., 1753 | Saxifrage à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des bois, Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | If à baies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | Germandrée petit-chêne, Chênette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126159 | <i>Thalictrum minus</i> L., 1753 | Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129033 | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq., 1773 | Véronique à feuilles d'ortie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère femelle, Polypode femelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | Prêle des champs, Queue-de-renard | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100640 | <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851 | Polypode du calcaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|---|---|
| Mammifères | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61119 | <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 89147 | <i>Carlina acaulis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Gymnospermes | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---------------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | Dautherville E. et Duburguet J. | 1987 | Etude scientifique du projet de réserve naturelle dans la région du Mont Fier (Jura). Atelier de l'Environnement du Haut-Jura, CPRE, 43p. + annexes + cartes. |
| | Delonglee S. | | Les ZNIEFF du Parc Naturel régional du Haut-Jura. |
| | Recueil Nature | | Numéro spécial sur le Faucon pèlerin. Préfecture du Jura_Lons le Saunier. 95p. |
| Informateur | Ferrez Y. | | |
| | Groupe Pèlerin Jura | | |
| | Monneret R.-J. | | |