



PELOUSES DU BOIS DE LA BROSSE (Identifiant national : 430010413)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 31000032)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL
Franche-Comté, . - 430010413, PELOUSES DU BOIS DE LA BROSSE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010413.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté

Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté

Centroïde calculé : 941325°-2300478°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/01/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2017

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 18 |
| 9. SOURCES | 18 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Territoire de Belfort
- Commune : Vézelois (INSEE : 90104)
- Commune : Danjoutin (INSEE : 90032)
- Commune : Meroux (INSEE : 90068)

1.2 Superficie

3,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 371

Maximale (mètre): 420

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

A l'est de Danjoutin, et de Belfort, le bois de la Brosse occupe un relief légèrement accidenté marqué par une topographie variée, faisant alterner les pentes douces à moyennes, des zones de plateau, des bas de versants et des fonds peu marqués. Sur le haut du plateau, les arbres sont plutôt rabougris par rapport au reste de la forêt et il en est de même pour les versants exposés au nord. Dans les autres secteurs, la forêt, du type chênaie - charmaie est généralement de belle venue, la composition floristique évoluant selon que l'on se situe sur des sols superficiels (bien diversifiée) ou sur les pentes aux sols plus acides (cortège floristique appauvri d'une chênaie - hêtraie).

A l'intérieur du bois de la Brosse, quelques clairières existent çà et là à la faveur de conditions géologiques particulières : placages marneux ou calcaires affleurants. Ils déterminent un ensemble de petites pelouses se distinguant du reste de la végétation environnante. Les arbres de petite taille et arbustes forment alors un manteau autour de ces clairières et parsèment ces espaces ouverts signe d'un fort enrichissement. Sur marne, la strate herbacée montre de la molinie bleuâtre et de la callune témoignant ainsi du caractère acidiphile de ces stations. Dans le bois de la Brosse, au cœur d'une des pelouses, une petite mare a été creusée (mare Vita).

A l'est entre le bois et la RD 13, les calcaires affleurent également sur quelques petits secteurs si bien que se développent plusieurs lambeaux de prairies sèches se caractérisant par une végétation proche des pelouses mésophiles. Les pelouses constituent un type de végétation herbacée installée sur des milieux à degré nutritionnel plutôt faible et sur des sols généralement superficiels. En Franche-Comté, de nombreux types de pelouses ont pu être mis en évidence, les facteurs de différenciation étant le climat et les propriétés des sols. Les pelouses du bois de la Brosse constituent un exemple de pelouse mésophile installée sur calcaire et sur marne, ce type d'habitat naturel restant tout à fait remarquable dans le département du fait de sa rareté (moins d'une centaine d'hectares).

Outre le cortège d'espèces thermophiles, jamais abondantes dans le territoire de Belfort, quelques unes de ces pelouses voient se développer la passerine annuelle, espèce autrefois habituelle dans les cultures ou les prés secs sur sols argilo-calcaires et observée après les moissons. La passerine est devenue très rare en Franche-Comté (moins d'une dizaine de stations en Petite Montagne et sur le plateau de Champlitte) ; signalée au 19^{ème} siècle dans le Territoire de Belfort, il s'agit d'une redécouverte très récente dans le département. Pour les insectes, il faut noter la présence du damier de la succise, espèce de papillon protégé en France dont le maintien est lié aux prairies maigres ou aux pelouses riches en succise, plante hôte de sa chenille.

PROTECTION ACTUELLE

Ce secteur ne bénéficie d'aucune protection réglementaire. Toutefois, les arrêtés ministériels des 22/06/92 et 23/04/07 protègent une espèce de flore et d'insecte présents sur le site de même que leur biotope.

OBJECTIFS DE GESTION

La commune a chargé l'Espace naturel comtois de la réalisation de plans de gestion pour un certain nombre de ces pelouses. Leur sauvegarde passe par la mise en place de mesures de restauration puis de gestion accompagnées d'une maîtrise d'usage et de la fréquentation. En raison de sa conservation prioritaire, le Conseil général a financé un premier bilan concernant la Passerine. Il permettra d'identifier les mesures les mieux adaptées pour une conservation durable des stations.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

forêt présentant un bon équilibre végétation/sol et permettant des échanges avec les milieux humides voisins, notamment les étangs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens | <ul style="list-style-type: none"> - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groell C. | | | | 1988 - 1988 |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Maillier S. | | | | 1998 - 1998 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre, Grivollée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groell C. | | | | 1988 - 1988 |
| | 126474 | <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861 | <i>Passerine annuelle, Langue-de-moineau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Billant O. | | | | 2006 - 2012 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Obs Natu la Base | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Obs Natu la Base | | | | 2012 - 2012 |
| Oiseaux | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Obs Natu la Base | | | | 2014 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Obs Natu la Base | | | | 2014 - 2014 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Obs Natu la Base | | | | 2011 - 2011 |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 79991 | <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946 | <i>Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1988 - 1988 |
| | 82999 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide vulnérable, Trèfle des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 85439 | <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | Avoine pubescente | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 85774 | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753 | Épine-vinette, Berbérus commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Brachypode penné | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | Brize intermédiaire, Amourette commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | Brome érigé | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 87690 | <i>Campanula patula</i> L., 1753 | Campanule étoilée, Campanule étalée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | Laïche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | Laïche jaunâtre, Laïche jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | Laïche tardive, Carex tardif | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88952 | <i>Carex vulpina</i> L., 1753 | Laïche des renards, Carex des renards | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centauree jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | <i>Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1988 - 1988 |
| | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | <i>Oeillet des Chartreux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97502 | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753 | <i>Euphorbe douce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 98334 | <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809 | <i>Fétuque de Léman</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98425 | <i>Festuca ovina</i> L., 1753 | <i>Fétuque des moutons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 98460 | <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762 | <i>Fétuque des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 98756 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 99810 | <i>Genista sagittalis</i> L., 1753 | <i>Genêt ailé, Genistrolle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 103648 | <i>Inula salicina</i> L., 1753 | <i>Inule à feuilles de saule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 104665 | <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812 | <i>Koelérie pyramidale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | Lin purgatif | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 110910 | <i>Orchis maculata</i> L., 1753 | Orchis maculé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112465 | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch., 1887 | Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | Baldingère faux-roseau, Fromenteau | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | Fléole des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 113683 | <i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | Pin noir d'Autriche | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | Plantain moyen | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | Pâturin des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 114526 | <i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769 | Polygala amer | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 114545 | <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | Polygala chevelu | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | Coucou, Primevère officinale, Brérelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | Brunelle laciniée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Brunelle commune, Herbe au charpentier | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | Renoncule bulbeuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | Petit cocriste, Petit Rhinathe | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | Rosier des chiens, Rosier des haies | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | Ronce de Bertram, Ronce commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | Sauge des prés, Sauge commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | Pimprenelle à fruits réticulés | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 122256 | <i>Sedum sexangulare</i> L., 1753 | Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | Séséli des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés,</i> <i>Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 125677 | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | <i>Pissenlit</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 126564 | <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | <i>Thym précoce,</i> <i>Serpolet couchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | <i>Trèfle intermédiaire,</i> <i>Trèfle moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés,</i> <i>Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque,</i> <i>Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | <i>Valériane officinale,</i> <i>Valériane des collines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée,</i> <i>Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée,</i> <i>Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1998 |
| Ptéridophytes | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux ,</i> <i>Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | Billant O. | 2012 | |
| | Cabinet A. Waechter | | Etude des valeurs environnementales de Chevremont, propositions de gestion et de valorisation - Commune de Chevremont. |
| | Hennequin C. | 2007 | Connaissance de la flore rare ou menacée du Territoire de Belfort, <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., Conservatoire Botanique de Franche-Comté, 11 p. |
| Informateur | Beaufils Thérèse | 1994 | |
| | Groell C. | 1988 | |
| | Hennequin C / CBFC | 0 | |
| | Maillier S. | 0 | |
| | Obs Natu la Base | | |
| | ONF | 0 | |