



LANDE DES SOUCIS (Identifiant national : 520620009)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00004166)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FOURNIER EMMANUEL, - 520620009, LANDE DES SOUCIS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620009.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :FOURNIER EMMANUEL
Centroïde calculé : 431966°-2311644°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 14 |
| 9. SOURCES | 14 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Saint-Jean-de-la-Motte (INSEE : 72291)
- Commune : Oizé (INSEE : 72226)

1.2 Superficie

93,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 76

Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ces anciennes landes humides complantées de résineux et parsemées çà et là de quelques menhirs, accueillent sur divers biotopes (pinèdes incendiées ou non, mares, pelouses, landes rases, chemins) une très forte population d'une espèce végétale protégée dans la région, à savoir le Jonc squarreux (*Juncus squarrosus*), mais aussi deux autres espèces végétales beaucoup moins abondantes sur le site, l'une bénéficiant du même statut de protection, à savoir le Rhynchospora blanc (*Rhynchospora alba*), l'autre étant protégée sur l'ensemble du territoire national : la Rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Floristique - Phanérogames | | <ul style="list-style-type: none"> - Archéologique - Historique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation basée sur la répartition d'une espèce végétale protégée au sein d'un environnement forestier dominé par les résineux et présentant des tendances hydromorphes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

Cette zone ne semble pas menacée actuellement, sauf peut-être par l'implantation de chalets et de petits plan d'eau à vocation de loisirs.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes | | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 85 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | 5 | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 10 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | <i>Vulpin roux,</i> <i>Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2006 |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants,</i> <i>Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rosolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges,</i> <i>Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2007 |
| | 95948 | <i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès,</i> <i>Euphorbe faux Cyprès</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet aquatique,</i> <i>Gaillet fangeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 104334 | <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753 | Jonc rude, Jonc raide, Brossière | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | Genévrier commun, Peteron | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2000 - 2000 |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | Nard raide, Poil-de-bouc | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 112405 | <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885 | Bartsie visqueuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | Potamot à feuilles de renouée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 117258 | <i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807 | Renoncule tripartite | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2007 |
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | Saule à feuilles étroites, Saule rampant | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1993 - 2007 |
| | 120246 | <i>Salix triandra</i> L., 1753 | Saule à trois étamines, Osier brun | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 85876 | <i>Betula alba</i> L., 1753 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2002 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |
| | 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigéios, Roseau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2006 |
| | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | <i>Laïche tardive, Carex tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | <i>Chérophylle penché, Couquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 96136 | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | <i>Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2006 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2006 |
| | 97811 | <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 | <i>Euphrase raide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 99260 | <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | <i>Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2007 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2007 |
| | 100926 | <i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème taché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2007 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2002 |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2007 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2006 |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | <i>Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Linaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2007 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2000 - 2004 |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2000 - 2004 |
| | 116789 | <i>Quercus toza</i> auct. non Bosc ex DC. | <i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117164 | <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 | <i>Renoncule peltée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2006 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram,</i> <i>Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 119780 | <i>Sagina apetala</i> Ard., 1763 | <i>Sagine apétale,</i> <i>Sagine sans pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2007 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés,</i> <i>Petit scorsonère,</i> <i>Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire,</i> <i>Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 122726 | <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Séneçon des bois,</i> <i>Séneçon des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2006 |
| | 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés,</i> <i>Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux,</i> <i>Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2004 |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 130556 | <i>Xolantha guttata</i> (L.) Raf., 1838 | <i>Hélianthème taché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| Ptéridophytes | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2007 - 2007 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Informateur | B. TILLY | | |
| | Clous. G | | |
| | FOURNIER E. | | |