



ETANG DES SALLES

(Identifiant national : 530002627)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01350003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT JOSE, .- 530002627, ETANG DES SALLES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002627.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :DURFORT JOSE
Centroïde calculé : 193243°-2368083°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2004
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2004
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 21 |
| 9. SOURCES | 22 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [530005961](#) - FORET DE QUENECAN (Id reg. : 01350000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor
- Département : Morbihan
- Commune : Perret (INSEE : 22167)
- Commune : Silfiac (INSEE : 56245)
- Commune : Sainte-Brigitte (INSEE : 56209)

1.2 Superficie

107,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 200

Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [530005961](#) - FORET DE QUENECAN (Type 2) (Id reg. : 01350000)

1.5 Commentaire général

” Descriptif synthétique :

L'étang des Salles est un grand plan d'eau de 37 hectares quand il atteint sa pleine capacité mais qui peut aux périodes d'étiage découvrir un secteur amphibie conséquent : environ 12 ha sur ses rives Sud et Ouest et dans le fond d'étang séparé par une digue (c'est dans ce cas de figure que la partition des milieux est calculée à la rubrique 7). La nature de ses eaux est oligotrophe à dystrophe (une partie de la végétation environnante a un caractère tourbeux).

Sur l'aval en rive gauche et l'essentiel de la rive droite, les milieux terrestres sont artificialisés et seule une haie sur talus les sépare du milieu aquatique. Par contre un gros îlot humide en landes, bois et prairies subsiste au Sud-Ouest, ainsi que le couloir humide d'un ruisseau provenant des environs du bourg de Perret. La principale alimentation est réalisée par 3 ruisseaux (du Stang, du Pont-Thomas et du Pont-Lann) sur l'aval, environnés par une importante zone naturelle de nature tourbeuse en voie de boisement avancé. Le site de l'étang des Salles a un très important intérêt naturaliste, et tant pour le plan d'eau, son avifaune et sa végétation, que pour les landes et milieux tourbeux environnants, il possède un réel intérêt régional.

Le site a par ailleurs un intérêt géologique : un important gisement de minéraux (chiastolites) et fossiles (Colymene tristani) dans les schistes.

” Milieux principaux : - sur les vases puis en rives s'étagent successivement une large zone amphibie à Littorelle, Baldellia, Renoncule flammette, Bident, etc ... puis un groupement à Eleocharis des marais et enfin une ceinture à Laïche vésiculeuse. D'autres magnocariçaiques et des roselières à Baldingère ou d'hélophytes se répartissent de façon discontinue le long des rives et plus particulièrement dans la queue d'étang.

- les milieux humides²terrestres² sont composés par : des groupements à Molinie à l'allure de lande humide²dégradée² dans les secteurs les moins mouillés, de bas-marais acide dans les autres, de landes humides à méso-hygrophiles à Bruyères et Ajonc nain souvent imbriquées dans un taillis plus ou moins humide de saule et bouleaux. Les prairies humides à Jonc acutiflore se retrouvent en bordure externe du site, par endroits. Une zone tourbeuse un peu plus active quoique évoluée est présente sur la partie située en Ste Brigitte, le taillis alentour est alors marécageux et localement à sphaignes.

“ Espèces remarquables : - Flore : présence de 5 espèces végétales protégées au plan national : la Pilulaire - *Pilularia globulifera*, la Littorelle - *Littorella uniflora*, et le Flûteau nageant - *Luronium natans* également d'intérêt communautaire, ces plante sont présentes dans les secteurs amphibies ou fossés en communication avec l'étang, et les Rossolis intermédiaire et à feuilles rondes - *Drosera intermedia* et *D. rotundifolia* dans les milieux tourbeux. Au moins 10 autres plantes menacées sont présentes dans la zone, dont la Canche sétacée - *Deschampsia setacea* et la Gentiane pneumonanthe - *Gentiana pneumonanthe* en lande humide.

- Faune (sélection) - Mammifères : La Loutre d'Europe - *Lutra lutra* fréquente le site - Oiseaux : l'Etang des Salles est une importante zone d'hivernage du Centre-Bretagne pour de bonnes populations de canards (*Fuligule morillon*, *Fuligule milouin*, *Sarcelle d'hiver*, *Colvert*) et d'autres oiseaux d'eau tels que le Grand Cormoran, la Foulque macroule. Plusieurs espèces de limicoles y sont régulièrement observées (source n° 60 : observations du GEOCA dans le cadre des opérations du Wetlands International). D'autres groupes importants, amphibiens et invertébrés notamment mériteraient d'être mieux étudiés.

“ Conditions actuelles de conservation : des opérations de drainage et de boisements en résineux se sont produites dans la zone humide attenante à l'étang sur Perret. Du désherbage chimique sous clôture atteint des plages aquatiques sur la rive Nord. Un entretien mécanique sur une lande humide en bordure du fond de l'étang sur Perret permet à celle-ci de rester diversifiée floristiquement. Il serait intéressant que de telles pratiques de gestion soient appliquées en d'autres points pour lutter contre la fermeture du milieu par le boisement naturel, principale menace à long terme dans la zone tourbeuse.

Liens avec d'autres ZNIEFF : avec la ZNIEFF de type I

de l'Etang du Fourneau et vallon du Saut du Chevreuil,

et de type II de la Forêt de Quénécan.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Etang
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Soutien naturel d'étiage - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation | <ul style="list-style-type: none"> - Géologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF de l'Etang des Salles est sensiblement le même que celui dressé pour la première description de 1980 puis précisé en 1993.

- la zone englobe l'ensemble des milieux aquatiques, amphibies et rivulaires liés à l'étang, ainsi que tous les milieux naturels humides développés à son contact et autour des ruisseaux et sources qui l'alimentent (3). Des milieux remarquables (landes humides et groupements de tourbière) existent en plusieurs endroits autour de l'étang, des éléments de la flore et de la faune menacées sont présents en de nombreux points dans le périmètre (1 et 2) .

- les bâtiments, les espaces agricoles non humides (y compris en bordure du plan d'eau) et les boisements artificiels - à l'exception d'unités enclavées - ne sont pas compris dans la zone (4).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Compétition | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Orthoptères | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.14 <i>Eaux dystrophes</i> | | | 25 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | 10 | |
| | 51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i> | | | 5 | |
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | 8 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 1 | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | | |
| | 54.4 <i>Bas-marais acides</i> | | | 2 | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 1 | |
| | 51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i> | | | | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 22 | |
| | 41.B <i>Bois de Bouleaux</i> | | | 10 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 10 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 1 | |
| | 24.12 <i>Zone à Truites</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 2 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Manque dans milieux déterminants: 53.14 2%, Roselières basses.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 267 | <i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i> | <i>Crapaud calamite</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2616 | <i>Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Chevalier guignette</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 1970 | <i>Anas clypeata Linnaeus, 1758</i> | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 1958 | <i>Anas crecca Linnaeus, 1758</i> | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Fuligule morillon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2808 | <i>Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Garrot à oeil d'or</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4167 | <i>Locustella naevia (Boddaert, 1783)</i> | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Grèbe huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)</i> | <i>Grèbe castagneux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Orthoptères | 65487 | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 88840 | <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94638 | <i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880 | <i>Canche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | <i>Épilobe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | <i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | <i>Flûteau nageant, Alisma nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | <i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113626 | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753 | <i>Grassette du Portugal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115587 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Potentille des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | <i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | <i>Boulette d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère péliade</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 786823 | <i>Sphagnum apiculatum</i> H.Lindb., 1903 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6774 | <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6792 | <i>Sphagnum plumulosum</i> Röhl | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Fuligule milouin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Bécasseau variable | Passage, migration | | | | | |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Petit Gravelot | Passage, migration | | | | | |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard des roseaux | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Foulque macroule | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Goéland brun | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Barge à queue noire | Passage, migration | | | | | |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | Chevalier combattant, Combattant varié | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Chevalier culblanc</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Vanneau huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Orthoptères | 66157 | <i>Chorthippus albomarginatus</i> <i>(De Geer, 1773)</i> | <i>Criquet marginé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66161 | <i>Chorthippus parallelus</i> <i>(Zetterstedt, 1821)</i> | <i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> <i>Thunberg, 1815</i> | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Criquet ensanglanté, Oedipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65740 | <i>Pholidoptera griseoptera</i> <i>(De Geer, 1773)</i> | <i>Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 80590 | <i>Agrostis canina</i> <i>L., 1753</i> | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80746 | <i>Agrostis setacea</i> <i>Curtis, 1787</i> | <i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> <i>L., 1753</i> | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81273 | <i>Alisma ranunculoides</i> L., 1753 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82863 | <i>Anthemis nobilis</i> L., 1753 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88385 | <i>Carex binervis</i> Sm., 1800 | <i>Laïche à deux nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88720 | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 | Laïche vulgaire, Laïche noire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88802 | <i>Carex pulicaris</i> L., 1753 | Laïche puce, Carex pucier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794 | Laïche étoilée, Laïche-hérissou | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Carum verticillé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | Danthonie, Sieglingie retombante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96084 | <i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849 | Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | Bruyère ciliée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105086 | <i>Laserpitium prutenicum</i> L., 1753 | <i>Laser de Prusse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105400 | <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788 | <i>Léersie faux Riz</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108354 | <i>Mercurialis corsica</i> Coss., 1850 | <i>Mercuriale de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | <i>Nard raide, Poil-de-bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112861 | <i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865 | <i>Peucedan à feuilles en lanières</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | <i>Renoncule aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | <i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121759 | <i>Scirpus palustris</i> L., 1753 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124417 | <i>Sparganium ramosum</i> Huds., 1778 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois ajonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128125 | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96526 | <i>Equisetum limosum</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|---|---|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2808 | <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|---|---|---|
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | | | | |
| Bryidae | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6774 | <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|--|--|
| Bibliographie | AUBERGER E. | 1977 | Plans d'eau des Côtes du Nord, DRE Rennes. |
| | CLEMENT B. | | Typologie des zones humides de Bretagne - recherche de bio-indicateurs, Laboratoire d'Ecologie Végétale. Université de Rennes I / SRETIE (les étangs méso-dystrophes à Carex p. 24-25) |
| | DIREN Bretagne. | 1984 | ZNIEFF, 1ère génération n° 01350003, Etang de Salles |
| | DURFORT J. | 1993 | Etude pour une stratégie de préservation, de restauration et de gestion des espaces naturels dans le Centre Ouest Bretagne. Fédération Centre-Bretagne Environnement |
| | Groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor | 1999 | revue LE FOU, n°49 octobre 1999, n°53 janvier 2001, n°57 mai 2002 |
| | Inventaire Directive Habitats | 1995 | Région Bretagne |
| | LAFONTAINE L. | | Propositions de Zones Spéciales de Conservation pour les mammifères - Groupe mammalogique Breton. |
| | PHILIPPON D. | 1987 | Inventaire des sites naturels de l'intérieur des Côtes du Nord. Conseil Général 22, BEEN |
| | Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux | 1995 | Carte des zones humides d'intérêt national ou local du Bassin Loire-Bretagne |
| | STEPHAN A., BOURDON P. | 2002 | Actualisation de l'inventaire existant des zones humides sur le bassin versant du Blavet, FCBE/ Institution interdépartementale du SAGE Blavet. |
| TOUFFET J. | 1985 | Les tourbières de Bretagne - Laboratoire d'écologie végétale- Université de Rennes 1 | |
| Informateur | BOURDON Pascal | | |
| | BROSSE Xavier | | |
| | DURFORT José | | |
| | HERVIO Jean-Marc | | |
| | LE GARFF Bernard | | |