# VASARD DE BEYCHEVELLE
# (Identifiant national : 720014184)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 36460005)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREA, .- 720014184, VASARD DE BEYCHEVELLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720014184.pdf*

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :GEREA
Centroïde calculé : 360729°-2023620°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/12/2013
Date actuelle d'avis CSRPN : 20/12/2013
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 13
9. SOURCES ..... 13

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720013624 - ESTUAIRE DE LA GIRONDE (Id reg. : 36460000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde
- Commune : Saint-Julien-Beychevelle (INSEE : 33423)

## 1.2 Superficie

58,09 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720013624 - ESTUAIRE DE LA GIRONDE (Type 2) (Id reg. : 36460000)

## 1.5 Commentaire général

Le vasard de Beychevelle est une formation typique de l'estuaire de la Gironde, dépôt de vase résultant des marées et courants, qui peut devenir une île si le phénomène perdure, voire est conforté par des aménagements humains.

Dans le cas de ce vasard, on observe plutôt une érosion très nette depuis une vingtaine d'années qui, si le phénomène continue, aboutira à la disparition complète de cet îlot de vase, à moins qu'il ne se déplace et vienne s'accoler à l'île Bouchaud ou à l'ile Patiras.

Des droits de chasse ont été concédées par les services de l'État, gestionnaires des terrains publics, ce qui aboutit à la création d'un chapelet de lacs de tonne (installations de chasse) le long du vasard.

Le caractère humide et inondable des terrains, plus ou moins saumâtres, a permis l'installation et le maintien de quelques espèces végétales rares et protégées.

Bien que de petit taille, le vasard est situé sur un axe migratoire majeur, au milieu de l'estuaire. Il constitue donc une halte migratoire intéressante, mais aussi un site d'hivernage, voire de reproduction pour diverses espèces d'oiseaux. Le développement de roselières sur le haut du vasard offre des habitats adéquats et bien protégés protégés pour divers paludicoles (rousserolles et locustelles). Le développement de buissons et petits arbustes permet également à la gorgebleue à miroir de ce reproduire sur ce petit vasard.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Estuaire, delta
- Île lacustre ou fluviale

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Oiseaux<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Oiseaux | - Phanérogames | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.11 Phragmitaies* | | Informateur : GEREA | | 2011 |
| | *22.44 Tapis immergés de Characées* | | Informateur : GEREA | | 2011 |
| | *14 Vasières et bancs de sable sans végétations* | | | | 1990 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *22.12 Eaux mésotrophes* | | Informateur : GEREA | | 2011 |
| | *53.16 Végétation à Phalaris arundinacea* | | Informateur : GEREA | | 2011 |
| | *19 Ilots, bancs rocheux et récifs* | | | | 1990 |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 4198 | *Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)* | *Rousserolle turdoïde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2009 - 2010 |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | *Phragmite des joncs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2010 |
| | 1970 | *Anas clypeata Linnaeus, 1758* | *Canard souchet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2009 |
| | 1956 | *Anas strepera Linnaeus, 1758* | *Canard chipeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2009 |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | *Busard des roseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1990 - 2010 |
| | 4172 | *Locustella luscinioides (Savi, 1824)* | *Locustelle luscinioïde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2009 |
| | 4023 | *Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)* | *Gorgebleue à miroir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2009 - 2010 |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | *Tadorne de Belon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2009 |
| Phanérogames | 137271 | *Leucojum aestivum subsp. aestivum L., 1759* | *Nivéole d'été* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 142509 | *Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882* | *Zannichellie pédicellée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1990 - 1998 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres | 73555 | *Chara fragifera M.C.Durieu de Maisonneuve, 1859* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| Oiseaux | 3733 | *Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)* | *Pipit spioncelle* | Reproduction indéterminée | | | | | 1990 |
| Phanérogames | 81624 | *Alopecurus bulbosus Gouan, 1762* | *Vulpin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 81856 | *Althaea officinalis L., 1753* | *Guimauve officinale, Guimauve sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 83195 | *Apium graveolens L., 1753* | *Céleri, Cèleri* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 84173 | *Arundo donax L., 1753* | *Canne de Provence, Grand roseau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 85112 | *Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805* | *Arroche hastée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85474 | *Baccharis halimifolia L., 1753* | *Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 86400 | *Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833* | *Moutarde noire, Chou noir* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 86571 | *Bromus commutatus Schrad., 1806* | *Brome variable, Brome confondu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 132258 | *Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753* | *Brome mou* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 132457 | *Calystegia sepium subsp. sepium (L.) R.Br., 1810* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 88314 | *Carex acuta L., 1753* | *Laîche aiguë, Laîche grêle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 145127 | *Carex cuprina var. cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 88833 | *Carex riparia Curtis, 1783* | *Laîche des rives* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 90684 | *Chenopodium ambrosioides L., 1753* | *Chénopode fausse Ambroisie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 133578 | *Cuscuta scandens subsp. scandens Brot., 1804* | *Cuscute du Bident* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95895 | *Eleocharis bonariensis Nees, 1840* | *Souchet de Buenos Aires* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 96814 | *Erigeron sumatrensis Retz., 1810* | *Vergerette de Barcelone* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Fétuque Roseau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 99260 | *Galega officinalis L., 1753* | *Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 101210 | *Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973* | *Picride fausse Vipérine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 101221 | *Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Ache nodiflore* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 102990 | *Hordeum secalinum Schreb., 1771* | *Orge faux seigle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 103987 | *Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801* | *Séneçon aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 104770 | *Lactuca saligna L., 1753* | *Laitue à feuilles de saule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Graceline* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 105689 | *Lepidium virginicum L., 1753* | *Passerage de Virginie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 109422 | *Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812* | *Cresson des fontaines* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 109881 | *Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805* | *Oenanthe de Lachenal* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Roseau, Roseau commun, Roseau à balais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 113807 | *Plantago altissima L., 1762* | *Plantain très élevé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 114658 | *Polygonum aviculare L., 1753* | *Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 114779 | *Polygonum maritimum L., 1753* | *Renouée maritime* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 117224 | *Ranunculus sceleratus L., 1753* | *Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Patience crépue, Oseille crépue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 122726 | *Senecio sylvaticus L., 1753* | *Séneçon des bois, Séneçon des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 124232 | *Sonchus arvensis L., 1753* | *Laiteron des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron rude, Laiteron piquant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 124798 | *Stachys palustris L., 1753* | *Épiaire des marais, Ortie bourbière* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ANIOTSBEHERE JC. | | | | 1998 |
| | 127692 | *Triticum aestivum L., 1753* | *Blé tendre, Froment, Blé ordinaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Aniotsbéhère J.C. | | | | 1998 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3733 | *Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4023 | *Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4172 | *Locustella luscinioides (Savi, 1824)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4198 | *Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | ANIOTSBEHERE JC. | 1998 | Herborisation dans les îles de l'estuaire de la Gironde. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 26 (2) p 71-77 |
| | Aniotsbéhère J.C. | 1998 | Herborisation dans les îles de l'estuaire de la Gironde. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 26 (2). |
| Informateur | GEREA | | |
| | LPO Aquitaine | | |