# FORET DE MEILHARDS
# (Identifiant national : 740000087)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 19000073)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., .- 740000087, FORET DE MEILHARDS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000087.pdf*

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.
Centroïde calculé : 543911°-2059643°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2000
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 29
9. SOURCES ..... 30

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Condat-sur-Ganaveix (INSEE : 19060)
- Commune : Meilhards (INSEE : 19131)
- Commune : Lamongerie (INSEE : 19104)

## 1.2 Superficie

502,37 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 377
Maximale (mètre): 481

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Le périmètre de la ZNIEFF de la forêt de Meilhards a été fortement réduit en raison d'importantes coupes forestières suivies de plantations. Le secteur situé à l'est de la route D137 est conservé dans le nouveau périmètre. C'est dans cette partie que l'on observe de belles futaies de hêtres et de chênes à caractère montagnard encore relativement marqué. En revanche, à l'ouest de la route D137, seul est conservé le secteur situé le long du ruisseau de Faye qui coule du sud vers le nord. C'est dans cette partie de la forêt que l'on observe une très belle population d'Ail des Ours et d'Ail Victorial. Ces deux espèces sont présentes ici en peuplement dense et mélangé ce qui est tout à fait exceptionnel. On retrouve dans cette forêt un mélange d'espèces montagnardes et atlantiques.

Au plan botanique, quelques espèces remarquables sont à signaler outre les deux citées précédemment : Geranium silvaticum, Narthecium ossifragum, Laserpitium latifolium, Drosera intermedia, Arnica montana etc.

Au plan faunistique, pue de données sont disponibles. Des inventaires complémentaires seront à réaliser dans les années à venir.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Habitat dispersé

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Faunistique<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Périmètre amputé d'une bonne partie ouest de la forêt en raison d'un enrésinnement massif et de nombreuses coupes. Le secteru est est maintenu. la forêt est traversée par la D137 sur l'axe nord-sud.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Autres Fonges | - Bryophytes<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Basidiomycètes | | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *41.5 Chênaies acidiphiles* | | | | |
| | *41.1 Hêtraies* | | | | |
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | | |
| | *41.2 Chênaies-charmaies* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | | |
| | *24.1 Lits des rivières* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *83.3 Plantations* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 81541 | *Allium ursinum L., 1753* | *Ail des ours, Ail à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1995 |
| | 81543 | *Allium victorialis L., 1753* | *Ail victoriale, Herbe à neuf chemises, Ail de la Sainte-Victoire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2007 |
| | 82903 | *Anthericum liliago L., 1753* | *Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : AULEPE | | | | |
| | 83874 | *Arnica montana L., 1753* | *Arnica des montagnes, Herbe aux prêcheurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1995 |
| | 88783 | *Carex polyrrhiza Wallr., 1822* | *Laîche des ombrages* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88927 | *Carex umbrosa Host, 1801* | *Laîche des ombrages* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2007 |
| | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | *Rossolis intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1995 |
| | 107158 | *Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794* | *Petit muguet à deux feuilles, Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109372 | *Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762* | *Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2007 |
| | 112853 | *Peucedanum gallicum Latourr., 1785* | *Peucédan de France, Peucédan de Paris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2007 |
| | 116902 | *Ranunculus aconitifolius L., 1753* | *Renoncule à feuilles d'aconit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1995 - 2007 |
| | 122539 | *Senecio adonidifolius Loisel., 1807* | *Séneçon à feuilles d'Adonis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1995 |
| | 124346 | *Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763* | *Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1995 |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2007 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basidiomycètes | 29546 | *Boletus aurantiacus Bull.* | *Bolet orangé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29377 | *Boletus calopus Pers. : Fr.* | *Bolet à beau pied* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29388 | *Boletus edulis Bull. : Fr.* | *Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29392 | *Boletus erythropus Pers. : Fr.* | *Bolet à pied rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 514489 | *Boletus leucophaeus sensu auct.* | *Bolet rude* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29515 | *Boletus piperatus Bull. : Fr.* | *Bolet poivré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29904 | *Cantharellus cibarius Fr. : Fr.* | *Girolle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40914 | *Clavaria rugosa Bull. : Fr.* | *Clavaire rugueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31916 | *Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kummer* | *Clitocybe odorant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 31935 | *Clitocybe phyllophila (Pers. : Fr.) Kummer* | *Clitocybe des feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 509694 | *Clitocybe pithyophila (Fr.) Gillet, 1874* | *Clitocybe cérusé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 31078 | *Collybia platyphylla (Pers. : Fr.) Kummer* | *Collybie à lames larges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 34391 | *Cortinarius callisteus (Fr. : Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 511011 | *Cortinarius elatior sensu auct. p.p.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35224 | *Cortinarius multiformis (Fr. ?) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35384 | *Cortinarius phoeniceus (Bull.) R. Maire* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35603 | *Cortinarius semisanguineus (Fr. : Fr.) Gillet* | *Cortinaire à demi sanguin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35750 | *Cortinarius torvus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Cortinaire farouche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 35757 | *Cortinarius triformis Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 42792 | *Hydnum repandum L. : Fr.* | *Pied de mouton* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 30345 | *Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36309 | *Inocybe fastigiata (J.C. Sch. : Fr.) Quélet* | *Inocybe fastigié* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36334 | *Inocybe gausapata Kühner ex Kühner* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36357 | *Inocybe godeyi Gillet* | *Inocybe de godey* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 36492 | *Inocybe piriodora (Pers. : Fr.) Kummer* | *Inocybe à odeur de poire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39264 | *Lactarius chrysorrheus Fr.* | *Lactaire à lait jaunissant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39394 | *Lactarius plumbeus (Bull. : Fr.) S.F. Gray* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39415 | *Lactarius quietus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire tranquille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39489 | *Lactarius torminosus (J.C. Sch. : Fr.) Pers.* | *Lactaire à toison* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39494 | *Lactarius uvidus (Fr. : Fr.) Fr.* | *Lactaire humide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39497 | *Lactarius vellereus (Fr.) Fr., 1838* | *Lactaire velouté* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 32316 | *Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein. : Fr.) Singer* | *Leucocortinaire bulbeux* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 30788 | *Mycena inclinata (Fr.) Quélet* | *Mycène inclinée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 38091 | *Psalliota silvicola (Vittad.) Richon & Roze* | *Agaric anisé, Agaric anisé des bois, Psalliote anisé des bois* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 39680 | *Russula cyanoxantha (J.C. Sch.) Fr.* | *Russule charbonnière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 39707 | *Russula emetica (J.C. Sch. : Fr.) Pers.* | *Russule émétique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39756 | *Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr.* | *Russule fragile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40089 | *Russula turci Bresadola* | *Russule cocardée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 40110 | *Russula vesca Fr.* | *Russule vieux-rose* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33219 | *Tricholoma columbetta (Fr. : Fr.) Kummer* | *Colombette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33349 | *Tricholoma saponaceum (Fr. : Fr.) Kummer* | *Tricholome à odeur de savon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 33414 | *Tricholoma ustale (Fr. : Fr.) Kummer* | *Tricholome brûlé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 29768 | *Tylopilus felleus (Bull. : Fr.) P. Karsten* | *Bolet chicotin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Bryophytes | 4754 | *Dicranum scoparium Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6033 | *Hypnum cupressiforme Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4770 | *Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.* | *Coussinet des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3865 | *Polytrichum formosum Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5922 | *Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6794 | *Sphagnum subsecundum Nees* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5426 | *Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Oiseaux | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 80778 | *Agrostis tenuis Sibth., 1794* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80805 | *Agrostis vulgaris With., 1796* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83267 | *Aquilegia vulgaris L., 1753* | *Ancolie vulgaire, Clochette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84338 | *Asphodelus albus Mill., 1768* | *Asphodèle blanc, Bâton royal* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85909 | *Betula verrucosa Ehrh., 1790* | *Bouleau verruqueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | *Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode penné* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87336 | *Calamintha clinopodium Benth., 1834* | *Sariette commune, Grand Basilic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87720 | *Campanula rotundifolia L., 1753* | *Campanule à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88415 | *Carex caryophyllea Latourr., 1785* | *Laîche printanière, Laîche du printemps* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88463 | *Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808* | *Laîche vert jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | *Carex flava L., 1753* | *Laîche jaunâtre, Laîche jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88538 | *Carex glauca Scop., 1772* | *Laîche glauque, Langue-de-pic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88626 | *Carex leporina L., 1753* | *Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88742 | *Carex ovalis Gooden., 1794* | *Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche millet, Faux Fenouil* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88775 | *Carex pilulifera L., 1753* | *Laîche à pilules* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | *Carex stellulata Gooden., 1794* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | *Carex vesicaria L., 1753* | *Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Chataignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89653 | *Centaurea nigra L., 1753* | *Centaurée noire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89981 | *Cerastium caespitosum Gilib. ex Asch., 1864* | *Céraiste commun , Mouron d'alouette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90354 | *Chaerophyllum temulentum L., 1755* | *Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90356 | *Chaerophyllum temulum L., 1753* | *Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91053 | *Chrysanthemum leucanthemum L., 1753* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91284 | *Cirsium anglicum (Lam.) DC., 1805* | *Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91422 | *Cirsium tuberosum (L.) All., 1785* | *Cirse bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92242 | *Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886* | *Conopode dénudé, Grand Conopode* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | *Muguet, Clochette des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93860 | *Cynosurus cristatus L., 1753* | *Crételle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie, Sieglingie retombante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94628 | *Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836* | *Foin tortueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96208 | *Epilobium montanum L., 1753* | *Épilobe des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96220 | *Epilobium obscurum Schreb., 1771* | *Épilobe vert foncé, Épilobe foncé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96667 | *Erica cinerea L., 1753* | *Bruyère cendrée, Bucane* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96695 | *Erica tetralix L., 1753* | *Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96844 | *Eriophorum angustifolium Honck., 1782* | *Linaigrette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97502 | *Euphorbia dulcis L., 1753* | *Euphorbe douce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 619431 | *Euphorbia hibernica L.* | *Euphorbe d'Irlande* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 159995 | *Euphorbia sylvatica Jacq.* | *Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98280 | *Festuca heterophylla Lam., 1779* | *Fétuque hétérophylle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98425 | *Festuca ovina L., 1753* | *Fétuque des moutons* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98512 | *Festuca rubra L., 1753* | *Fétuque rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99409 | *Galium cruciata (L.) Scop., 1771* | *Gaillet croisette, Croisette commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99437 | *Galium hercynicum Weigel* | *Gaillet du Harz, Gaillet des rochers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99798 | *Genista pilosa L., 1753* | *Genêt poilu, Genêt velu, Genette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100160 | *Geranium sylvaticum L., 1753* | *Géranium des bois, Pied-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102235 | *Hieracium murorum L., 1753* | *Épervière des murs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102671 | *Hieracium umbellatum L., 1753* | *Épervière en ombelle, Accipitrine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103288 | *Hypericum humifusum L., 1753* | *Millepertuis couché, Petit Millepertuis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103320 | *Hypericum pulchrum L., 1753* | *Millepertuis élégant, Millepertuis joli* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104022 | *Jasione montana L., 1753* | *Jasione des montagnes, Herbe à midi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104345 | *Juncus supinus Moench, 1777* | *Jonc bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104348 | *Juncus sylvaticus auct. non Reichard* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104353 | *Juncus tenuis Willd., 1799* | *Jonc grêle, Jonc fin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | *Juniperus communis L., 1753* | *Genévrier commun, Peteron* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105076 | *Laserpitium latifolium L., 1753* | *Laser à feuilles larges, Laser blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105226 | *Lathyrus montanus Bernh., 1800* | *Gesse des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106224 | *Linaria striata (Lam.) DC., 1805* | *Linaire rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106370 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Grande Listère* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106818 | *Luzula campestris (L.) DC., 1805* | *Luzule champêtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106854 | *Luzula pilosa (L.) Willd., 1809* | *Luzule de printemps, Luzule printanière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106866 | *Luzula vernalis (Reichard) DC., 1805* | *Luzule de printemps, Luzule printanière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Oeil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107072 | *Lysimachia nemorum L., 1753* | *Lysimaque des bois, Mouron jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107795 | *Melampyrum pratense L., 1753* | *Mélampyre des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107809 | *Melandrium album (Mill.) Garcke, 1858* | *Compagnon blanc, Silène des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108003 | *Melittis melissophyllum L., 1753* | *Mélitte à feuilles de Mélisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109366 | *Nardus stricta L., 1753* | *Nard raide, Poil-de-bouc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | *Orchis maculata L., 1753* | *Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | *Oxalis acetosella L., 1753* | *Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | *Phyteuma spicatum L., 1753* | *Raiponce en épi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113435 | *Picea excelsa Link, 1841* | *Épicéa commun, Sérente* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113671 | *Pinus laricio Poir., 1804* | *Largge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113703 | *Pinus sylvestris L., 1753* | *Pin sylvestre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115301 | *Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788* | *Potamot à feuilles de renouée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | *Potentilla tormentilla Neck., 1770* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115900 | *Primula officinalis Hill, 1765* | *Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Merisier vrai, Cerisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116214 | *Pseudotsuga douglasii (Sabine ex D.Don) Carrière, 1867* | *Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116411 | *Pulmonaria angustifolia L., 1753* | *Pulmonaire à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116574 | *Pyrus communis L., 1753* | *Poirier cultivé, Poirier commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116576 | *Pyrus cordata Desv., 1818* | *Poirier à feuilles en cœur, Poirasse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116593 | *Pyrus malus L., 1753* | *Pommier sauvage, Boquettier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | *Quercus pedunculata Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116768 | *Quercus sessiliflora Salisb., 1796* | *Chêne à trochets* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | *Rhamnus frangula L., 1753* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux-acacia, Carouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule à feuilles d'Olivier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119952 | *Salix aurita L., 1753* | *Saule à oreillettes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120867 | *Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121699 | *Scirpus cespitosus L., 1753* | *Scirpe en touffe, Souchet gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121792 | *Scirpus sylvaticus L., 1753* | *Scirpe des bois, Scirpe des forêts* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrophulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122971 | *Serratula tinctoria L., 1753* | *Serratule des teinturiers, Sarrette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | *Solidago virgaurea L., 1753* | *Solidage verge d'or, Herbe des Juifs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124308 | *Sorbus aucuparia L., 1753* | *Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Épiaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des bois, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | *Succisa praemorsa Asch., 1864* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125677 | *Taraxacum officinale Weber, 1780* | *Pissenlit* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127382 | *Trifolium medium L., 1759* | *Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128125 | *Ulex nanus T.F.Forst. ex Symons, 1798* | *Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale, Valériane des collines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128786 | *Veronica agrestis L., 1753* | *Véronique agreste* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129529 | *Viola canina L., 1753* | *Violette des chiens* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129669 | *Viola riviniana Rchb., 1823* | *Violette de Rivinus, Violette de rivin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129696 | *Viola silvestris auct.* | *Violette des bois, Violette de Reichenbach* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptéridophytes | 86101 | *Blechnum spicant (L.) Roth, 1794* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | *Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 83874 | *Arnica montana L., 1753* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 116576 | *Pyrus cordata Desv., 1818* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Bryidae | 4770 | *Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6794 | *Sphagnum subsecundum Nees* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | AULEPE | 1989 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement) |
| | Pouloux B. | 1979 | La flore fungique de quelques groupements forestiers de la région de Treignac - Thèse Pharmacie, Univ. Limoges. |
| Informateur | Brunerye, données botanique | | |
| | BRUNERYE L. | | |
| | Conservatoire Botanique National du Massif Central | | |
| | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | Fédération départementale des Chasseurs de la Corrèze | | |
| | Grafeuille D., données personnelles Ornithologie | | |
| | Vilks A., données personnelles botanique, Orntihologie | | |