



VALLÉE DE LA BENAIZE

(Identifiant national : 740002782)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87000081)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., - 740002782, VALLÉE DE LA BENAIZE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002782.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.
Centroïde calculé : 519568°-2149870°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2000
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 29 |
| 9. SOURCES | 29 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne
- Commune : Jouac (INSEE : 87080)
- Commune : Cromac (INSEE : 87053)
- Commune : Mailhac-sur-Benaize (INSEE : 87090)

1.2 Superficie

92,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 185

Maximale (mètre): 240

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située dans le nord de la Haute-Vienne, la Benaize est un cours d'eau qui résulte de la fusion de plusieurs petits ruisseaux prenant leur source en Creuse sur les communes de Vareilles et de St Agant-de-Versillat. Le site intégré à l'inventaire ZNIEFF est localisé à l'aval de la digue du lac de Mondon. Dans ce secteur, la Benaize coule dans une vallée relativement encaissée aux pentes boisées. Par endroit des affleurements rocheux permettent l'installation d'une flore saxicole.

Au plan botanique, le site abrite quelques espèces de fougères remarquables : L'Asplenium du Forez (*Asplenium foresiense*, protégé en Limousin) et la Scolopendre (*Asplenium scolopendrium*, protégé en Haute-Vienne). Ces deux espèces sont inféodées aux rochers humides. L'intérêt de ce site repose sur le fait que chacune de ces deux espèces recherche un substrat particulier et opposé. Ainsi, dans cette vallée nous avons la présence d'une espèce calcifuge (*Asplenium foreziense*) et d'une espèce qui recherche des zones basiques (*Asplenium scolopendrium*).

Au plan faunistique, seul le Cincle plongeur a été signalé parmi les espèces remarquables de la vallée. Cet oiseau est un bon indicateur de la qualité des eaux de la rivière. Il recherche les cours d'eau au courant rapide et au lit enroché.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Bryophytes- Ptéridophytes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none">- Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à la vallée encaissée depuis la digue du lac de Mondon jusqu'à la hauteur du lieu dit de Reculais.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | | |
| | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.4 Bocages | | | | |
| | 82 Cultures | | | | |
| | 81 Prairies améliorées | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 6279 | <i>Pallavicinia lyellii</i> (Hook.) Carruth. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Rogeon, données bryologiques | | | | 1989 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2003 |
| Oiseaux | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cincla plongeur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | 1992 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2006 |
| Phanérogames | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| Ptéridophytes | 84487 | <i>Asplenium foreziense</i> Legrand, 1885 | <i>Doradille du Forez</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 5436 | <i>Amblystegium fluviatile</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5443 | <i>Amblystegium riparium</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5446 | <i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5184 | <i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3853 | <i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4955 | <i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4958 | <i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6308 | <i>Barbilophozia attenuata</i> (Mart.) Loeske | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4978 | <i>Bartramia pomiformis</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6611 | <i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5807 | <i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5825 | <i>Brachythecium rivulare</i> Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5826 | <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5711 | <i>Bryum alpinum</i> Huds. ex With. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5728 | <i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5476 | <i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6632 | <i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4415 | <i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4423 | <i>Campylopus pillifer</i> Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6554 | <i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schiffn. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4802 | <i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6479 | <i>Chiloscyphus pallescens</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5386 | <i>Cinclidotus fontinaloides</i> (Hedw.) P.Beauv. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5847 | <i>Cirriphyllum crassinervium</i> (Taylor) Loeske & M.Fleisch. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5839 | <i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.) Grout | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5093 | <i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1804 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5100 | <i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) D.Mohr | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4431 | <i>Cynodontium bruntonii</i> (Sm.) Bruch & Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4446 | <i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4754 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5284 | <i>Didymodon insulanus</i> (De Not.) M.O.Hill | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6505 | <i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5672 | <i>Ephemerum sessile</i> (Bruch) Müll.Hal. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5855 | <i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5859 | <i>Eurhynchium stokesii</i> (Turner) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5873 | <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3906 | <i>Fissidens curnovii</i> Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4392 | <i>Fissidens pusillus</i> (Wilson) Milde | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4397 | <i>Fissidens taxifolius</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5084 | <i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5090 | <i>Fontinalis squamosa</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6677 | <i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6683 | <i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5531 | <i>Grimmia decipiens</i> (Schultz) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5072 | <i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5118 | <i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5882 | <i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5796 | <i>Hygrohypnum luridum</i> (Hedw.) Jenn. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6006 | <i>Hylocomium armoricum</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6007 | <i>Hylocomium brevirostre</i> (Brid.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6033 | <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5949 | <i>Isopterygium elegans</i> (Brid.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5886 | <i>Isothecium alopecuroides</i> (Lam. ex Dubois) Isov. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5892 | <i>Isothecium myosuroides</i> Brid., 1827 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6708 | <i>Lejeunea cavifolia</i> (Ehrh.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6712 | <i>Lejeunea ulicina</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6623 | <i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5155 | <i>Leskea polycarpa</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6492 | <i>Lophocolea alata</i> Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6495 | <i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6362 | <i>Lophozia silvicola</i> H.Buch | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6361 | <i>Lophozia ventricosa</i> (Dicks.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6167 | <i>Lunularia cruciata</i> (L.) Dumort. ex Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6182 | <i>Marchantia polymorpha</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6246 | <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4917 | <i>Mnium hornum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5122 | <i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5125 | <i>Neckera pumila</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5014 | <i>Orthotrichum affine</i> Schrad. ex Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5025 | <i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5035 | <i>Orthotrichum rivulare</i> Turner | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6267 | <i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6474 | <i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4944 | <i>Plagiomnium rostratum</i> (Schrad.) T.J.Kop. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4946 | <i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5962 | <i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5969 | <i>Plagiothecium nemorale</i> (Mitt.) A.Jaeger | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5975 | <i>Plagiothecium succulentum</i> (Wilson) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5336 | <i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6101 | <i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3864 | <i>Polytrichum commune</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3875 | <i>Polytrichum piliferum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6668 | <i>Porella pinnata</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6669 | <i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6188 | <i>Preissia commutata</i> Corda ex Nees, [nom. inval.] | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5106 | <i>Pterogonium gracile</i> (Hedw.) Sm. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5572 | <i>Racomitrium aciculare</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5573 | <i>Racomitrium aquaticum</i> (Brid. ex Schrad.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5581 | <i>Racomitrium lanuginosum</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6657 | <i>Radula complanata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4832 | <i>Rhabdoweisia fugax</i> (Hedw.) Bruch & Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4952 | <i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5907 | <i>Rhynchostegium confertum</i> (Dicks.) Schimp., 1852 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5911 | <i>Rhynchostegium riparioides</i> (Hedw.) Cardot | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6111 | <i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6115 | <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6120 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5399 | <i>Schistidium apocarpum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5409 | <i>Schistidium rivulare</i> (Brid.) Podp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5697 | <i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5921 | <i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5175 | <i>Thamnum alopecurum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5426 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5220 | <i>Tortula intermedia</i> (Brid.) Berk. [hom. illeg.] | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5221 | <i>Tortula laevipila</i> (Brid.) Schwägr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5245 | <i>Tortula virescens</i> (De Not.) De Not. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5051 | <i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5366 | <i>Weissia controversa</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5060 | <i>Zygodon baumgartnerii</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 5063 | <i>Zygodon conoideus</i> (Dicks.) Hook. & Taylor | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | Agrostide capillaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante, Consyre moyenne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81294 | <i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M.Bieb., 1819 | Alliaire, Herbe aux aulx | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | Anémone des bois, Anémone sylvie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | Flouve odorante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | Ancolie vulgaire, Clochette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | Gouet tâcheté, Chandelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85909 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790 | Bouleau verruqueux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune</i> , <i>Béruée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais</i> , <i>Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés</i> , <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88563 | <i>Carex helodes</i> sensu P.Fourn., 1935 non Link, 1800 | <i>Laïche lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche étoilée</i> , <i>Laïche-hérisson</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse</i> , <i>Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme</i> , <i>Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Chataignier</i> , <i>Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91053 | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L., 1753 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96084 | <i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97903 | <i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | Fétuque géante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | Fétuque rouge | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | Ficaire à bulbilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine des prés, Spirée Ulmaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99409 | <i>Galium cruciata</i> (L.) Scop., 1771 | Gaillet croisette, Croisette commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | Gaillet jaune, Caille-lait jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | <i>Houlque molle, Avoine molle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon grimpant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104200 | <i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104348 | <i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105145 | <i>Lathraea clandestina</i> L., 1753 | <i>Lathrée clandestine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troëne, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106224 | <i>Linaria striata</i> (Lam.) DC., 1805 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107824 | <i>Melandrium sylvestre</i> (Schkuhr) Röhl., 1812 | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | <i>Raiponce en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115482 | <i>Potentilla fragariastrum</i> Ehrh., 1792 | <i>Potentille faux fraisier, Potentille stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115900 | <i>Primula officinalis</i> Hill, 1765 | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116411 | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753 | <i>Pulmonaire à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116574 | <i>Pyrus communis</i> L., 1753 | <i>Poirier cultivé, Poirier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | <i>Petit cocriste, Petit Rhinanthé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des bois, Scirpe des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121997 | <i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753 | <i>Herbe aux écrouelles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122267 | <i>Sedum telephium</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123509 | <i>Silene inflata</i> Sm., 1800 | Tapotte | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | Épiaire officinale | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125044 | <i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770 | Stellaire des sources | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128125 | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798 | Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 159879 | <i>Ulmus campestris sensu 1</i> | <i>Petit orme, Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128268 | <i>Urtica dioica L., 1753</i> | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis L., 1753</i> | <i>Valériane officinale, Valériane des collines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus L., 1753</i> | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | <i>Vicia sepium L., 1753</i> | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129669 | <i>Viola riviniana Rchb., 1823</i> | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84496 | <i>Asplenium lanceolatum Huds., 1778</i> | <i>Asplénium lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84534 | <i>Asplenium trichomanes L., 1753</i> | <i>Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84999 | <i>Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799</i> | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 133968 | <i>Dryopteris affinis subsp. affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979</i> | <i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis L., 1753</i> | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | Réglisse des bois, Polypode vulgaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115057 | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère mâle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Fougère aigle, Porte-aigle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | AULEPE | 1989 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement) |
| Informateur | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | |
| | Rogeon, données bryologiques | | |
| | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | |
| | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | |