



Etang de Ry (Identifiant national : 820032066)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 38020122)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : LO PARVI (BAILLET Yann), - 820032066, Etang de Ry. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032066.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : LO PARVI (BAILLET Yann)
Centroïde calculé : 829962°-2086152°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 9 |
| 9. SOURCES | 9 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère
- Commune : Crémieu (INSEE : 38138)
- Commune : Dizimieu (INSEE : 38146)
- Commune : Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu (INSEE : 38488)

1.2 Superficie

194,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce site réunit des milieux humides (un marais, un petit et un grand étang, un ruisseau...), des prairies et des bois ; il est bordé par deux collines boisées. L'une d'entre-elles est l'un des points les plus élevés du plateau de l'Isle Crémieu, à une altitude de 418 m. On peut observer ici une des plus belles populations locales de Crapaud commun et de Grenouille agile. Cependant, chaque année, celles-ci subissent de lourdes pertes du fait d'une route séparant les bois où les batraciens hibernent de leur lieu de reproduction.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches</i> | <i>34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i> | | | | |
| <i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | <i>34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres | 99522 | <i>Galium rubrum</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 81336 | <i>Allium carinatum</i> L., 1753 | <i>Ail caréné, Ail à pétales carénés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 131154 | <i>Allium carinatum</i> subsp. <i>pulchellum</i> Bonnier & Layens, 1894 | <i>Ail joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81487 | <i>Allium pulchellum</i> G.Don, 1827 | <i>Ail joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83721 | <i>Argyrobium linnaeanum</i> Walp., 1839 | <i>Argyrolobe de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83722 | <i>Argyrobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968 | <i>Argyrolobe de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88387 | <i>Carex bohémica</i> Schreb., 1772 | <i>Laïche souchet, Laïche de Bohême, Laïche voyageuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88458 | <i>Carex cyperoides</i> Murray, 1774 | <i>Laïche souchet, Laïche de Bohême, Laïche voyageuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux-souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94100 | <i>Cytisus argenteus</i> L., 1753 | <i>Argyrolobe de Linné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96449 | <i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery, 1921 | <i>Épipactis à labelle étroit</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96454 | <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800 | <i>Épipactis à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96486 | <i>Epipactis viridiflora</i> (Hoffm. ex Krock.) Rchb., 1828 | <i>Épipactis à labelle étroit</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99487 | <i>Galium obliquum</i> Vill., 1785 | <i>Gaillet oblique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102870 | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | <i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105086 | <i>Laserpitium prutenicum</i> L., 1753 | <i>Laser de Prusse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissole</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109212 | <i>Najas major</i> All., 1773 | <i>Naiade majeure</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | <i>Naiade majeure, Naiade marine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant,</i> <i>Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121329 | <i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802 | <i>Scabieuse blanchâtre,</i> <i>Scabieuse odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122678 | <i>Senecio paludosus</i> L., 1753 | <i>Séneçon des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés,</i> <i>Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123369 | <i>Silaus flavescens</i> Bernh., 1800 | <i>Silaüs des prés,</i> <i>Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124410 | <i>Sparganium minimum</i> Wallr., 1840 | <i>Rubanier nain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125173 | <i>Stipa pennata</i> L., 1753 | <i>Stipe penné,</i> <i>Plumet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | <i>Germandrée des marais, Chamaraz,</i> <i>Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 141580 | <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>palustre</i> Gams, 1927 | <i>Germandrée des marais, Chamaraz,</i> <i>Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128307 | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utriculaire citrine,</i> <i>Utriculaire élevée,</i> <i>Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128314 | <i>Utricularia major</i> sensu P.Fourn., 1937 | <i>Utriculaire citrine,</i> <i>Utriculaire élevée,</i> <i>Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128316 | <i>Utricularia neglecta</i> <i>Lehm., 1828</i> | <i>Utriculaire citrine,</i> <i>Utriculaire élevée,</i> <i>Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | CREN Rhône-Alpes | 1999 | Suivi des populations de Cistude d'Europe (<i>Emys orbicularis</i>) de l'Isle Crémieu. Première phase : 1999 |
| | Non_renseigné | 2004 | Autoroute A48 Ambérieu - Bourgoin. Etude des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR 8201727 des "Etangs, coteaux secs et grottes de l'Isle Crémieu" |