*Steppes salées méditerranéennes (*Limonietalia*)

1510*

* *Habitat prioritaire*
CODE CORINE 15.8

Extrait du *Manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne*

Version EUR 15-1999

PAL. CLASS. : 15.8

Associations de la côte méditerranéenne et des bordures des dépressions salées ibériques, riches en herbes pérennes (*Limonium* spp. ou *Lygeum spartum*), sur sols temporairement envahis (mais non inondés) par l'eau salée, exposées à une sécheresse estivale extrême, avec la formation d'efflorescences salées.

Les syntaxa caractéristiques sont les Limonietalia (*Limonion catalaunico-viciosoi, Lygeo-Limonion furfuracei, Lygeo-Lepidion cardamines*); les Arthrocnemetalia (*Suaedion braunblanquetii, Arthrocnemion glauci*); les Thero-Salicornietalia (*Microcnemion coralloidis, Salicornion patulae*) et les Saginetalia maritimae (*Frankenion pulverulentae, Thero-Suaedion*).

Végétales : *Halopeplis amplexicaulis, Hymenolobus procumbens, *Limonium* spp., Lygeum spartum, Microcnemion coralloides, Salicornia patula, Senecio auricula, Sphenopus divaricatus.*

Caractères généraux

L'habitat générique regroupe l'ensemble des végétations pérennes à Statices des revers dunaires vers les sansouires des étangs lagunaires, sur substrat encroûté, en situation d'aridité estivale.

Il présente une distribution géographique très limitée : quelques points du littoral du Languedoc et Camargue. Il s'agit d'un **type d'habitat représentatif** du domaine biogéographique méditerranéen.

Compte tenu des fortes contraintes écologiques et du caractère dynamique qui caractérisent cet habitat, la gestion sera basée, dans la mesure du possible, sur la non-intervention. Cependant, sur certains sites fréquentés, il est souhaitable d'assurer une maîtrise de la fréquentation pour maintenir cet habitat dans un état de conservation satisfaisant.

Déclinaison en habitats élémentaires

Il est décliné en **un seul** habitat élémentaire :

❶ – Steppes salées du littoral du Languedoc et de Provence

Position des habitats élémentaires au sein de la classification phytosociologique française actuelle

Ce type d'habitat correspond à des communautés végétale se rapportant à une classe phytosociologique :

➤ Végétations crassulescentes à dominante d'arbustes ou de sous-arbrisseaux, des sols salés et « sansouires » méditerranéo-atlantiques
Classe : ***Salicornietea fruticosae***

- Communautés du littoral et des bassins salifères endoréiques, sur sol perhalin à efflorescences salines, peu ou pas inondé et très séchard.
  Ordre : ***Limonietalia***
  - Communautés des steppes salées à Satices du littoral nord-ouest méditerranéen
    Alliance : ***Limonion confusi***
    - Associations :
      Limonietum gerardino-virgati ❶
      Artemisio caeruleae-Limonietum virgati ❶

Bibliographie

BRAUN-BLANQUET J. (et collaborateurs), CNRS, Paris 1952 - Les groupements végétaux de la France méditerranéenne. 297 p., 16 pl.

GÉHU J.-M., 1991 - Livre rouge des phytocénoses terrestres du littoral français. Bailleul 1 vol., 236 p.

GÉHU J.-M., BIONDI E., GÉHU-FRANCK J. et COSTA M., 1992 - Interprétation phytosociologique actualisée de quelques végétations psammophiles et halophiles de Camargue. *Colloques phytosociologiques*, XIX « Végétation et qualité de l'environnement côtier en Méditerranée », Cagliari 1989 : 103-131.

MÉDAIL F., 1994 - Liste des habitats naturels retenus dans la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, présents en région méditerranéenne française (Régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse). 72 p.

MOLINIER R. et TALLON G., 1969 - Prodrome des unités phytosociologiques observées en Camargue. *Bulletin du muséum d'histoire naturelle de Marseille*, 30 : 7-110.