

Dunes à *Hippophaë rhamnoides*


Extrait du Manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne

Version EUR 15-1999

Formations colonisatrices forestières d'Argousier des dépressions humides ou sèches des dunes.

Végétale :

Hippophaë rhamnoides.



Caractères généraux

L'habitat générique regroupe l'ensemble des végétations de fourrés arrière-dunaires à Argousier (*Hippophaë rhamnoides*).

Il est assez fréquent dans les dépressions et sur les arrière-dunes des grands massifs dunaires du littoral nord de la France. Il s'agit d'un **type d'habitat représentatif** du domaine biogéographique atlantique.

Compte tenu des facteurs écologiques et du caractère dynamique qui caractérisent cet habitat, la gestion sera basée dans la mesure du possible sur la non-intervention.

Déclinaison en habitats élémentaires

L'habitat générique n'est décliné qu'en **un seul** habitat élémentaire :

① - Dunes à Argousier

Position de l'habitat élémentaire au sein de la classification phytosociologique française actuelle

Les végétations des fourrés arrière-dunaires à Argousier, se rapportent à une classe phytosociologique :

➤ Végétations non méditerranéennes de manteaux arbustifs, fruticées et haies

Classe : *Crataego monogynae-Prunetea spinosae*

■ Communautés de manteaux dunaires nord-atlantiques

Ordre : *Salicetalia arenariae*

● Communautés hautes

Alliance : *Ligustro vulgaris-Hippophaion rhamnoidis*

◆ Associations :

Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis ①

Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis ①

Pyrolo-Hippophaetum rhamnoidis ①

Bibliographie

GÉHU J.-M., 1991 - Livre rouge des phytocénoses terrestres du littoral français. Bailleul, 1 vol., 236 p., Bailleul,

GÉHU J.-M. et FRANCK J., 1982 - La végétation du littoral Nord-Pas-de-Calais (essai de synthèse). Région Nord-Pas-de-Calais/CREPIS, 1 vol., 361 p.