NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9112025 - Complexe lagunaire de Canet-Saint Nazaire

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 8
6. GESTION DU SITE 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR9112025

1.3 Appellation du site
Complexe lagunaire de Canet-Saint Nazaire

1.4 Date de compilation
30/11/2005

1.5 Date d'actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Languedoc-Roussillon	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 03/03/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000814176

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,01333°

Latitude : 42,66806°

2.2 Superficie totale

1858,69 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

34,46%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
91	Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
66	Pyrénées-Orientales	65,54 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
66002	ALENYA
66037	CANET-EN-ROUSSILLON
66171	SAINT-CYPRIEN
66186	SAINT-NAZAIRE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A119	*Porzana porzana*	c	1	10	i	P	G	C	C	C	C
B	A124	*Porphyrio porphyrio*	p	20	20	p	P	G	A	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	w	3000	11000	i	P	G	C	B	C	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	0	20	p	P	G	B	B	C	B
B	A135	*Glareola pratincola*	w	1	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	10	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	10	20	i	P	G	C	C	C	C
B	A166	*Tringa glareola*	c	10	100	i	P	G	B	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	r	1	25	p	P	G	B	B	C	B

B	A231	*Coracias garrulus*	r	15	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A243	*Calandrella brachydactyla*	r	25	30	p	P	G	C	B	C	B
B	A293	*Acrocephalus melanopogon*	p	20	30	p	P	G	C	B	C	B
B	A480	*Cyanecula svecica*	w	1	10	i	P	G	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	10	30	i	P	G	C	C	C	C
B	A773	*Ardea alba*	w	10	10	i	P	G	B	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w	150	300	i	P	G	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	c	500	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c	30	120	i	P	G	C	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	60	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	r	30	40	p	P	G	C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	p	7	8	p	P	G	B	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	5	10	p	P	G	B	B	C	B
B	A024	*Ardeola ralloides*	c	5	10	i	P	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	w	50	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	15	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	c	15000	15000	i	P	G	B	B	C	B
B	A058	*Netta rufina*	w	1	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	w	3000	7000	i	P	G	B	B	C	B
B	A060	*Aythya nyroca*	w	1	3	i	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	500	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	5	8	p	P	G	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Streptopelia turtur*	1	10	p	P			X		X	
B		*Athene noctua*	40	50	p	P			X			
B		*Remiz pendulinus*	5	10	p	P						X
B		*Panurus biarmicus*	5	10	p	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	40 %
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	25 %
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	9 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	15 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	3 %
N16 : Forêts caducifoliées	1 %
N17 : Forêts de résineux	1 %
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	3 %

Autres caractéristiques du site

Le complexe lagunaire de Canet Saint-Nazaire est l'élément le plus méridional du chapelet de lagunes du Languedoc-Roussillon qui constitue un ensemble lagunaire unique en Europe.

Les apports en eau douce du bassin versant étant prépondérants, la salinité de l'eau de la lagune est faible, d'où l'important développement des roselières. Le gradient d'habitats, depuis les milieux dunaires jusqu'aux prairies encore pâturées en passant par des zones humides de salinité variée, favorise la diversité biologique du site, déjà mise en valeur par sa proposition comme site d'importance communautaire.

Vulnérabilité
: La lagune proprement dite est soumise à un comblement rapide du fait des apports de sédiments du bassin versant : le développement des activités sur ce bassin versant, couplé au régime torrentiel des cours d'eau conduisent à une accélération de ce processus de comblement.

La proximité de l'agglomération de Perpignan et des stations touristiques génère une fréquentation importante sur le cordon dunaire qui limite la capacité d'accueil pour les oiseaux inféodés à ces milieux.

4.2 Qualité et importance

Les divers habitats naturels du complexe lagunaire de Canet-Saint Nazaire jouent différents rôles en fonction des saisons et des espèces d'oiseaux : aires de repos, aires de nidification (roselières et milieux dunaires, notamment), zones d'alimentation (plan d'eau, prairies pâturées). Le site accueille ainsi de nombreuses espèces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux avec des effectifs souvent significatifs. On signalera notamment la Talève sultane, pour laquelle l'étang constitue le seul site de nidification actuellement connu en France.

La lagune est de plus située sur l'un des principaux axes migratoires européens. Elle constitue notamment une halte importante avant le passage des Pyrénées lors de la migration post nuptiale en cas de mauvaises conditions météorologiques.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		O
H	A08	Fertilisation		O
H	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		O
H	D01.02	Routes, autoroutes		I
H	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		O
H	J02.01	Comblement et assèchement		I
H	J02.03	Canalisation et dérivation des eaux		O
L	E01.03	Habitations dispersées		I
L	F01	Aquaculture (eau douce et marine)		I
L	F03.01	Chasse		I
M	E01	Zones urbanisées, habitations		O
M	G02	Structures de sports et de loisirs		O
M	L08	Inondation (processus naturels)		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04	Pâturage		I
M	G03	Centres d'interprétation		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine public de l'état	%
Domaine public maritime	%

4.5 Documentation

"Document d'objectifs de la zone spéciale de conservation "complexe lagunaire de Canet-Saint Nazaire" - Biotope, Communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée, Conservatoire du Littoral (rapport de synthèse + document de compilation en 2 tomes) - Juillet 2005

Nombreuses études hydrauliques sur l'étang et son bassin versant.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	55 %
52	Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA	5 %
54	Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime	23 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	ETANG DE CANET - SAINT-NAZAIRE	-	55%
52	réserve de chasse de l'ACCA de Canet	-	5%
54	Réseve du Mas Conte	-	10%
54	Réserve de l'Esparrou	-	13%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat mixte des bassins versants du Réart

Adresse : 3 rue des Fenouillèdes, Parc d#activités Sud-Roussillon 66280 Saleilles

Courriel : contact@reart66.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Documents d#objectif de la Zone de Protection Spéciale et de la Zone Spéciale de Conservation Complexe lagunaire de Canet Saint-Nazaire
Lien :

https://pole-lagunes.org/les-lagunes/cartographie-interactive/etang-de-canet/

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation

Le document d'objectifs du site d'importance communautaire "Complexe lagunaire de Canet-Saint Nazaire" (juillet 2005) a été complété pour intégrer les enjeux de la ZPS.