NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR9301580 - Mont Ventoux

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 8
6. GESTION DU SITE ..... 9

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site
FR9301580

### 1.3 Appellation du site
Mont Ventoux

### 1.4 Date de compilation
31/01/1996

### 1.5 Date d'actualisation
03/08/2021

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003

(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 02/06/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022297301

### Explication(s) :

MAJ 2005 : integration datas bio du DOCOB. # MAJ 2014.07 : conversion surf en Lamb93. Actualisation surf et cotations hab esp selon DOCOB. # MAJ 2015.01 : actualisation datas chiros (+ ajout 3 especes) selon etude GCP 2014. # MAJ 2017-04 : ajout E1386. # MAJ 2021-07 ajout tourterelle des bois # MAJ 2021-08 : hab, flore, chiros.

## 2. LOCALISATION DU SITE

### 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 5,29222°

**Latitude :** 44,17167°

### 2.2 Superficie totale

3134 ha

### 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

### 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 93 | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |

### 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 84 | Vaucluse | 100 % |

### 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 84005 | AUREL |
| 84015 | BEAUMONT-DU-VENTOUX |
| 84017 | BEDOIN |
| 84021 | BRANTES |
| 84110 | SAINT-LEGER-DU-VENTOUX |
| 84123 | SAULT |
| 84125 | SAVOILLAN |

### 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 4060<br>*Landes alpines et boréales* | | 95,14<br>*(3,04 %)* | | G | B | C | B | B |
| 4090<br>*Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux* | | 10,09<br>*(0,32 %)* | | G | B | C | B | B |
| 5110<br>*Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)* | | 1<br>*(0,03 %)* | | P | C | C | C | C |
| 5210<br>*Matorrals arborescents à Juniperus spp.* | | 3,8<br>*(0,12 %)* | | P | C | C | C | C |
| 6110<br>*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* | X | 1<br>*(0,03 %)* | | P | A | C | B | B |
| 6170<br>*Pelouses calcaires alpines et subalpines* | | 92,79<br>*(2,96 %)* | | G | A | C | B | B |
| 6210<br>*Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | | 120<br>*(3,83 %)* | | G | B | C | B | B |
| 8120<br>*Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)* | | 343<br>*(10,94 %)* | | G | A | C | A | A |
| 8130<br>*Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles* | | 144<br>*(4,59 %)* | | G | C | C | B | B |
| 8210<br>*Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique* | | 56,48<br>*(1,8 %)* | | G | B | C | B | B |
| 8240<br>*Pavements calcaires* | X | 0,1<br>*(0 %)* | | P | A | C | B | B |
| 8310<br>*Grottes non exploitées par le tourisme* | | 0<br>*(0 %)* | 15 | M | B | C | B | B |
| 9150 | | 467 | | G | B | C | B | B |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion* | | *(14,9 %)* | | | | | | |
| 9340<br>*Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia* | | 36,52<br>*(1,17 %)* | | G | C | C | C | C |
| 9430<br>*Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)* | X | 177<br>*(5,65 %)* | | G | A | C | A | A |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | w | 10 | 20 | i | P | M | C | B | C | B |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | c | 70 | 70 | i | P | P | C | B | C | B |
| P | 1386 | *Buxbaumia viridis* | p | 1 | 1 | localities | R | P | C | C | A | C |
| P | 1474 | *Aquilegia bertolonii* | p | | | i | C | M | C | A | B | A |
| I | 6199 | *Euplagia quadripunctaria* | p | | | i | R | P | D | | | |
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | C | P | C | B | C | C |
| I | 1087 | *Rosalia alpina* | p | | | i | R | P | C | B | C | B |
| I | 1088 | *Cerambyx cerdo* | p | | | i | C | P | C | B | C | C |
| R | 1298 | *Vipera ursinii* | p | 500 | 1000 | i | P | M | C | C | A | B |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | c | 100 | 120 | i | R | M | C | B | C | C |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | c | | | i | R | P | C | B | C | C |
| M | 1307 | *Myotis blythii* | w | 500 | 650 | i | P | M | B | A | C | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1307 | Myotis blythii | c | 70 | 70 | i | P | P | C | B | C | B |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus | c | | | i | C | P | C | B | C | A |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii | c | | | i | R | P | C | B | C | C |
| M | 1321 | Myotis emarginatus | c | | | i | R | P | C | B | C | B |
| M | 1323 | Myotis bechsteinii | c | | | i | V | P | C | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| A | | Alytes obstetricans | | | i | P | X | | X | | X | |
| B | | Streptopelia turtur | | | | R | | | X | | X | |
| I | | Papilio alexanor | | | i | P | X | | X | | X | |
| I | | Parnassius apollo | | | i | P | X | | X | | X | |
| M | | Eptesicus serotinus | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | Myotis nattereri | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | Myotis daubentoni | | | i | P | | | | | | X |
| M | | Pipistrellus pipistrellus | | | i | P | | | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | | *Hypsugo savii* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Plecotus auritus* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Plecotus austriacus* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Tadarida teniotis* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Pipistrellus kuhlii* | | | i | P | | | X | | X | |
| R | | *Lacerta viridis* | | | i | P | X | | | | | X |
| R | | *Podarcis muralis* | | | i | P | X | | X | | X | |
| R | | *Coluber viridiflavus* | | | i | P | X | | | | | X |
| R | | *Coronella austriaca* | | | i | P | X | | X | | X | |
| R | | *Elaphe longissima* | | | i | P | X | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 18 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 10 % |
| N11 : Pelouses alpine et sub-alpine | 10 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 5 % |
| N17 : Forêts de résineux | 15 % |
| N18 : Forêts sempervirentes non résineuses | 2 % |
| N19 : Forêts mixtes | 15 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 25 % |

### Autres caractéristiques du site

Le Mont Ventoux est l'un des derniers contreforts sud-occidentaux des préalpes françaises. C'est un anticlinal avec des chevrons et des combes.

Vulnérabilité
: Les enjeux principaux au regard de la conservation de ces milieux et des espèces associées concernent la conservation des milieux ouverts, la maturation des milieux forestiers pré-climaciques et la préservation des milieux rupestres.
La première étape de recolonisation forestière est assurée, la deuxième étape de maturation est en cours mais on note une régression des milieux ouverts et une pression touristique ponctuelle (entraînant en particulier la perturbation des sites à Vipère d'Orsini au Mont-Serein ).

## 4.2 Qualité et importance

La végétation varie en fonction de l'altitude, de l'étage mésoméditérranéen à l'étage subalpin. Elle présente un bon échantillon des groupements végétaux méditerranéens français non littoraux : mattorals à Genévrier de Phénicie, végétation des rochers et falaises continentales calcaires, éboulis thermophiles, landes oroméditerranéennes à Genêt épineux, landes et pelouses alpines et subalpines, pinèdes montagnardes, faciès à Houx et If de la hêtraie-sapinière méridionale...

La vipère d'Orsini est présente sur le Mont Serein, en partie dans le site. D'autres stations sont potentiellement présentes au sein du site mais restent à découvrir.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | G05.01 | Piétinement, surfréquentation | | I |
| M | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | I |
| M | E03.01 | Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives | | I |
| M | G01.02 | Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés | | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M | G02.02 | Station de ski | | I |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 1 % |
| Domaine communal | 34 % |
| Domaine public de l'état | 65 % |

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 31 | Site inscrit selon la loi de 1930 | 21 % |
| 38 | Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique | 46 % |
| 21 | Forêt domaniale | 70 % |
| 22 | Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 30 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 31 | Mont Ventoux (vallon du Mont Serein et sommet du Ventoux) | * | 21% |
| 38 | Tête de l'Emine | * | 1% |
| 38 | Sommet du mont Ventoux | * | 37% |
| 38 | Plateau du mont Serein | * | 10% |
| 38 | Hêtraie du mont Ventoux | + | 3% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNR du Ventoux

Adresse : 830 avenue du Mont-Ventoux 84200 Carpentras

Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/981_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs N2000 validé en 2003.